

KULLANMA TALİMATI

**H-VAC ERİŞKİN 1 mL IM enjeksiyon için süspansiyon içeren ampul
Hepatit-B Aşısı (rekombinant DNA)
Kas içine uygulanır.**

•**Etkin madde :**

Her 1 mL'lik tek doz içerisinde:

20 mikrogram saflaştırılmış Hepatit B yüzey antijeni* bulunmaktadır.

**Hansenula polymorpha* (maya) kültürlerinde rekombinant DNA teknolojisi ile üretilmiştir.

•**Yardımcı maddeler :** Alüminyum hidroksit, tiyomersal, fosfat tampon çözeltisi (disodyum hidrojen fosfat anhidr, sodyum dihidrojen fosfat dihidrat, sodyum klorür,enjeksiyonluk su)

Bu aşıyı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- Bu aşı kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- Bu aşının kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu aşıyı kullandığınızı söyleyiniz.*
- Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. Aşı hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında :

1. **H-VAC ERİŞKİN nedir ve ne için kullanılır?**
2. **H-VAC ERİŞKİN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **H-VAC ERİŞKİN nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **H-VAC ERİŞKİN'in saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. H-VAC ERİŞKİN nedir ve ne için kullanılır?

H-VAC ERİŞKİN rekombinant DNA teknolojisi ile elde edilmiş, şeffaf cam ampulde 1 mL, tek doz enjeksiyonluk süspansiyon içeren bir aşıdır.

H-VAC ERİŞKİN, hepatit B virüsünün neden olduğu karaciğer iltihabının (hepatit) önlenmesi için 20 yaş ve üzerindeki kişilerde aktif bağışıklama kazanılmasını sağlar.

Hepatit B virüsüne karşı aşılanma ile, hepatit B virüsünün neden olabileceği hepatit önlendiği gibi, hepatit B enfeksiyonunun komplikasyonları olan kronik hepatit B gelişimi, kronik hepatit B'ye bağlı siroz ve hepatit B'ye bağlı gelişen karaciğer kanseri de önlenmiş olur.

2. H-VAC ERİŐKİN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

H-VAC ERİŐKİN'i aŐağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eđer;

- H-VAC ERİŐKİN içerięindeki bileŐenlerden herhangi birine karŐı aŐırı duyarlılıęımız varsa,
- AŐımın bir dozunu aldıktan sonra geliŐen aŐırı duyarlılık belirtileriniz varsa ,
- AteŐli hastalık veya akut enfeksiyon geęirmekteyseniz (bu durumda iyileŐme sonrasına kadar aŐılama ertelenmelidir)

H-VAC ERİŐKİN'i aŐağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eđer;

- AŐıya karŐı alerji benzeri tablonuz varsa
- Kanama bozukluęunuz varsa, koldan enjeksiyon yapılamıyorsa,
- Hamilelik durumu veya hamilelięin planlanması söz konusu ise,
- BaęıŐıklık cevabını riske atan bir tıbbi tedavi alıyorsanız veya herhangi bir nedenle (örneęin genetik bir bozukluk, insan immün yetmezlik virüsü -HIV enfeksiyonu) baęıŐıklık sisteminizin bir fonksiyonu bozuk ise(bu durumlarda aŐımın etkisi azalabilecektir)

Bu aŐı hiębir zaman damar ięi (intravasküler) uygulanmamalıdır.

Bu uyarılar, geęmiŐteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin ięin geęerliyse lütfen doktorunuza danıŐınız.

H-VAC ERİŐKİN 'in yiyecek ve ięecek ile kullanılması

Uygulama yolu aęısından yiyecek ve ięeceklerle herhangi bir etkileŐimi yoktur.

Hamilelik

AŐıyı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıŐınız.

H-VAC ERİŐKİN'in fetüs geliŐimi üzerindeki etkisi deęerlendirilmemiŐtir. Hamile iseniz bu aŐıyı doktor önerisi dıŐında kullanmayınız. Eđer bir doz uygulandıktan sonra hamile kaldınız ise bu durumu doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz kalan dozların uygulanıp uygulanmayacaęı konusunda karar verecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduęunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıŐınız.

Emzirme

AŐıyı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıŐınız.

Eđer emziriyor iseniz bu durumu doktorunuza bildiriniz. H-VAC ERİŐKİN'in süt veren annelerde kullanımının bebekler üzerindeki etkisi bilinmedięinden doktorunuz durumunuzu deęerlendirecek ve size aŐımın ilk dozunun ya da kalan dozların uygulanıp uygulanmayacaęına ya da emzirip emzirmeyeceęinize karar verecektir.

Araç ve makine kullanımı

H-VAC ERİŐKİN'in araç veya makine kullanım becerisini etkileme olasılıęı gözlenmemiŐtir.

H-VAC ERİŐKİN 'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

H-VAC ERİŐKİN koruyucu olarak tiyomersal ihtiva etmektedir. Bu maddeye karşı alerjik reaksiyon gösterme ihtimaliniz vardır. Bilinen alerjik durumlarınız varsa doktorunuza söyleyiniz. Daha önce bir aŐı uygulamasından sonra sađlık problemleri yaŐadıysanız bu durumu doktorunuza belirtiniz.

Bu tıbbi ürün her 1 mL dozunda 1 mmol'den(23mg) daha az sodyum ihtiva eder;dolayısıyla sodyuma bađlı herhangi bir yan etki beklenmez.

Diđer ilaçlar ile birlikte kullanımı

- Hepatit B immünglobulin ile birlikte kullanımı: Farklı enjeksiyon bölgelerinden uygulama yapılmak şartıyla, Hepatit B immünglobulin H-VAC ERİŐKİN tarafından sađlanan aktif bađıŐıklık yanıtını etkilemez.
- Hemofilus influenza tip b konjuge aŐısı ile eŐ zamanlı verilmesinin farklı enjeksiyon bölgelerine uygulama yapıldıđı takdirde bir sakıncası yoktur. Bu iki aŐı aynı enjektörde karıŐtırılmamalıdır.
- Diđer aŐılar ile birlikte kullanımı: H-VAC ERİŐKİN eŐ zamanlı farklı enjeksiyon bölgelerine uygulanmak şartı ile difteri-tetanoz-bođmaca, difteri-tetanoz, tetanoz, verem, polio (çocuk felci) aŐısı (OPV ve IPV) ve sarı humma aŐısı ile uygulanabilir.
- BađıŐıklık sistemini baskılayan ilaçlarla (immünosüpresif) birlikte kullanımı: Daha yüksek dozda H-VAC ERİŐKİN kullanılması gerekebilir.
- Kanser tedavisi ilaçları, kortikosteroidler (prednizon, deksametazon), bađıŐıklık sistemini zayıflatıcı ilaçlar (siklosporin, efalizumab, takrolimus, mikofenolat) hepatit B aŐısı ile etkileşebilir.

Eđer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı Őu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise veya son zamanlarda bu aŐı dıŐında herhangi bir aŐılama yapıldıysa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. H-VAC ERİŐKİN nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklıđı için talimatlar:

20 yaŐ ve üzerindeki erişkinlere uygulanabilir.

Doktorunuz H-VAC ERİŐKİN'i, aŐađıda yer alan programa göre toplamda üç enjeksiyon olacak şekilde uygulayacaktır:

- İlk doz : Doktorunuzun belirlediđi bir tarihte
- İkinci doz : İlk dozdan 1 ay sonra
- Üçüncü doz : İlk dozdan 2 ay (hızlı Őema) ya da 6 ay sonra

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu aŐılama takvimini takip ediniz. Bu, sizin H-VAC ERİŐKİN'den tam yarar görmeyi sađlayacaktır. Üç enjeksiyonluk aŐılama takvimi tamamlanmazsa, tam koruma sađlanamayabilir.

Uygulama yolu ve metodu :

- H-VAC ERİŐKİN kolun üst kısmındaki kaslı bölgeye, kas içine (intramüsküler) uygulanır. AŐı, kanama bozukluđu veya trombositopeni (trombosit-kan pulcuđu - sayısında azalma) olan hastalarda subkütan (deri altına) uygulanabilir.

- Aşının tam etkisinin oluşabilmesi için ampulün kullanılmadan önce "ıyice" çalkalanması gerekir.
- H-VAC ERİŐKİN kesinlikle damar içine (IV) uygulanmamalıdır.

Deęişik yaő grupları:

Çocuklarda kullanımı: H-VAC ERİŐKİN yeni doğanlarda, bebek ve çocuklarda kullanılmaz.

Yaşlılarda kullanımı: H-VAC ERİŐKİN'in 40 yaőın üstündeki kişilerde etkinliğinin düőtüęü belirtilmiştir.

Özel kullanım durumları :

Böbrek yetmezlięi:

Böbrek yetmezlięi olan hastalara hepatit B aşısı uygulaması önerilmektedir. Aşılama her seferinde 40 mikrogram (2 mL) dozun uygulanmasıyla gerçekleşmelidir. Doktorunuz H-VAC ERİŐKİN'i, aőaęıda yer alan programa göre toplamda üç enjeksiyon olacak şekilde uygulayacaktır:

- İlk doz : Doktorunuzun belirledięi bir tarihte
- İkinci doz : İlk dozdan 1 ay sonra
- Üçüncü doz : İlk dozdan 2 ay (hızlı őema) ya da 6 ay sonra

Yukarıda belirtilen dozlar uygulandıktan sonra, doktorunuz ek bir doz uygulanmasını gerekli görebilir. Bu, sizin H-VAC ERİŐKİN 'den tam yarar görmeyi sağlayacaktır. Doktorunuzun önerdięi aşılama takvimi tamamlanmazsa, tam koruma sağlanamayabilir. Dolayısıyla doktorunuzun belirledięi aşılama takvimine uymanız gerekmektedir.

Karacięer yetmezlięi:

Kronik (uzun süren) karacięer hastalıęı veya hepatit C hastalıęı hepatit B aşılama için engel oluşturmaz.

Doktorunuz durumunuzu deęerlendirecek ve aşı uygulaması ile ilgili gerekli kararı verecektir. Doktorunuzun aşı uygulaması ile ilgili tavsiyelerine uymanız önem taşımaktadır.

Dięer

Hepatit B virüsüne maruz kalındıęı bilinen ya da tahmin edilen durumlar:

Hepatit B virüsüne maruziyetin yeni olduęu durumlarda (virüs bulaşmış ięnenin batması gibi)H-VAC ERİŐKİN'in ilk dozu hepatit immünglobulin ile beraber verilebilir ancak uygulama farklı enjeksiyon bölgelerinden yapılmalıdır. Hızlı baęışıklama őemasının uygulanması tavsiye edilir.

Kronik hemodiyaliz hastaları ve baęışıklık yetmezlięi olan kişiler:

Kronik hemodiyaliz hastalarına veya baęışıklık yetmezlięi olan kişilere, hepatit B aşısının 4 doz olarak 0, 1, 2 ve 6. aylarda uygulanması ve/veya 40 mikrogram olarak yüksek dozda verilmesi, daha iyi baęışık cevap elde edilmesini sağlayabilir. Hepatit B ile temas riski yüksek olarak devam eden bu hasta grubunda anti-HBS antikör titrelerinin koruyucu kabul edilen 10 IU/L'nin üzerinde kalması sağlanmalıdır.

Eęer H-VAC ERİŐKİN'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduęuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz .

Kullanmanız gerekenden daha fazla H-VAC ERİŐKİN kullandıysanız:

H-VAC ERİŐKİN'den kullanmanız gerekenden daha fazla kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

H-VAC ERİŐKİN'i kullanmayı unutursanız

Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir.

Takip eden dozun yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

H-VAC ERİŐKİN ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

H-VAC ERİŐKİN ile tedavi sonlandırıldığında olumsuz bir etki beklenmemektedir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm aşılar gibi H-VAC ERİŐKİN' in içeriğinde bulunan maddelere ve aşının kendisine duyarlı olan kişilerde yan etkilere sebep olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın	: 10 hastanın en az 1 inde görülebilir.
Yaygın	: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan	: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek	: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek	: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor	: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Seyrek : Lenf bezlerinde büyüme

Metabolizma ve beslenme hastalıkları

Yaygın : İştahsızlık

Psikiyatrik hastalıklar

Çok yaygın : Uyarılara karşı aşırı duyarlı olma durumu

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın : Baş ağrısı, uyuşukluk

Yaygın olmayan: Sersemlik

Seyrek : Uyuşma

Mide barsak sistemi hastalıklar

Yaygın : Bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Seyrek : Kurdeşen, kaşıntı, döküntü

Kas-iskelet bozuklukları, bağ doku ve kemik hastalıkları

Yaygın olmayan : Kas ağrısı

Seyrek : Eklem ağrısı

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Çok yaygın: Enjeksiyon bölgesinde kızarıklık ve ağrı, yorgunluk

Yaygın: Ateş, halsizlik, enjeksiyon bölgesinde şişme ve sertleşme
Yaygın olmayan: Grip benzeri belirtiler

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. H-VAC ERİŞKİN'in Saklanması

H-VAC ERİŞKİN'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız

Son kullanma tarihinin ilk iki rakamı ayı, son dört rakamı yılı gösterir.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra H-VAC ERİŞKİN'i kullanmayınız.

Aşığı buzdolabında (2°C -8°C arasında) saklayınız ve ışıktan koruyunuz.

Aşı kesinlikle dondurulmamalıdır. Aşı donmuş ise çözüp kullanmayınız.

Eğer aşıda renk değişikliği olmuşsa veya aşı içinde yabancı maddeler fark ederseniz H-VAC ERİŞKİN'i kullanmayınız.

Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığımız H-VAC ERİŞKİN'i şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız.

Ruhsat sahibi : KEYMEN İLAÇ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Şehit Gaffar Okkan Cad. No:40
Gölbaşı 06830 Ankara
Tel : 0312 485 37 60
Faks : 0312 485 37 61
e-posta : keymen@keymen.com.tr

Üretim yeri : Serum Institute of India Ltd.
212/2 Hadapsar, Pune Hindistan

Bu kullanma talimatı 24.10.2011 tarihinde onaylanmıştır.

AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU AŞIYI UYGULAYACAK SAĞLIK PERSONELİ İÇİNDİR.

Aşının önerilen tam dozu kullanılmalıdır.

H-VAC ERİŞKİN, difteri-tetanoz-boğmaca, difteri-tetanoz, tetanoz, verem, polio aşısı(OPV ve IPV), sarı humma ve hemofilus influenza tip b konjuge aşısı ile aynı anda ancak farklı enjektörler içerisinde ve farklı yerlerden uygulanabilir.

Sadece intramüsküler (IM) yoldan enjekte ediniz.

Intradermal(ID) ya da İntravenöz (IV) yoldan enjekte etmeyiniz. İğnenin bir kan damarına girmemesine dikkat ediniz.

Enjekte edilen tüm aşılar da olduđu gibi aşı uygulamasının ardından oluşabilecek bir anafilaktik reaksiyona karşı gereken tıbbi önlemler (örneğin adrenalin) hazır bulundurulmalıdır.

Aşığı kullanmadan önce iyice çalkalayınız.