

KULLANMA TALİMATI

NAZETİN 0.14 mg/püskürtme burun spreyi, çözelti
Burun içine püskürtülerek uygulanır.

- **Etkin madde:** Her bir sprey püskürtmesi (0,14 ml) 0,14 mg azelastin hidroklorür içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Disodyum EDTA, hidroksi propil metil selüloz, disodyum monohidrojen fostat dodekahidrat, sitrik asit monohidrat, sodyum klorür ve deiyonize su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **NAZETİN nedir ve ne için kullanılır?**
2. **NAZETİN' i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **NAZETİN nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **NAZETİN' in saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. NAZETİN nedir ve ne için kullanılır?

- NAZETİN, 10 ml berrak çözelti içeren cam şişelerde sunulan anti-alerjik bir burun spreyidir.
- NAZETİN, etkin madde olarak her bir püskürtmede 0,14 mg azelastin hidroklorür içermektedir.
- Azelastin, alerji belirtilerini gidermede kullanılan anti-alerjik bir ilaçtır.
- NAZETİN, mevsimsel ve mevsimsel olmayan alerjik nezlenin (rinit) (burun kaşınması, hapşırma, burun tıkanıklığı, burun akıntısı) belirtilerinin tedavisinde kullanılır.

2. NAZETİN' i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Herhangi bir ilacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

NAZETİN' i ařağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

- Azelastin hidroklorür veya NAZETİN'in ierdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karřı ařırı duyarlılıđınız (alerji) varsa
- 6 yařın altındaki ocuklarda

NAZETİN' in yiyecek ve iecek ile kullanılması

Bugüne kadar yiyecek ve ieceklerle herhangi bir etkileřim bildirilmemiřtir. Ancak, genel bir kural olarak ila kullanan kiřilerin alkollü ieceklerin tüketiminden kaınması gerekir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Laboratuvar hayvanlarında, tedavi için kullanılan dozların ok üstündeki dozlarda bile anne karnındaki cenin üzerine herhangi bir zararlı (toksik) etki göstermemesine rađmen, günümüzdeki tıbbi yaklařım, hamileliđin ilk üç ayında NAZETİN'in kullanılmaması yönündedir.

Hamilelik döneminde NAZETİN' in kullanımına doktorunuz karar verecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduđunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Emzirme dönemi sırasında bu ilacın güvenliliđine ait yeterli kanıt olmadıđından, NAZETİN'i emzirme döneminde kullanmayınız.

Ara ve makine kullanımı

NAZETİN kullanılırken, hastalıđın kendisinin de neden olabileceđi tek tük vakalar halinde bitkinlik, bezginlik, takatsizlik, bař dönmesi veya halsizlik görülebilir. Benzer řikayetleriniz oluyor ise ara ve makine kullanma yeteneđiniz etkilenebilir. Bu etkiler, alkol ve reaksiyon zamanı üzerine olumsuz etkisi olan diđer ilalar ile birlikte kullanım durumunda artabileceđi için, özel dikkat göstermelisiniz. Ara veya makine kullanırken dikkatli olunuz.

NAZETİN' in ieriđinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

NAZETİN'in ierdiği yardımcı maddelere karřı herhangi bir etki oluřması beklenmemektedir.

Diđer ilalar ile birlikte kullanımı

Diđer ilalarla herhangi bir etkileřim bildirilmemiřtir.

Eđer reeteli veya reetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. NAZETİN nasıl kullanılır?

- **Uygun kullanım ve doz/ uygulama sıklığı için talimatlar:**

NAZETİN daima doktorun önerdiği biçimde kullanılmalıdır. Kullanım konusunda emin olmadığımız durumlarda doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Doktor tarafından farklı bir biçimde önerilmedikçe, NAZETİN'i her bir burun deliğine günde 2 defa 1 kez sıkınız (sabah ve akşam; günlük toplam doz 0,56 mg azelastin hidroklorüre eşdeğer).

- **Uygulama yolu ve metodu:**


NAZETİN' i başınız dik pozisyonda iken uygulayınız (Aşağıdaki şekil ve talimatları takip ediniz).



Şekil 1: Koruyucu kapağını çıkarınız



Şekil 2: Sadece ilk kez kullanılırken, püskürtme görünene kadar birkaç kez sıkınız



Şekil 3: Başınız dik durumdayken her bir burun deliğine bir kez sıkınız. Koruyucu kapağı tekrar yerine yerleştiriniz.

NAZETİN ile tedavi süresi belirtilerin (semptomların) tipine, şiddetine ve gelişimine bağlıdır. NAZETİN uzun dönem tedavide kullanılabilir.

- **Değişik yaş grupları**

Çocuklarda kullanımı:

NAZETİN' i 6 yaşından küçük çocuklarda kullanmayınız.

Yaşlılarda (65 yaş ve üzeri) kullanımı:

Yaşlılarda kullanımı için özel bir önlem yoktur. Normal dozlarda kullanabilirsiniz.

- **Özel kullanım durumları:**

Özel kullanımı yoktur.

Eğer NAZETİN'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz

veya eczacınız ile konuşunuz

Kullanmanız gerekenden daha fazla NAZETİN kullandıysanız:

NAZETİN'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

NAZETİN, burun içerisine lokal olarak kullanılır. Lokal olarak aşırı doz durumunda bile, aktif madde içeriği çok düşük olduğundan dolayı herhangi bir zehirlenme belirtisi beklenmez. Ancak, amaçlanan kullanımının dışında daha yüksek miktarlarda ağız yoluyla alınması (örneğin, şişenin tamamının bir çocuk tarafından yutulması) durumunda tıbbi yardım sağlanmalıdır. Söz konusu doz aşımı çok yeni gerçekleşmiş ise mide yıkanması önerilir.

İnsanlarda azelastin hidroklorürün zararlı (toksik) dozlarının uygulamasına ait deneyim bulunmamaktadır. Son derece yüksek aşırı dozda veya zehirlenmede merkezi sinir sistemi bozuklukları (huzursuzluk, yerinde duramama, heyecan veya belirgin şekilde uzun süreli yorgunluk ve uykulu hal), hayvan deneylerinin sonuçlarına dayalı olarak beklenebilir. Dolayısıyla bu bozuklukların tedavisi belirtilere yönelik olmalıdır.

NAZETİN' i kullanmayı unutursanız:

Eğer NAZETİN' i uygulamayı unutursanız, özel bir önlem almanıza gerek yoktur. Sonraki dozu her zamanki saatte alınız. Gerektiğinde iki uygulama zamanı arasında da NAZETİN' i kullanabilirsiniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

NAZETİN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

NAZETİN ile tedaviye belirtileriniz geçinceye kadar düzenli olarak devam ediniz.

NAZETİN' i kullanmayı bırakırsanız, rahatsızlığınızın tipik belirtileri kısa sürede yeniden ortaya çıkabilir.

Bu ürünün kullanımıyla ilgili herhangi bir sorunuz olursa, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, NAZETİN'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkileri olabilir.

Yan etkiler görülme sıklıklarına göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az 1'inde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın 1'inden az, fakat 100 hastanın 1'inde veya 1'inden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın 1'inden az, fakat 1.000 hastanın 1'inde veya 1'inden fazla görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın 1'inden az, fakat 10.000 hastanın 1'inde veya 1'inden fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın 1'inden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Çok seyrek: Aşırı duyarlılık reaksiyonları, baş dönmesi, döküntü, kaşıntı, ateş. Hastanın kendisinden de kaynaklanabilecek olan yorgunluk (bitkinlik, tükenmişlik hissi), baş dönmesi veya zayıflık hissi.

Yaygın: Uygun olmayan uygulama (baş arkaya yatırılarak uygulama, Bkz. 3. NAZETİN Nasıl Kullanılır?) nadiren bulantıya sebep olabilen acı tat oluşturabilir.

Yaygın olmayan: Sprey uygulandığında iltihaplı burun mukozasında iritasyon (batma, kaşınma), hapşırma ve burun kanaması.

Bahsedilen yan etkiler, genelde geçicidir. Dolayısıyla özel bir önlem alınmasına gerek olmayacaktır.

NAZETİN'in kullanımından sonra ağzınızda acı tat hissederseniz, bu acı tadı gidermek için alkol içermeyen meyve suyu veya süt gibi bir şey içmek isteyebilirsiniz.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. NAZETİN'in Saklanması

NAZETİN'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25 °C altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Buzdolabında (+8 °C'nin altında) saklamayınız.

Yanlışlıkla buzdolabı gibi +8 °C'nin altındaki bir sıcaklıkta uzun süre bırakılırsa, NAZETİN'in etkin maddesi bir ölçüde kristalleşmeye başlar. Şişeyi ışığa tuttuğunuzda bu kristaller görünür hale gelecektir. Böyle bir çözeltiyi kullanmayınız.

Ancak çözeltiyi birkaç saat oda ısısında bırakırsanız, kristaller tamamen kaybolacaktır, bu berrak çözeltiyi yeniden kullanabilirsiniz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra NAZETİN'i kullanmayınız.

Açıldıktan sonra kullanım süresi:

Şişenin ilk açılımından sonra NAZETİN'i, 6 aydan daha uzun süre ile kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi:

Berko İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.

Yenişehir Mah. Özgür Sok. No: 16-18 Ataşehir/İstanbul

0 216 456 65 70 (Pbx)

0 216 456 65 79 (Faks)

info@berko.com.tr

Üretim Yeri:

Berko İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.

Adil Mah. Yörükler Sok. No: 2 Sultanbeyli/ İstanbul

0 216 592 33 00 (Pbx)

0 216 592 00 62 (Faks)

Bu kullanma talimatı 28/09/2018 tarihinde onaylanmıştır.