

## KULLANMA TALİMATI

### SIRTURO 100 mg tablet

Ağız yolu ile alınır.

- **Etkin madde:** Her tablet 100 mg bedakuiline eşdeğer 120,89 mg bedakuilin fumarat içermektedir.
- **Yardımcı maddeler:** Laktoz monohidrat (sığır), mısır nişastası, hipromelloz, polisorbat 20, mikrokristalin selüloz, kroscarmelloz sodyum, silika koloidal susuz, magnezyum stearat.

▼ Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen herhangi bir yan etkiyi raporlayarak yardımcı olabilirsiniz. Yan etkilerin nasıl raporlanacağını öğrenmek için 4. Bölümün sonuna bakabilirsiniz.

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. *SIRTURO nedir ve ne için kullanılır?*
2. *SIRTURO'yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler*
3. *SIRTURO nasıl kullanılır?*
4. *Olası yan etkiler nelerdir?*
5. *SIRTURO'nun saklanması*

**Başlıkları yer almaktadır.**

## 1. SIRTURO nedir ve ne için kullanılır?

- SIRTURO, bir yüzünde "207" ve üzerinde "t" ve diğer yüzünde "100" baskısı olan, 11 mm çapında, beyazla neredeyse beyaz arası, yuvarlak, bikonveks tablettir.
- Bir karton kutuda her biri 6 tablet içerecek şekilde 4 adet blister şerit bulunur.
- SIRTURO, bedakuilin etkin maddesini içeren bir tür antibiyotiktir. Antibiyotikler, hastalığa neden olan bakterileri öldüren ilaçlardır. Hastalık diğer antibiyotiklere dirençli hale geldiğinde SIRTURO akciğerleri etkileyen tüberkülozu tedavi etmek için kullanılır. Bu durum, birçok ilaca dirençli akciğer tüberkülozu olarak adlandırılır.
- SIRTURO, tüberkülozu tedavi etmek için her zaman diğer ilaçlarla birlikte kullanılmalıdır.
- SIRTURO, 18 yaş ve üzeri yetişkinlerde kullanılır.

## 2. SIRTURO kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

**UYARI: Artan ölüm riski; QT aralığının uzaması (kalp ritminizde yavaşlamayı gösteren elektriksel akım parametresi )**

### **Artan ölüm riski:**

Klinik çalışmalar esnasında SIRTURO ile artan ölüm riski görülmüştür. SIRTURO sadece başka bir etkili tedavi rejimi sağlanamadığında kullanılmalıdır.

### **QT aralığı uzaması:**

SIRTURO ile QT aralığında uzama görülebilir. QT aralığını uzatan ilaçlar ile kullanılması ek bir QT aralığında uzamaya neden olabilir. Doktorunuz EKG ( kalbin elektriksel akımını ölçen test ) izlemesi yapmalıdır. Doktorunuz gerekli gördüğü durumda SIRTURO'yu bırakmanızı söyleyebilir.

## **SIRTURO'yu aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

Eğer:

- Etkin madde bedakuiline veya bu ilacın içerdiği maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) var ise.

Bu durum sizin için geçerliyse SIRTURO'yu kullanmayınız. Emin değilseniz, SIRTURO'yu kullanmadan önce doktor veya eczacınızla konuşunuz.

## **SIRTURO'yu aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

Aşağıdaki durumlar sizin için geçerliyse, SIRTURO'yu kullanmadan önce doktor, eczacı veya hemşirenizle konuşunuz.

Eğer:

- Anormal kalp değerleri (EKG) veya kalp yetmezliğiniz olduysa;
- Ailenizde veya sizde "kalıtsal uzun QT sendromu" adı verilen kalp sorunu varsa;
- Tiroid bezi işleviniz düşükse (Bu; kan testinde ortaya çıkabilir).
- Karaciğer hastalığınız varsa veya düzenli olarak alkol alıyorsanız;
- İnsan immün yetmezlik virüsü (HIV) enfeksiyonunuz varsa.

SIRTURO çocuklarda ve ergenlerde (18 yaşın altındaki) incelenmediğinden, bu yaş grubunda kullanılmamalıdır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

### **SIRTURO'nun yiyecek ve içecek ile kullanılması**

SIRTURO, her zaman için yiyeceklerle birlikte alınmalıdır. Yemekle birlikte alınması ilacın vücudunuzda yeterli düzeye ulaşabilmesini sağlar.

SIRTURO kullanırken alkol almayınız.

### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.*

SIRTURO kesin olarak gerekli görülmediği sürece gebelik sırasında kullanılmamalıdır.

Hamileyseniz, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız, bu ilacı kullanmadan önce doktor veya eczacınıza danışınız.

*Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

### **Emzirme**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.*

SIRTURO'nun etkin maddesi olan bedakuilin'in anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emziriyorsanız, bu ilacı kullanmadan önce doktor veya eczacınıza danışınız.

### **Araç ve makine kullanımı**

SIRTURO kullandıktan sonra baş dönmesi hissedebilirsiniz. Bu durumda araç veya makine kullanmayınız.

### **SIRTURO'nun içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

SIRTURO, 145 mg laktoz (monohidrat olarak) içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı tahammülsüzlüğünüz olduğu söylenmişse ya da bazı şekerleri sindiremiyorsanız bu ilacı almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

### **Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

Diğer ilaçlar SIRTURO'yu etkileyebilir. Başka bir ilaç kullanıyorsanız, yakın zamanda kullandıysanız veya kullanma ihtimaliniz varsa doktorunuz veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Aşağıda, birçok ilaca dirençli tüberküloz hastalarının kullanabileceği ve SIRTURO ile potansiyel olarak etkileşime girebilecek ilaçların örnekleri verilmiştir:

<b>İlaç (etkin maddenin adı)</b>	<b>İlacın kullanım amacı</b>
rifampisin, rifapentin, rifabutin	tüberküloz benzeri bazı enfeksiyonların tedavisi (antimikobakteriyel)
ketokonazol, flukonazol	mantar enfeksiyonlarının tedavisi (antifungaller)
efavirenz, etravirin, lopinavir/ritonavir	HIV enfeksiyonunun tedavisi (antiretroviral nükleosit olmayan ters transkriptaz inhibitörleri, antiretroviral proteaz inhibitörleri)
klofazimin	cüzzam benzeri bazı enfeksiyonların tedavisi (antimikobakteriyel)
karbamazepin, fenitoin	sara nöbetlerinin tedavisi (antikonvülsanlar)
St. John's wort ( <i>Hypericum perforatum</i> )	anksiyeteyi rahatlatmak için kullanılan bitkisel bir ürün
siprofloksasin, eritromisin, klaritromisin	bakteriyel enfeksiyonların tedavisi (antibakteriyeller)

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız, son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### **3. SIRTURO nasıl kullanılır?**

SIRTURO'yu her zaman doktorunuzun ve eczacınızın size söylediđi şekilde kullanınız. Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

SIRTURO, tüberkülozu tedavi etmek için her zaman tüberküloz tedavisinde kullanılan diđer ilaçlarla birlikte kullanılmalıdır. Doktorunuz, SIRTURO ile kullanmanız gereken diđer ilaçlara karar verecektir.

#### **Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığına ilişkin talimatlar:**

SIRTURO'yu 24 haftalık bir süre boyunca kullanınız.

##### **İlk 2 hafta:**

- **Günde bir kez** 400 mg (4 adet 100 mg tablet) alınız.

##### **3. hafta ile 24. hafta arasında:**

- **Her hafta** yalnızca **3 gün** günde bir kez 200 mg (2 adet 100 mg tablet) alınız.
- SIRTURO'yu alma zamanlarınız arasında en az 48 saat olmalıdır. Örneđin, SIRTURO'yu 3. haftadan itibaren her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cuma alabilirsiniz.

Tüberküloza yönelik diđer ilaçlarınızı 24 haftadan uzun süreyle kullanmaya devam etmeniz gerekebilir. Doktor veya eczacınıza danışınız.

#### **Uygulama yolu ve metodu:**

- SIRTURO'yu yemekle birlikte alınız. Vücudunuza doğru miktarda ilaç almak için SIRTURO'yu yemek ile birlikte almak önemlidir.
- Tabletleri bütün olarak suyla yutunuz.

#### **Deđişik yaş grupları**

##### **Çocuklarda kullanımı:**

SIRTURO çocuklarda ve ergenlerde (18 yaşın altındaki) incelenmediğinden, bu yaş grubunda kullanılmamalıdır.

**Yaşlılarda kullanımı:**

SIRTURO'nun yaşlı hastalarda kullanımına ilişkin sınırlı veri bulunmaktadır. Yaşlı hastalarda kullanım için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

**Özel kullanım durumları:****Böbrek yetmezliği:**

Hafif veya orta şiddette böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir. Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda SIRTURO dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır.

**Karaciğer yetmezliği:**

Hafif veya orta şiddette karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir. Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda SIRTURO kullanımı araştırılmadığından bu hastalarda kullanımı önerilmemektedir.

**Kullanmanız gerekenden daha fazla SIRTURO kullandıysanız:**

Kullanmanız gerekenden daha fazla SIRTURO kullandıysanız, derhal doktorunuzla konuşunuz. İlaç ambalajını yanınızda bulundurunuz.

*SIRTURO'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız doktor veya eczacınız ile konuşunuz.*

**SIRTURO'yu kullanmayı unutursanız:****İlk 2 hafta sırasında SIRTURO'yu kullanmayı unutursanız:**

- Unutulan dozu atlayarak sonraki dozu normal bir şekilde alınız.
- Unuttuğunuz dozu telafi etmek için çift doz almayınız.

**3. haftadan itibaren SIRTURO'yu kullanmayı unutursanız:**

- En yakın sürede unutulan 200 mg dozu alınız.
- Haftada üç kez programına devam ediniz.

Bir dozu unuttuysanız ve ne yapacağınızdan emin değilseniz, doktorunuz veya eczacınızla konuşunuz.

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

## **SIRTURO ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler**

Doktorunuzla konuşmadan SIRTURO kullanmayı bırakmayınız.

Dozların aksatılması veya tam tedavi süresinin tamamlanmaması:

- tedavinizi etkisiz bir hale getirebilir ve tüberkülozunuz daha da kötüleşebilir ve
- bakterilerin ilaca dirençli hale gelme olasılığını artırabilir. Bu, hastalığınızın gelecekte SIRTURO veya diğer ilaçlarla tedavi edilemeyebileceği anlamına gelmektedir.

Bu ilacın kullanımına ilişkin başka sorunuz olursa, doktor, eczacı veya hemşirenize sorunuz.

*Eğer SIRTURO'nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

## **4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi, SIRTURO'nun içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın:	10 hastanın en az 1'inde görülebilir.
Yaygın:	10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan:	100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek:	1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Çok seyrek:	10.000 hastanın birinden az görülebilir.

### **Çok yaygın**

- Baş ağrısı
- Eklem ağrısı
- Baş dönmesi
- Hasta hissetme (bulantı veya kusma).

### **Yaygın:**

- İshal
- Yüksek karaciğer enzimleri (kan testlerinde görülen)

- Egzersizin dışında ağrı veya kas ağrısı
- Elektrokardiyogram üzerinde anormal değerler ("QT uzaması"). Bayılmanız durumunda derhal doktorunuza söyleyiniz.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız ya da yan etkilerden herhangi biri ciddileşirse doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

#### Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri [www.titck.gov.tr](http://www.titck.gov.tr) sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

#### **5. SIRTURO'nun saklanması**

*SIRTURO'yu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

*25°C'nin altında oda sıcaklığında saklayınız. Işıktan korumak için orijinal ambalajında saklayınız.*

#### **Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız**

*Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra SIRTURO'yu kullanmayınız. Son kullanma tarihi belirtilen ayın son gününü ifade eder.*

*Bu ilaç çevreye zararlı olabilir. Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız SIRTURO'yu şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız.*

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz

**Ruhsat sahibi:** Johnson and Johnson Sıhhi Mal. San. ve Tic. Ltd. Şti.  
Ertürk Sok.-Keçeli Plaza No:13 34810 Kavacık/Beykoz/İstanbul  
Tel: 0216 538 20 00



***Üretim yeri:*** Recipharm Pharmservices Private Limited  
34th KM, Tumkur Road,  
Teppada Begur, 562 123  
Nelamangala Taluk/Bangalore/Hindistan

*Bu kullanma talimatı ..../... tarihinde onaylanmıştır.*