

## KULLANMA TALİMATI

### **BENZYDEX % 0.15 oral sprey, çözelti** **Haricen uygulanır.**

**Etkin madde:** Her 1 ml çözelti; 1.5 mg Benzidamin HCl içerir. Bir püskürtme 0.18 ml'dir ve 0.27 mg benzidamin HCl içerir.

**Yardımcı maddeler:** Gliserin, etanol, metil paraben (E218), nane aroması, sodyum sakarin, patent mavisi (E131), kinolin sarısı (E104), sodyum bikarbonat, polioksil 40 hidrojenize hint yağı ve deiyonize su içerir.

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. ***BENZYDEX nedir ve ne için kullanılır?***
2. ***BENZYDEX' i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler***
3. ***BENZYDEX nasıl kullanılır?***
4. ***Olası yan etkiler nelerdir?***
5. ***BENZYDEX' in saklanması***

### **Başlıkları yer almaktadır.**

#### **1. BENZYDEX nedir ve ne için kullanılır?**

BENZYDEX, yangı önleyici ve ağrı kesici özelliklere sahip bir ilaçtır. Boğaz, ağız ve diş etlerinin iltihaplanmasına (enflamasyonuna) bağlı ağrıyı yatıştırır.

BENZYDEX, 30 ml sıvı içeren, koyu renkli şişelerde sunulur. Berrak, yeşil renkli sıvı görünümündedir. Nane esanslıdır.

BENZYDEX;

- Ağız ve boğazda ağrıyla seyreden diş eti iltihabı, ağzı, yutağı ve boğazı çevreleyen dokunun iltihabı
- Hastanın yutma fonksiyonunun rahatlatılması ve diş eti rahatsızlıklarında gözlenen bulguların azaltılması ve
- Diş ve çevre dokuların cerrahi girişimlerden sonra ağrı ve iltihabı gidermek amacıyla kullanılır.

#### **2. BENZYDEX' i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

##### **BENZYDEX' i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

- Eğer BENZYDEX' in herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlıysanız

## **BENZYDEX' i ařađıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

- Gzlerle temasından kaınınız.
- BENZYDEX' in tavsiye edilen dozu (1 defada 4 pskrtme: 1.08 mg; gnde 6 defa 6.48 mg) ađızdan alınan dozun yaklaşık 20'de biridir. Bu sebeple, sistemik ařırı doz ve toksisite durumunun sz konusu olmadığını gz nnde bulundurunuz.
- Kısa sreli tedaviden sonra iyileřme grlmezse doktorunuza danıřınız.
- Uzun sreli kullanıldıđında hassaslařma durumuna neden olabilir; byle bir durumda ilacı kullanmayı bırakıp doktorunuza haber veriniz.
- Sınırlı sayıdaki hastada ađız bořluđu ve yutak blgesindeki yaralar ciddi hastalıkların belirtisi olabilir. Bu nedenle, belirtilerin 3 gnden daha uzun srdđu durumlarda doktorunuza veya diř hekiminize bařvurunuz.
- Aspirin (asetilsalisilik asit) veya diđer steroid olmayan iltihap giderici (NSAİİ) ilalara karřı ařırı duyarlılıđınız varsa bu konuda doktorunuzu bilgilendiriniz.
- Gemiřte bronřiyal astım nbetleri geirdiyseniz BENZYDEX kullanırken dikkatli olunuz. nk soluk borunuzun akciđere giden kanallarında (bronřlarınızda) daralma oluřabilir.
- BENZYDEX, zellikle gargara yapma gclđu eken hastalar iin uygundur.
- Spor yapanlarda etanol ieren ilaların kullanılması, bazı spor federasyonları tarafından msaade edilen alkol konsantrasyonlarının sınırlarına gre doping testinde pozitif sonulara neden olabilir.

Bu uyarılar gemiřteki herhangi bir dnemde dahi olsa sizin iin geerliyse ltfen doktorunuza danıřınız.

### **BENZYDEX' in yiyecek ve iecek ile kullanılması**

BENZYDEX' in yiyecek ve ieceklerle etkileřimi yoktur.

### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

Hamilelikte yeterli sayıda alıřma olmadığından kullanılmamalıdır.

*Tedaviniz sırasında hamile olduđunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

### **Emzirme**

*İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

Emziren kadınlarda yeterli sayıda alıřma olmadığından emzirme dneminde kullanılmamalıdır.

### **Ara ve makine kullanımı**

BENZYDEX' in nerilen dozlarda haricen kullanımı ara veya makine kullanma yeteneđini olumsuz ynde etkilemez.

### **BENZYDEX' in ieriđinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında nemli bilgiler**

- BENZYDEX' in ieriđinde bulunan metil paraben (E218) alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiř) sebebiyet verebilir.
- BENZYDEX' in ieriđinde bulunan polioksil 40 hidrojenize hint yađı, deri reaksiyonlarına sebep olabilir.
- BENZYDEX' in ieriđinde bulunan gliserin, etanol ve sodyum kullanım yolu nedeniyle herhangi bir uyarı gerektirmez.
- Bu tıbbi rn az miktarda - her dozda 100 mg'dan az - etanol (alkol) ierir.

### **Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

BENZYDEX ile diğer ilaçlar arasında bilinen bir etkileşim mevcut değildir.

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### **3. BENZYDEX nasıl kullanılır?**

#### **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

Yetişkinlerde: Günde 2-6, kez 4-8 püskürtme şeklinde uygulayınız.

Önerilen dozları aşmayınız.

Tedavi süresi ortalama 4-5 gündür. Bu süreç içerisinde olumlu sonuç almadığınız takdirde doktorunuza danışınız. Doktorunuz BENZYDEX ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

#### **Uygulama yolu ve metodu:**

- İlk kullanımda düzenli bir püskürtme elde edinceye kadar pompalama düğmesine birkaç kez basın,
- Ağızınızı iyice açın ve sprey borusunu ağızınıza sokarak hastalıklı bölgeye doğru yönlendirin,
- İlacı püskürtmek için pompalama düğmesine süratle basın; bu işlemi yukarıda belirtilen sayılarda tekrarlayın,
- Şişeyi kutusuna yerleştirip dik duracak şekilde saklayın.

#### **Değişik yaş grupları:**

##### **Çocuklarda kullanımı:**

6 yaş ve üzerinde kullanılabilir.

6-12 yaş arasındaki çocuklarda: Günde 2-6 kez, 4 püskürtme şeklinde uygulanır.

##### **Yaşlılarda kullanımı:**

Yaşlı hastalarda kullanımına ilişkin özel bir durum bulunmamaktadır.

##### **Özel kullanım durumları:**

Özel kullanım durumları bulunmamaktadır.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

*Eğer BENZYDEX' in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuza veya eczacınıza ile konuşunuz.*

##### **Kullanmanız gerekenden daha fazla BENZYDEX kullandıysanız:**

Yanlışlıkla içilse dahi doz aşımı söz konusu değildir. Çocuklar yanlışlıkla içerse halüsinasyon, nöbet, uyarılma ve uyku hali görülebilir; belirtileri önlemeye yönelik tedavi uygulanır.

*BENZYDEX' den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

##### **BENZYDEX' i kullanmayı unutursanız**

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.*

##### **BENZYDEX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler**

Bilinmemektedir.

#### **4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi, BENZYDEX' in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

**Aşağıdakilerden biri olursa BENZYDEX' i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

Çok seyrek (10.000 hastada 1'den az) yan etkiler:

- Aşırı duyarlılık reaksiyonları (bu reaksiyonlar; kaşıntı, döküntü, kurdeşen ve bazen de hava yollarının etrafındaki kasların kasılması sebebiyle nefessiz kalma gibi belirtiler şeklinde görülebilir.)

Uzun süreli tedaviler, hassaslaşma durumlarına neden olabilir. Her iki durumda da bu ilacı kullanmayı bırakıp doktorunuza danışınız.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

#### Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri [www.titck.gov.tr](http://www.titck.gov.tr) sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

#### **5. BENZYDEX' in saklanması**

*BENZYDEX' i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

#### **Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BENZYDEX' i kullanmayınız.*

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

#### ***Ruhsat sahibi:***

Lilyum İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret Limited Şirketi  
Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. No: 8C/1 Ümraniye/İstanbul  
0 850 885 21 99 (Pbx)  
0 850 885 21 99 (Faks)  
[info@lilyumilac.com.tr](mailto:info@lilyumilac.com.tr)

#### ***Üretim yeri:***

Berko İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.  
Adil Mah. Yörükler Sok. No:2  
Sultanbeyli/İstanbul  
0 216 592 33 00 (Pbx)  
0 216 592 00 62 (Faks)

*Bu kullanma talimatı 24/04/2019 tarihinde onaylanmıştır.*