

KULLANMA TALİMATI

CANTHACUR® Topikal Solüsyon
7,5 ml solüsyon içeren cam şişe
Haricen uygulanır.

Etkin maddeler: %0.7 Kantaridin

Yardımcı maddeler: Etoşel, etoksietanol, kastor yağı, triton X-45, kollodion ve aseton

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- ✓ *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- ✓ *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- ✓ *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- ✓ *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- ✓ *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu kullanma talimatında:

1. CANTHACUR® nedir ve ne için kullanılır?
2. CANTHACUR®'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. CANTHACUR® nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. CANTHACUR® 'un saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. CANTHACUR® nedir ve ne için kullanılır?

CANTHACUR®, 7,5 ml solüsyon içeren cam şişede Kantaridin etkin maddesi içeren ve siğil tedavisi için haricen kullanılan bir ilaçtır. Özellikle vücudun değişik bölgelerindeki siğillerin tedavisinde kullanılır.

Yara izinin oluşmaması, ağrısız uygulama ve uygulama için herhangi bir özel alete ihtiyaç göstermemesi CANTHACUR®'un çocuklarda da kolayca uygulanmasını sağlar.

CANTHACUR® YALNIZCA DOKTOR TARAFINDAN UYGULANIR.

2. CANTHACUR®'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CANTHACUR®'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

- ✓ Eğer Kantaridin veya CANTHACUR®'un herhangi bir bileşenine aşın duyarlılık varsa
- ✓ Mozaik siğillerin (siğillerin birleşerek geniş siğil alanları oluşturması) tedavisinde

CANTHACUR®'u aşağıdaki durumlarda özellikle DİKKATLE KULLANINIZ

CANTHACUR® güçlü bir ilaçtır ve yalnızca doktor tarafından uygulanmalıdır. Doktorunuz tedavinin etkileri ve muhtemel sonuçları konusunda sizi bilgilendirecektir.

Şeker hastalarında veya kan dolaşımının zayıf olduğu hastalarda, benlerde, doğumsal cilt lekelerinde ve üzerinde kılların bulunduğu nadir siğillerde kullanılmaması önerilir. Geniş siğillerde, rahatsızlık fazla olabileceği ve ilacın emilim riski ortaya çıkabileceği için bir kaç seansta uygulama önerilir.

İletişim kuramayacak düzeyde küçük olan çocuklarda, ağrının kontrolü mümkün olamayacağı için kullanılmamalıdır.

Tedaviden sonraki birkaç saat süresince alkollü içeceklerin tüketilmesinden kaçınılmalıdır.

CANTHACUR® yiyecek ve içecek ile kullanılması

CANTHACUR® sadece haricen kullanılır. Yemeklerle ve içeceklerle bir ilgisi bulunmamaktadır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Hamilelikte kullanımına ilişkin yapılmış kontrollü çalışmalar bulunmamaktadır. Bu dönemde bütün ilaçların kullanımından sakınılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza başvurunuz.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde kullanımına ilişkin yapılmış kontrollü çalışmalar bulunmamaktadır. Bu dönemde bütün ilaçların kullanımından sakınılmalıdır.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanımı üzerine bilinen bir etkisi yoktur.

CANTHACUR®'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

CANTHACUR®'un içeriğinde bulunan yardımcı maddelere ilişkin önemli bir bilgi bulunmamaktadır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Deri üzerinde tahriş edici etki yapan ilaçlar ile eş zamanlı veya birbiri ardına kullanılmamalıdır. Kullanılma durumunda birkaç hafta ara verilmelidir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. CANTHACUR® nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:

**CANTHACUR® YALNIZ DOKTOR TARAFINDAN KULLANILIR.
BU İLACI KENDİNİZ UYGULAMAYINIZ.**

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Uygulama yolu ve metodu:

CANTHACUR® yalnız doktor tarafından kullanılır. Bu nedenle uygulama yolu ve metodunu doktorunuz belirleyecektir.

Değişik yaş gruplarında kullanım**Çocuklarda kullanımı:**

İletişim kuramayacak düzeyde küçük olan çocuklarda, ağrının kontrolü mümkün olmayacağı için kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda kullanımı ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır.

Özel kullanım durumları

Özel kullanım durumlarına ilişkin bir bilgi yoktur.

Eğer CANTHACUR®'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CANTHACUR® kullandıysanız

CANTHACUR® güçlü bir ilaçtır ve hem siğilli bölgede hem normal cilt veya mukoza bölgelerinde önerilen miktardan fazla uygulandığında içi su dolu kesecikler ve ülserler oluşabilir.

CANTHACUR® yalnız doktorunuz tarafından uygulanan bir ilaç olduğu için uygulama miktarına doktorunuz karar verecektir.

CANTHACUR®'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

CANTHACUR® kullanmayı unutursanız

Tedavi zamanları ve uygulama için yalnız doktorunuza danışınız.

CANTHACUR® yalnızca doktor tarafından kullanılır. Bu ilacı kendiniz uygulamayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

CANTHACUR® ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Özel bir etki beklenmemektedir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, CANTHACUR® içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Seyrek: Küçük bir hasta gurubunda CANTHACUR® tedavisinden sonra halka şeklinde siğil geliştiği rapor edilmiştir. Bu siğiller yüzeyseldir ve bazı hastaların dikkatini çekse de bir sorun oluşturmaz. Tedavi, hastanın güveninin sağlanarak yeniden CANTHACUR® tedavisinin veya başka uygun bir tedavinin yapılmasıdır.

İlaçlı bant ile beraber CANTHACUR®'un kullanıldığı bir hastada lenf damarlarında iltihaplanma rapor edilmiştir.

Not: CANTHACUR® güçlü bir ilaçtır ve normal cilt veya mukoza bölgeleri ile temas ederse içi su dolu kesecikler oluşabilir. Deri üzerine dökülürse, hemen yıkayın, alkol, aseton veya kaldırıcı band kullanarak ilacın bölgeden uzaklaşmasını sağlayın. Ilık sabunlu su ile iyice yıkayıp durulayın. Mukozaya ve göze temas ederse, su ile hemen yıkayın. İlacın cilt bölgesinden uzaklaşmasını sağlayacak şekilde 15 dakika boyunca su ile yıkamaya devam edin.

Bunlar CANTHACUR®'un hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında değinilmeyen herhangi bir yan etki fark ederseniz lütfen doktorunuza ya da eczacınıza bildirin.

5. CANTHACUR®'un saklanması

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C'nin altında oda sıcaklığında muhafaza ediniz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CANTHACUR®'u kullanmayınız.

Eğer üründe ve /veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz CANTHACUR®'u kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi: ASSOS İlaç, Kimya, Gıda Ürünleri Üretim ve Tic. A.Ş.
Aşağı Dudullu Mah. Tosya Cad. No:5, 34773 Ümraniye, İstanbul

Üretim Yeri: Paladin labs. Inc. (Pharmascience şirketinin alt grubudur) adına
Entreprise Importfab Inc., 50 Hymus Boul., Pointe Claire,
Quebec, Kanada

Bu kullanma talimatı.....tarihinde onaylanmıştır.