

1. KULLANMA TALİMATI

Bu tıbbi ürünü kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI'nın tümünü dikkatlice okuyunuz.

- Bu kullanma talimatını muhafaza ediniz. Tekrar okumanız gerekebilir.
- Eğer başka sorularınız varsa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.
- Bu tıbbi ürün reçetesiz satılmaktadır. Bununla birlikte, ondan en iyi sonucu elde etmek için ZADE VİTAL CORVİTAL'ı yine de dikkatlice kullanmanız gerekir.
- Eğer daha fazla bilgi veya tavsiyeye ihtiyaç duyarsanız doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.
- Eğer semptomlarınız kötüleşir ya da düzelmezse bir doktora görünmelisiniz.

Bu kullanma talimatında:

1. ZADE VİTAL CORVİTAL nedir ve ne için kullanılır
2. ZADE VİTAL CORVİTAL'ı kullanmaya başlamadan önce
3. ZADE VİTAL CORVİTAL nasıl kullanılmalı
4. Olası yan etkileri
5. ZADE VİTAL CORVİTAL'in saklanması
6. Diğer bilgiler

ZADE VİTAL CORVİTAL 625 mg Yumuşak Kapsül

Ağızdan alınır.

- Etkin madde: Her bir yumuşak kapsül 625 mg keten (*Linum usitatissimum* L.) tohumu yağı (Oleum Lini) içerir.
- Yardımcı maddeler: dl α - tokoferol, dl α - tokoferil asetat, jelatin, saf su, gliserin

Ruhsat sahibi: Helvacızade Gıda İlaç Kimya San. ve Tic. A.Ş.

Üretici: Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.

1.1. ZADE VİTAL CORVİTAL Nedir ve Ne İçin Kullanılır

- ZADE VİTAL CORVİTAL şeffaf sarımsı renkte, oblong şeklinde yumuşak bir kapsüldür.
- Her bir yumuşak kapsül 625 mg keten tohumu yağı içerir.
- Kutu içerisinde 10 kapsüllük 6 PVC/Al blister ambalajlarda toplam 60 yumuşak kapsül bulunur.
- ZADE VİTAL CORVİTAL, bitkisel kaynaklı Omega 3 yağ asidi olan alfa-linolenik asit (ALA) içeriğinden zengindir. Kronik kabızlığı olan hastalarda tedaviye yardımcı, olarak kullanılabilir. Ayrıca kalp-damar sistemi hastalıklarında, bazı kan lipid seviyelerinin düzenlenmesinde ve hafif gastrointestinal rahatsızlıklarda tedaviye yardımcıdır.

- ZADE VİTAL CORVİTAL, balık yağı kullanamayan kişilerde özellikle vejetaryenlerde bitkisel omega 3 (ALA) kaynağı olarak da kullanılabilir.

1.2. ZADE VİTAL CORVİTAL'İ Kullanmaya Başlamadan Önce

ZADE VİTAL CORVİTAL'in bebeklere, çocuklara veya yetişkinlere yönelik olduğuna dair bilgi

ZADE VİTAL CORVİTAL, 12 yaş üstü çocuklara ve erişkinlere yönelik bir üründür. 12 yaşın altında kullanılmamalıdır.

Aşağıdaki durumlarda ZADE VİTAL CORVİTAL'i kullanmayınız:

Eğer;

- Etkin madde'ye veya ZADE VİTAL CORVİTAL'in herhangi bir bileşenine aşırı duyarlıysanız,
- Hamile iseniz,
- Emziriyor iseniz,
- Karaciğer ve böbrek yetmezliğiniz varsa.

Aşağıdaki durumlarda ZADE VİTAL CORVİTAL'i özellikle dikkatli kullanınız:

Eğer;

- Kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsanız, bu durumda ZADE VİTAL CORVİTAL'den en fazla 4 kapsül kullanmalısınız.
- Hormona bağlı tümörlerin tedavisi esnasından östrojenik etkisinden dolayı dikkatli kullanılmalıdır.
- Barsak hareketlerinin sinirsel olarak yavaşlamasından dolayı oluşan barsak tıkanması (paralitik ileus) durumlarında dikkatli kullanılmalıdır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ZADE VİTAL CORVİTAL'in etkisine tesir edebilecek besinlerle ve içeceklerle birlikte kullanılması

ZADE VİTAL CORVİTAL'in besinlerle birlikte alınmasının emilim üzerinde herhangi bir etkisi olduğu yönünde bir bilgi olmamakla beraber, tıbbi ürünün yemeklerden bir süre sonra alınması önerilir.

Gebelik

Bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

ZADE VİTAL CORVİTAL'e başlamadan önce hamile olmadığınızdan emin olmalısınız.

Hamilelik süresince ya da hamile olduğunuzdan kuşkulaniyorsanız ZADE VİTAL CORVİTAL kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

Bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde ZADE VİTAL CORVİTAL kullanmayınız.

Araç ve makine kullanma:

ZADE VİTAL CORVİTAL'in motorlu taşıt ya da makineleri kullanma yetisi üzerine yapılmış bir çalışması bulunmamaktadır.

ZADE VİTAL CORVİTAL'in bazı bileşenleri hakkında önemli bilgiler:

Her bir kapsül 0,161 g gliserin içermektedir. Ancak bu dozda gliserine bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

ZADE VİTAL CORVİTAL ile birlikte diğer tıbbi ürünleri kullanmak

Günümüze kadar diğer ilaçlar veya tıbbi ürünlerle etkileşimi üzerine bir çalışma bulunmamaktadır. Ancak kan sulandırıcı ilaç (antikoagülan) kullanıyorsanız, bu durumda ZADE VİTAL CORVİTAL'den günde en fazla 4 kapsül kullanmalısınız.

Östrojenik etkisinden dolayı hormona bağlı tümörlerin tedavisi esnasında dikkatli kullanılmalıdır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

1.3. ZADE VİTAL CORVİTAL Nasıl Kullanılmalı

ZADE VİTAL CORVİTAL'i kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz, emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Doktorunuz tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde:

- ZADE VİTAL CORVİTAL erişkinler için (18 yaş üstü) olağan günlük doz yemeklerden sonra günde 2-4 kez bir kapsüldür.
- 12 yaş üstü çocuklar için günlük doz yemeklerden sonra günde 1-2 kapsüldür.

Uygulama yolu ve metodu:

ZADE VİTAL CORVİTAL'i ağızınızda, çiğnmeden ve ezmeden yemeklerden sonra bir bardak su ile yutunuz.

ZADE VİTAL CORVİTAL'in 1 haftadan daha uzun süreli kullanımının doktora danışılarak sürdürülmesi önerilmektedir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

ZADE VİTAL CORVİTAL, 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda doz ayarı gereksinimi tanımlanmamıştır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/ Karaciğer yetmezliği:

Böbrek/ karaciğer yetmezliği olan hastalarda ZADE VİTAL CORVİTAL kullanılmamalıdır.

Eğer ZADE VİTAL CORVİTAL'in etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğu izlenimine sahipseniz doktorunuza veya eczacınıza bildirin.

Eğer kullanmanız gerekenden fazla ZADE VİTAL CORVİTAL kullanırsanız:

ZADE VİTAL CORVİTAL'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ZADE VİTAL CORVİTAL'i kullanmayı unutursanız:

Unuttuğunuz dozu tamamlamak için çift doz almayınız.

ZADE VİTAL CORVİTAL ile tedavi kesildiğinde görülen etkiler:

ZADE VİTAL CORVİTAL ile tedavi kesildiğinde herhangi bir olumsuz etkinin ortaya çıkması beklenmemektedir.

1.4. Olası Yan Etkileri

Tüm ilaçlar gibi ZADE VİTAL CORVİTAL’ın da yan etkileri olabilir.

Eğer bu kullanma talimatında değinilmeyen herhangi bir yan etki fark ederseniz, lütfen doktorunuzu ya da eczacınızı bildiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonunu tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinmesine katkı sağlamış olacaksınız.

1.5. ZADE VİTAL CORVİTAL’in Saklanması

ZADE VİTAL CORVİTAL’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25⁰C’nin altındaki oda sıcaklığında, orijinal ambalajında saklayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ZADE VİTAL CORVİTAL’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki/blisterdeki son kullanma tarihinden sonra ZADE VİTAL CORVİTAL’i kullanmayınız.

1.6. Diğer Bilgiler

Ruhsat Sahibi:
Helvacıyade Gıda İlaç Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Fevzi Çakmak Mah.
Ankara Yolu 6. km
42050 Karatay/KONYA/TÜRKİYE
Tel : (0332) 346 05 20
Faks : (0332) 346 05 29
e-mail : zade@zade.com.tr

Üretim Yeri:
Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Osmangazi Cad. No:156
Sancaktepe / İSTANBUL /TÜRKİYE

1.7. Bu Kullanma Talimatının Son Onay (Tarihi)

Bu kullanma talimatı XX.XX.201X tarihinde onaylanmıştır.

1.8. ZADE VİTAL CORVİTAL'in sadece eczanelerde satılacağına dair uyarı

SADECE ECZANELERDE SATILIR.