

1. KULLANMA TALİMATI

Bu tıbbi ürünü kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI'nın tümünü dikkatlice okuyunuz.

- Bu kullanma talimatını muhafaza ediniz. Tekrar okumanız gerekebilir.
- Eğer başka sorularınız varsa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.
- Bu tıbbi ürün reçetesiz satılmaktadır. Bununla birlikte, ondan en iyi sonucu elde etmek için ZADE VİTAL PUNİMİN'i yine de dikkatlice kullanmanız gerekir.
- Eğer daha fazla bilgi veya tavsiyeye ihtiyaç duyarsanız doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.
- Eğer semptomlarınız kötüleşir ya da düzelmezse bir doktora görünmelisiniz.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ZADE VİTAL PUNİMİN nedir ve ne için kullanılır
2. ZADE VİTAL PUNİMİN'i kullanmadan önce
3. ZADE VİTAL PUNİMİN nasıl kullanılmalı
4. Olası yan etkileri
5. ZADE VİTAL PUNİMİN'in saklanması
6. Diğer bilgiler

ZADE VİTAL PUNİMİN 400 mg Yumuşak Kapsül

Ağızdan alınır.

- Etkin madde: Her bir yumuşak kapsül 400 mg nar (*Punica granatum*) tohumu yağı içerir.
- Yardımcı maddeler: dl α - tokoferol, dl α - tokoferil asetat, jelatin, gliserin, saf su

Ruhsat sahibi: Helvacıade Gıda İlaç Kimya San. ve Tic. A.Ş.

Üretici: Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.

1.1. ZADE VİTAL PUNİMİN Nedir ve Ne İçin Kullanılır

- ZADE VİTAL PUNİMİN sarımsı renkte, oblong şeklinde yumuşak bir kapsüldür.
- Her bir yumuşak kapsül 400 mg nar (*Punica granatum*) tohumu yağı içerir.
- Kutu içinde, 15 kapsüllük 4 PVC/Al blister ambalajlarda toplam 60 yumuşak kapsül bulunur.
- ZADE VİTAL PUNİMİN, antioksidan özelliğinden dolayı bağışıklık sistemini güçlendirici olarak sağlığın korunmasında, ayrıca trigliserit olarak bilinen kan yağlarının düşürülmesine yardımcı olarak kullanılır.

1.2. ZADE VİTAL PUNİMİN’i Kullanmaya Başlamadan Önce

ZADE VİTAL PUNİMİN’in bebeklere, çocuklara veya yetişkinlere yönelik olduğuna dair bilgi

ZADE VİTAL PUNİMİN, 12 yaş üstü çocuklara ve erişkinlere yönelik bir üründür. 12 yaşın altında kullanılmamalıdır.

Aşağıdaki durumlarda ZADE VİTAL PUNİMİN’i kullanmayınız:

Eğer;

- Etkin madde’ye veya ZADE VİTAL PUNİMİN’in herhangi bir bileşenine aşırı duyarlıysanız,
- Hamile ve emziriyor iseniz,
- Karaciğer ve böbrek yetmezliğiniz varsa.

Aşağıdaki durumlarda ZADE VİTAL PUNİMİN’i özellikle dikkatli kullanınız:

Günümüze kadar ZADE VİTAL PUNİMİN’in dikkatle kullanımına ilişkin herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

ZADE VİTAL PUNİMİN’in etkisine tesir edebilecek besinlerle ve içeceklerle birlikte kullanılması

ZADE VİTAL PUNİMİN’in besinlerle birlikte alınmasının emilim üzerinde herhangi bir etkisi olduğu yönünde bir bilgi olmamakla beraber, kapsüllerin yemeklerden bir süre sonra alınması önerilir.

Gebelik

Bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

ZADE VİTAL PUNİMİN’e başlamadan önce hamile olmadığınızdan emin olmalısınız.

Hamilelik süresince ya da hamile olduğunuzdan kuşkulaniyorsanız ZADE VİTAL PUNİMİN kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

Bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde ZADE VİTAL PUNİMİN kullanmayınız.

Araç ve makine kullanma:

ZADE VİTAL PUNİMİN'in motorlu taşıt ya da makineleri kullanma yetisi üzerine yapılmış bir çalışması bulunmamaktadır.

ZADE VİTAL PUNİMİN'in bazı bileşenleri hakkında önemli bilgiler:

Her bir kapsül 0,0805 g gliserin içermektedir. Ancak bu dozda gliserine bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

ZADE VİTAL PUNİMİN ile birlikte diğer tıbbi ürünleri kullanmak

Günümüze kadar diğer ilaçlar veya tıbbi ürünlerle etkileşimi üzerine bir çalışma bulunmamaktadır. Ancak kan sulandırıcı (antikoagülan) ilaç kullanıyorsanız, bu durumda ZADE VİTAL PUNİMİN'i en fazla 3 g/gün olarak kullanmalısınız.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

1.3. ZADE VİTAL PUNİMİN Nasıl Kullanılmalı

ZADE VİTAL PUNİMİN'i kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz, emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Doktorunuz tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde:

- ZADE VİTAL PUNİMİN, erişkinlerde günde bir veya iki yumuşak kapsül kullanılmalıdır.

Uygulama yolu ve metodu:

ZADE VİTAL PUNİMİN'i ağızınızda, çiğnmeden ve ezmeden yemeklerden sonra bir bardak su ile yutunuz.

2 aydan uzun süreli kullanımının doktora danışılarak sürdürülmesi önerilmektedir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

ZADE VİTAL PUNİMİN, 12 yaş altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda doz ayarı gereksinimine ilişkin çalışma yapılmamıştır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/ Karaciğer yetmezliği:

Böbrek/ Karaciğer yetmezliği olan hastalarda ZADE VİTAL PUNİMİN kullanılmamalıdır. Eğer ZADE VİTAL PUNİMİN'in etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izlemeniz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Eğer kullanmanız gerekenden fazla ZADE VİTAL PUNİMİN kullanırsanız:

ZADE VİTAL PUNİMİN'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya bir eczacınız ile konuşunuz.

ZADE VİTAL PUNİMİN'i kullanmayı unutursanız:

Unuttuğunuz dozu tamamlamak için çift doz almayınız.

ZADE VİTAL PUNİMİN ile tedavi kesildiğinde görülen etkiler:

ZADE VİTAL PUNİMİN ile tedavi kesildiğinde herhangi bir olumsuz etkinin ortaya çıkması beklenmemektedir.

1.4. Olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi ZADE VİTAL PUNİMİN'in de yan etkileri olabilir.

Eğer bu kullanma talimatında değinilmeyen herhangi bir yan etki fark ederseniz, lütfen doktorunuzu ya da eczacınızı bildiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonunu tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinmesine katkı sağlamış olacaksınız.

1.5. ZADE VİTAL PUNİMİN'in Saklanması

ZADE VİTAL PUNİMİN'i *çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

25⁰C'nin altındaki oda sıcaklığında, saklayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ZADE VİTAL PUNİMİN'i kullanmayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki/blisterdeki son kullanma tarihinden sonra ZADE VİTAL PUNİMİN'i kullanmayınız.

1.6. Diğer Bilgiler

Ruhsat Sahibi:

Helvacızade Gıda İlaç Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Fevzi Çakmak Mah.
Ankara Yolu 6. Km
42050 Karatay/KONYA/TÜRKİYE
Tel: (0332) 346 05 20
Faks: (0332) 346 05 29
e-mail: zade@zade.com.tr

Üretim Yeri: Biofarma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Akpınar Mah. Osmangazi Cad. No:156
Sancaktepe / İSTANBUL

Bu kullanma talimatı XX.XX.201X tarihinde onaylanmıştır.

1.7. Bu Kullanma Talimatının Son Onay (Tarihi)

Bu kullanma talimatı XX.XX.201X tarihinde onaylanmıştır.

1.8. ZADE VİTAL PUNİMİN'in sadece eczanelerde satılacağına dair uyarı

SADECE ECZANELERDE SATILIR.