

KULLANMA TALİMATI

OCUBRAX steril göz damlası Göze uygulanır.

- **Etkin maddeler:**
Tobramisin
Diklofenak sodyum
Çözelti %0.1 Diklofenak sodyum ve %0.3 Tobramisin içerir.
- **Yardımcı maddeler:**
Tiomersal, disodyum edetat, sodyum klorür, boraks (dekahidrat sodyum tetraborat), polioksil hint yağı, sülfürik asit ve/veya sodyum hidroksit, saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **OCUBRAX nedir ve ne için kullanılır?**
2. **OCUBRAX'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **OCUBRAX nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **OCUBRAX'ın saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. OCUBRAX nedir ve ne için kullanılır?

- OCUBRAX, biri iltihap önleyici, biri antibiyotik olmak üzere iki etkin madde içeren çözelti şeklinde bir göz damlasıdır. Göz enfeksiyonlarına neden olan bir çok mikroorganizmaya karşı etkilidir.
- OCUBRAX, eş zamanlı oluşan bakteriye bağlı göz enfeksiyonunda veya enfeksiyon riskinin yüksek olduğu katarakt ameliyatında gözün ön bölümündeki iltihabın önlenmesinde veya tedavisinde kullanılır.
- OCUBRAX 5 ml plastik şişe içinde bulunan, göz damlası formunda bir ilaçtır.

2. OCUBRAX'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

OCUBRAX'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

- Etkin maddelere ya da yardımcı maddelere aşırı duyarlılığınız varsa,
- Gözünüzün ön yüzeyinde aktif yaralarla birlikte virüse bağlı göz iltihabınız varsa,
- Asetilsalisilik asit ya da başka iltihap önleyici ilaçların kullanımından sonra ortaya çıkan astım krizi, kurdeşen veya kısa sürede ani gelişen nezleniz olduysa kullanmayınız.
- OCUBRAX, içerdiği sodyum borat nedeniyle 3 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.
- Hamile iseniz lütfen "Hamilelik" bölümünü okuyunuz.

OCUBRAX'ı ařađıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

- Eđer tobramisin dıřındaki diđer antibiyotiklere, asetilsalisilik aside, fenil asetik asit turevlerine veya diđer iltihap giderici ilaçlara karřı alerjiniz varsa, OCUBRAX'a karřı da alerjiniz olabilir. Bu konuda doktorunuza danıřınız.
- "OCUBRAX'ın ieriđinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler" bölümünü okuyunuz.
- Antibiyotiklerin uzun süreli kullanımı mantar dahil duyarlı olmayan organizmaların artıřına neden olabilir. Böyle bir durumdan řüphelenirseniz doktorunuza danıřınız.

Bu uyarılar, gemiřteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin iin geerliyse lütfen doktorunuza danıřınız.

OCUBRAX'ın yiyecek ve iecek ile kullanılması

Uygulama yöntemi aısından OCUBRAX'ın yiyecek ve iecekler ile etkileřimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

OCUBRAX'ı hamileliđinizin 6.ayından sonra kullanmayınız. Hamileliđinizin ilk 6 ayı süresince doktorunuz gerekli görmedike kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduđunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Ara ve makine kullanımı

OCUBRAX, her göz damlası gibi, görmede bulanıklıđa neden olabilir. Bu durumlarda ara veya makine kullanmadan önce görmenizin netleřmesini bekleyiniz.

OCUBRAX'ın ieriđinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

- Bu ürün yardımcı madde olarak tiomersal iermektedir ve alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir. Eđer alerjikseniz veya daha önce ařı uygulamasından sonra herhangi bir problemle karřılařtıysanız doktorunuzu bilgilendiriniz.
- Tiomersal böbrek hasarına neden olabilir.
- Bu ürün sodyum borat iermektedir, alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir.
- İerdiđi sodyum borat nedeniyle 3 yařın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Diđer ilalar ile birlikte kullanımı

Bařka bir göz ilacını uygulamadan önce en az 5 dakika bekleyiniz.

Eđer reeteli ya da reetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. OCUBRAX nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklıđı iin talimatlar:

Eđer doktorunuz bařka türlü tavsiye etmediyse ařađıdaki talimatlara uyunuz.

Genel tedavide, etkilenen gözünüze veya gözlerinize günde 4 kez 2 damla damlatınız.

OCUBRAX tedavinizin süresine doktorunuz karar verecektir. Etkilenen gözünüzün iyileşme sürecini riske atabileceğinden tedaviyi daha erken bir sürede kesmeyiniz.

Uygulama yolu ve metodu:

OCUBRAX sadece göze uygulanmalıdır, bu yüzden göz damlası formundadır.

Göz damlasının doğru uygulanması için aşağıdaki adımları takip ediniz:

1. Ellerinizi yıkayınız ve mümkünse bir aynanın karşısına geçiniz.
2. Kabı açınız ve damlalığı herhangi bir yüzeye deşdirmemeye özen gösteriniz, bu, damlalığın enfekte olmasına neden olabilir.
3. Şişeyi bir elinizle ters çeviriniz.
4. Diğer elinizle etkilenen gözünüzün alt göz kapağını aşağı doğru çekiniz, kafanızı geriye yatırınız ve yukarı bakınız.
5. Damlalık ucunu deşdirmeden göze yaklaştırmınız, göz ve göz kapağınız arasındaki boşluğa damlatmak için şişeyi hafifçe sıkınız.
6. Alt göz kapağınızı serbest bırakınız ve göz yüzeyinin sıvıyla tamamen kaplandığına emin olmak için gözünüzü birkaç kez kırınız.
7. Eğer damlayı iki gözünüze de kullanmanız gerekiyorsa yukarıdaki adımları diğer gözünüz için de tekrarlayınız.
8. Kullandıktan hemen sonra kapağı sıkıca kapatınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Bu ürün sodyum borat içermektedir, 3 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda özel bir doz ayarlamasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek/Karaciğer yetmezliğinde özel bir doz ayarlamasına gerek yoktur.

Eğer OCUBRAX'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla OCUBRAX kullandıysanız:

OCUBRAX'tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Eğer kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, gözünüzü ılık suyla yıkayarak ilacı uzaklaştırabilirsiniz. Bu işlemten sonra ilacı tekrar uygulamayıp, diğer uygulama zamanınıza bekleyiniz.

OCUBRAX'ı kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Eğer uygulamayı unuttuysanız hatırladığınız zamanda damlanızı damlatıp, diğer uygulamalarınıza önceden kararlaştırılan zamanlarda devam ediniz.

OCUBRAX ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Tedaviyi önerilen zamandan önce keserseniz tedaviniz yetersiz kalacak ve gözünüzün iyileşme süreci uzayacaktır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi OCUBRAX'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Bu tıbbi ürün koruyucu olarak tiomersal içermektedir, dolayısıyla duyarlılık reaksiyonları ortaya çıkabilir.

Diklofenak sodyumun da dahil olduğu, iltihap giderici ajanlar içeren göz damlalarının kullanımı sırasında görmeyi etkileyecek ciddi istenmeyen etkiler çok seyrek olarak meydana gelebilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, OCUBRAX'ı kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Nefes darlığı,
- Astım benzeri durum.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise sizin OCUBRAX'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

- Tahriş,
- Yanma,
- Göz yaşarması,
- Yabancı cisim hissi.

Bunlar OCUBRAX'ın hafif yan etkileridir.

Bunların hepsi seyrek gözlenen hafif ve geçici etkilerdir, tedavinin kesilmesinden sonra kaybolur.

Zor bir göz cerrahisi geçirmiş, kornea (gözün ön yüzeyi) duyarlılığı kaybolmuş, kornea yüzeyi hasarlı olan, şeker hastalığı olan, romatizmaya bağlı eklem ağrıları olan veya yüzeysel göz hastalığı bulunan ve kısa bir süre içerisinde birden çok yüz cerrahisi geçirmiş olan hastalarda göz için tehdit oluşturabilen kornea (gözün ön yüzeyi) yan etkilerinin görülme riski daha yüksek olabileceğinden bu tür iltihap giderici göz ilaçları dikkatle kullanılmalıdır.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. OCUBRAX'ın saklanması

OCUBRAX'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C altındaki oda sıcaklıklarında, ağız sıkıca kapalı olarak saklayınız.

Uygulamadan hemen sonra şişeyi sıkıca kapatınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra OCUBRAX'ı kullanmayınız.

Açıldıktan sonra 1 ay içinde kullanınız.

Ruhsat sahibi:

Liba Laboratuvarları A.Ş., Otağtepe Cad. No:5 Kavacık, İstanbul

Üretici:

ALCON Cusi s.a., Camil Fabra 58, 08320 El Masnou Barselona, İspanya

Bu kullanma talimatı (--/--/----) tarihinde onaylanmıştır.