

## KULLANMA TALİMATI

**ETYOMİD 250 mg şeker kaplı tablet**  
Ağızdan alınır.

- **Etkin madde:** Her bir şeker kaplı tablet 250 mg Etionamid içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Mikrokristalin selüloz, laktoz (sığır kaynaklı), talk, magnezyum stearat, polivinilpirolidon, kroskarmellosz sodyum, sükröz, arap zımkı, titanyum dioksit, nişasta, FD&C Sarı No:6, şellak (*Laccifer lacca* böceđi kaynaklı reçine), polietilen glikol 6000.

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eđer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. **ETYOMİD nedir ve ne için kullanılır?**
2. **ETYOMİD' i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **ETYOMİD nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **ETYOMİD'in saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

#### **1. ETYOMİD nedir ve ne için kullanılır?**

ETYOMİD, antitüberkütotik etkili etionamid içerir. ETYOMİD'te yardımcı madde olarak kullanılan laktoz sığır kaynaklıdır.

ETYOMİD, 50 şeker kaplı tablet içeren amber renkli cam şişe ambalajlarda piyasaya verilmiştir.

ETYOMİD, diđer primer antitüberkütotik ajanlarla birlikte, aktif tüberkütöz türlerinin tedavisinde kullanılır. Tüberkütöz tedavisinde etionamid'in tek başına kullanılması uygun değildir.

#### **2. ETYOMİD' i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

**ETYOMİD'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

Eđer,

- Etionamid'e ya da ETYOMİD'in içerdiği diđer maddelere karşı aşırı duyarlılığınız varsa
- Ciddi karaciđer hastalığınız varsa

## **ETYOMİD'i ařađıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

Eđer, tat kaybı, bulantı, sarılık (ciltte ve gözün beyazında sarılık), idrarda koyulařma, dıřkıda renk açılması, üst sađ karında ađrı ve hassasiyet gibi karaciđer hasarını gösteren klinik belirtiler geliřirse hemen doktorunuza danıřınız.

Eđer, döküntü ya da ateř (alerjik reaksiyonun muhtemel iřaretleri) oluřursa hemen doktorunuza ya da eczacınıza danıřınız.

řeker hastalıđınız varsa karaciđer üzerine olan zararlı etkilerinde artıř olur.

ETYOMİD ile tedaviniz boyunca doktorunuz, kan řekerinizi, tiroid fonksiyonlarınızı ve görme keskinliđinizi düzenli olarak izleyecektir çünkü ETYOMİD, deđiřikliklere neden olabilir ("Yan etkilere" bakınız).

Eđer ETYOMİD beceriksizlik, sarsaklık, hissizlik, karıncalanma, yanma hissi, el ve ayaklarda ađrıya neden olursa hemen doktorunuza danıřınız. Bu belirtiler sonradan daha ciddi sinir hasarının geliřmesinin ilk belirtileri olabilir.

Doktorunuz, ETYOMİD ile aynı anda kullanmanız için piridoksin isimli bir vitamin (B<sub>6</sub> vitamini) verebilir. Bu ilaç, sinir hasarının geliřme riskini azaltabilir.

Bu uyarılar, geçmiřteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danıřınız.

## **ETYOMİD'in yiyecek ve iecek ile kullanılması**

ETYOMİD, yiyeceklerle beraber ya da aç karına alınabilir. Yiyeceklere beraber alınması, mide-barsak sistemi ile ilgili yan etkileri azaltabilir.

ETYOMİD kullanırken alkol almaktan kaçınınız.

## **Hamilelik**

- *İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*
- Hamile olan ya da hamilelik ihtimali bulunan kadınlarda kullanılması tavsiye edilmez.
- *Tedaviniz sırasında hamile olduđunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danıřınız.*

## **Emzirme**

- *İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*
- Etionamid'in anne sütüne geip gemediđi bilinmemektedir. Etionamid tedavisi sırasında emzirme durumunda bebek, yan etkiler açısından izlenmelidir.

## **Araç ve makine kullanımı**

ETYOMİD, baş dönmesi ya da baş ađrısı gibi yan etkilere neden olabilir, bu durum da araç ve makine kullanma yeteneđinizi zayıflatabilir.

## **ETYOMİD'in ieriđinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

ETYOMİD, laktoz ve sükroz ierir. Eđer daha önceden doktorunuz tarafından bazı řekerlere karřı intoleransınız olduđu söylenmiřse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geiniz.

### **Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

Etionamid ve rifampisin (tüberküloz tedavisinde kullanılan bir ilaç) aynı zamanda kullanılması önerilmez ancak bazı durumlarda kullanılması gerekebilir. Eğer her iki ilacı da kullanmanız gerekiyorsa doktorunuz her iki ilacın dozunu ve kullanım sıklığını değiştirebilir.

Etionamid, izoniyazid (tüberküloz tedavisinde kullanılan bir ilaç) ile beraber kullanılırsa yan etkilerde artışa neden olabilir, ancak iki ilacın da beraber kullanılması en iyi tedavi olabilir. Eğer her iki ilacı da beraber kullanmanız gerekiyorsa doktorunuz her iki ilacın dozunu ve kullanım sıklığını değiştirebilir.

Etionamid ve sikloserinin (tüberküloz tedavisinde kullanılan bir ilaç) beraber kullanılması santral sinir sistemi üzerine olan yan etkileri kötüleştirebilir. Doktorunuz antitüberküloz ilaçların dozunu ayarlayabilir ve düzenli olarak bu yan etkileri kontrol edecektir.

ETYOMİD, yüksek miktarda alkol ile alınmamalıdır.

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### **3. ETYOMİD nasıl kullanılır?**

#### **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

Erişkinler için günlük doz 500 mg ile 1000 mg'dır (2 ila 4 draje). Günlük doz 1-3 parçaya bölünmüş olarak alınabilir.

#### **Uygulama yolu ve metodu:**

Ağızdan alınır.

ETYOMİD, aç karnına ya da yiyeceklerle beraber alınabilir. Yiyeceklerle beraber alınması, mide-barsak sistemi ile ilgili yan etkileri azaltabilir.

#### **Değişik yaş grupları:**

##### **Çocuklarda kullanım:**

Çocuklar için ilacı veren doktor tarafından belirlenmelidir. Önerilen günlük doz 15-20 mg/kg'dır. Günlük doz 1-3 parçaya bölünmüş olarak alınabilir.

##### **Yaşlılarda kullanım:**

Erişkinler için verilen dozlar kullanılabilir.

#### **Özel kullanım durumları**

##### **Böbrek yetmezliği:**

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarına gerek yoktur.

##### **Karaciğer yetmezliği:**

Ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

- Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.
- İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.
- Doktorunuz ETYOMİD ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz.

*Eğer ETYOMİD'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izlemınız var ise doktorunuza veya eczacınıza ile konuşunuz.*

### **Kullanmanız gerekenden daha fazla ETYOMİD kullandıysanız**

*ETYOMİD'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

### **ETYOMİD'i kullanmayı unutursanız**

Eğer bir dozu almayı unutursanız ve unuttuğunuz dozu 6 saat içinde hatırlarsanız en kısa zamanda alınız ve sonra önceki gibi devam ediniz. Eğer geç hatırlarsanız, bir sonraki doz ile devam ediniz.

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

### **ETYOMİD ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler**

Bulunmamaktadır.

### **4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi, ETYOMİD'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Çok yaygın: 10 hastanın en az 1'inde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek: 10000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

### **Kan ve lenf sistemi hastalıkları**

Bilinmiyor: Trombosit sayısında azalma (kan pıhtılaşması için önemli olan kan hücreleri)

### **Metabolizma ve beslenme hastalıkları**

Bilinmiyor: Pellegra benzeri sendrom (niasin vitamininin eksikliğinin neden olduğu ishal, ciltte yangı ve beyin fonksiyonlarında azalma ile karakterize bir durum), düşük kan şekeri

### **Endokrin sistemi hastalıkları**

Bilinmiyor: Tiroid fonksiyonlarında azalma

### **Ruh sağlığı ile ilişkili hastalıklar**

Bilinmiyor: psikotik reaksiyonlar (olmayan şeyleri algılama, anormal düşünce, kişilik değişimi)

### **Sinir sistemi hastalıkları**

Yaygın: Baş ağrısı, baş dönmesi, sersemlik, karıncalanma

Bilinmiyor: Beyin fonksiyonlarında ve/veya yapısında değişiklik (ensefalopati), kol ve bacaklarda karıncalanma hissi, koku alma bozuklukları

### **Kalp-Damar hastalıkları**

Bilinmiyor: düşük kan basıncı (özellikle ayağa kalktıktan sonra)

### **Mide bağırsak sistemi**

Çok yaygın: Mide rahatsızlığı, karın ağrısı, iştahın azalması ya da kaybolması(anoreksi), bulantı, kusma, ishal

Bilinmiyor: Metalik tat ve sülfürlü geçirme, tükürük salgısında artış, tat bozuklukları

### **Karaciğer ve safra kesesi ile ilişkili hastalıklar**

Çok yaygın: Serum transaminazlarında (karaciğer enzimi) artış  
Yaygın: karaciğer iltihabı (hepatit), sarılık

### **Deri ve deri altı doku hastalıkları**

Bilinmiyor: Döküntü, kurdeşen, sivilce, ışığa karşı duyarlılık, ağız boşluğu mukozasında iltihap, saç dökülmesi, cilt üzerinde kırmızı ya da mor renk değişimi (purpura)

### **Üreme sistemi ve meme hastalıkları**

Bilinmiyor: Erkek hastalarda meme büyümesi, adet bozuklukları, iktidarsızlık

### **Göz hastalıkları**

Bilinmiyor: Görme bozukluğu

### **Kulak hastalıkları**

Bilinmiyor: Kulakta rahatsızlık (örn. baş dönmesi, işitme kaybı, kulak çınlaması)

### **Genel bozukluklar ve uygulama yeri hastalıkları**

Bilinmiyor: Kızarıklık ve ateş, halsizlik

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

### **5. ETYOMİD'in saklanması**

*ETYOMİD'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde saklayınız.*

#### **Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajdaki/kartondaki/şişedeki son kullanma tarihinden sonra ETYOMİD'i kullanmayınız / son kullanma tarihinden önce kullanınız.*

*Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ETYOMİD'i kullanmayınız.*

*Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.*

**Ruhsat sahibi** : KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.  
Bağlarbaşı, Gazi Cad., No:64-66  
Üsküdar / İstanbul

**Üretim yeri** : KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.  
Organize Sanayi Bölgesi  
Çerkezköy / Tekirdağ

*Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.*