

## KULLANMA TALİMATI

### STRIBILD® 150 mg/150 mg/200 mg/245 mg Film Kaplı Tablet

Ağız yoluyla alınır.

**Etkin maddeler:** Her bir film kaplı tablet 150 mg elvitegravir, 150 mg kobisistat, 200 mg emtrisitabin ve 245 mg tenofovir disoproksile eşdeğer 300 mg tenofovir disoproksil fumarat içerir.

**Yardımcı maddeler:** Tablet çekirdeği: Kroskarmelloz sodyum, hidroksipropil selüloz, laktoz monohidrat (inek sütünden elde edilen laktoz), magnezyum stearat, mikrokristalin selüloz, silikon dioksit ve sodyum lauril sülfat. Kaplama maddesi: İndigo karmin alüminyum lake (E132), polietilen glikol, kısmen hidrolize epolivinil alkol (E1203), talk (E553B), titanyum dioksit (E171) ve sarı demir oksit (E172)

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz; çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde, doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. **STRIBILD nedir ve ne için kullanılır?**
2. **STRIBILD'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **STRIBILD nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **STRIBILD'in saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

#### **1. STRIBILD nedir ve ne için kullanılır?**

STRIBILD, 18 yaş ve üzeri yetişkinlerde İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü (HIV) enfeksiyonunun tedavisine yönelik bir tek tablet rejimidir.

STRIBILD dört etkin madde içerir; elvitegravir, kobisistat, emtrisitabin ve tenofovir disoproksil fumarat. Elvitegravir, emtrisitabin ve tenofovir disoproksil fumarat antiretroviral ilaçlardır. Kobisistat, elvitegravirin etkisi açısından takviye ('farmakokinetik iyileştirici') niteliğindedir.

STRIBILD vücudunuzdaki HIV miktarını azaltır. Böylece bağışıklık sisteminiz gelişir ve HIV enfeksiyonuyla ilgili hastalık geliştirme riski azaltılır.

**Bu ilaç, HIV enfeksiyonunun çaresi değildir.** STRIBILD'i alırken, yine de enfeksiyonlar veya HIV enfeksiyonu ile ilişkili başka hastalıklar geliştirebilirsiniz.

STRIBILD'in görünümü ve paketin içeriği:

STRIBILD film kaplı tablet, tabletin bir yüzünde "GSI", diğerinde ise kare kutu içinde "1" damgası bulunan yeşil, kapsül şeklinde bir tablettir.

Şu ambalaj boyutları bulunmaktadır: 1 x 30 film kaplı tablet içeren kutular ve 3 x 30 film kaplı tablet şişeleri. Tüm ambalaj boyutları piyasaya sürülmemiş olabilir.

## 2. STRIBILD'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

### STRIBILD'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer **elvitegravir, kobisistat, emtrisitabin, tenofovir, tenofovir disoproksil** veya bu ilacın diğer bileşenlerinden (kullanma talimatının başında listelenmektedir) herhangi birine karşı **alerjiniz varsa**.

Tenofovir disoproksil içeren bir ilaçla tedavinizi böbrek fonksiyonlarınızda sorun yaşadığınız için doktorunuzun tavsiyesi üzerine kestiyseniz.

#### • Bu ilaçlardan birini alıyorsanız:

- **alfuzosin** (büyümüş prostat bezinin tedavisinde kullanılır)
- **amiodaron, kinidin** (düzensiz kalp atışlarını düzeltmek için alınır)
- **dabigatran** (kan pıhtılarını önlemek ve tedavi etmek için kullanılır)
- **karbamazepin, fenobarbital, fenitoin** (nöbetleri önlemek için kullanılır)
- **rifampisin** (tüberküloz ve diğer enfeksiyonların önlenmesinde ve tedavisinde kullanılır)
- **dihidroergotamin, ergotamin, ergometrin** (migren ağrısının tedavisinde kullanılır)
- **sisaprid** (bazı mide sorunlarını hafifletmek için kullanılır)
- **sarı kantaron** (*Hypericum perforatum*) (depresyon ve endişe için kullanılan bitkisel bir ilaç) veya **içeren ürünler**
- **lovastatin, simvastatin** (kandaki kolesterol düzeyini düşürmek için kullanılır)
- **pimozid, lurasidon** (anormal düşüncelerin veya hislerin tedavisinde kullanılır)
- **sildenafil** (pulmoner arteriyel hipertansiyon (solunumu güçleştiren bir akciğer hastalığı) tedavisinde kullanılır)
- oral yoldan uygulanan **midazolam, triazolam** (uyumanıza ve/veya endişenin hafifletilmesine yardımcı olur);

➔ **Bunlardan herhangi biri sizin için geçerliyse, STRIBILD almayın ve hemen doktorunuza bildirin.**

## STRIBILD’i ařađıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

STRIBILD alırken doktorunuzun kontrolü altında olmalısınız.

Efektif bir antiretroviral tedavisi olarak riski azaltmanıza rađmen bu ilacı alırken **başkalarına HIV bulařtırabilirsiniz. Başkalarına HIV bulařtırmamak için alınması gereken önlemleri doktorunuzla tartıřmalısınız.** Bu ilaç, HIV enfeksiyonunun çaresi deđildir. STRIBILD’i alırken, yine de enfeksiyonlar veya HIV enfeksiyonu ile iliřkili başka hastalıklar geliřtirebilirsiniz.

STRIBILD almadan önce doktorunuzla konuřun:

- **Eđer, böbrek sorunlarınız varsa** veya geçmiřte olduysa veya testler böbreklerinizde sorunlar olduđunu gösterdiyse **bunu doktorunuza bildirin.** Doktorunuz sizi STRIBILD ile tedavi edip etmeme konusunu dikkatle deđerlendirecektir.

STRIBILD böbreklerinizi etkileyebilir. Tedaviye başlamadan önce, doktorunuz böbrek fonksiyonunu deđerlendirmek için kan testleri isteyecektir. Doktorunuz ayrıca böbreklerinizi izlemek için tedavi sırasında kan testleri de isteyebilir.

STRIBILD genellikle böbreklerinize zarar verebilecek başka ilaçlarla birlikte alınmaz (bkz. *Diđer ilaçlar ve STRIBILD*). Bu kaçınılmazsa, doktorunuz böbrek fonksiyonunuzu daha sık izleyecektir.

- **Karaciđer sorunlarınız veya hepatit dahil karaciđer hastalıđı hikayeniz varsa doktorunuzla konuřun.** Kronik hepatit B veya C dahil karaciđer hastalıđı olan ve antiretrovirallerle tedavi edilen hastalar, řiddetli ve potansiyel olarak ölümcül karaciđer komplikasyonları açısından daha yüksek risk altındadır. Hepatit B enfeksiyonunuz varsa, doktorunuz sizin için en iyi tedavi rejimini dikkatle deđerlendirecektir.

Hepatit B enfeksiyonunuz varsa, karaciđer sorunları STRIBILD almayı kestikten sonra kötüleřebilir. Doktorunuzla konuřmadan STRIBILD almayı kesmemeniz önemlidir: *bkz. bölüm 3, STRIBILD almayı kesmeyin.*

- **65 yařın üzerindeyseniz doktorunuzla konuřun.** STRIBILD, 65 yařın üzerindeki hastalarda incelenmemiřtir. Bu yařın üzerindeyseniz ve size STRIBILD reçete edilmiřse, doktorunuz sizi dikkatle izleyecektir.

➔ **Bunlardan herhangi biri sizin için geçerliyse STRIBILD almadan önce doktorunuzla konuřunuz.**

### STRIBILD’i alırken

STRIBILD almaya başladıktan sonra, ařađıdaki belirtilere dikkat ediniz:

- **İnflamasyon veya enfeksiyon belirtileri**
- **Kemik sorunları**

➔ **Bu semptomlardan herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildirin.**

Bu uyarılar, geçmiřteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danıřınız

## Çocuklar ve adolesanlar

Çocuklara ve 18 yaş altı adolesanlara **bu ilacı vermeyin**. STRIBILD'in çocuklarda ve adolesanlarda kullanımı henüz araştırılmamıştır.

## STRIBILD'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

STRIBILD yiyeceklerle beraber alınmalıdır. Daha fazla bilgi için, *bkz. Bölüm 3, STRIBILD nasıl kullanılır?*

## Hamilelik

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

Eğer hamileyseniz veya bebeğinizi emziriyorsanız, hamile olabileceğinizi veya bebek sahibi olmayı planlıyorsanız, bu ilacı almadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

- STRIBILD alırken etkili doğum kontrol yöntemleri kullanın.
- **Eğer hamile kalırsanız, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız veya bebek sahibi olmayı planlıyorsanız, derhal doktorunuza söyleyiniz.** Hamile kadınlar STRIBILD kullanmamalıdır. Bu ilacın kanınızdaki miktarı hamilelik esnasında azalabilir ve bu da ilacın işe yaramasını engelleyebilir.

*Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

## Emzirme

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

**STRIBILD tedavisi alırken emzirmeyin.** Çünkü bu ilaçtaki etkin maddelerin bazıları insan sütüne geçer. HIV'li bir kadınsanız, virüsün anne sütüyle bebeğe geçmesinden kaçınmak için emzirmemeniz önerilir.

## Araç ve makine kullanımı

STRIBILD baş dönmesi, yorgunluk veya uykusuzluğa yol açabilir. STRIBILD alırken bunlardan etkilendiğinizi hissederseniz, **araç sürmeyin** ve herhangi bir alet veya makine kullanmayın.

## STRIBILD'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Laktozu veya diğer şekerleri tolere edemiyorsanız bu ilacı almadan önce doktorunuza söyleyin.

## Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

**STRIBILD ile birlikte asla alınmaması gereken bazı ilaçlar vardır.**

Bunlar yukarıda "STRIBILD'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ - Bu ilaçlardan birini alıyorsanız" başlığı altında belirtilmiştir.

**Başka bir ilaç alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız doktorunuza veya eczacınıza bildirin.** STRIBILD diğer ilaçlarla etkileşime girebilir. Sonuç olarak, kanınızdaki STRIBILD veya diğer ilaçların miktarları etkilenebilir. Bu durum ilaçların doğru şekilde etki göstermesini engelleyebilir veya yan etkileri kötüleştirebilir. Bazı durumlarda, doktorunuzun dozunuzu ayarlaması veya kan düzeylerinizi kontrol etmesi gerekebilir

Aşağıdakilerden herhangi birini alıyorsanız **doktorunuzla konuşmanız özellikle önemlidir:**

- **Aşağıdakiler dahil kullanılan diğer ilaçlar:**
  - **tenofovir disoproksil**
  - **tenofovir alafenamid**
  - **lamivudin**
  - **adefovir dipivoksil**
- **Böbreklerinize zarar verebilecek ilaçlar; örneğin:**
  - aminoglikozidler (örn. streptomisin, neomisin, gentamisin), vankomisin (bakteriyel enfeksiyonlar için)
  - foskarnet, gansiklovir, sidofovir (viral enfeksiyonlar için)
  - amfoterisin B, pentamidin (mantar enfeksiyonlar için)
  - interlökin-2 (aldeslökün olarak da adlandırılır) (kanser tedavisi için)
  - nonstereoidal antiinflatuar ilaçlar (NSAİİ'ler, kemik veya kas ağrılarını dindirme amaçlı)

Aşağıdaki türde ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız da doktorunuza söylemeniz önemlidir:

- **antifungaller**, mantar enfeksiyonların tedavisinde kullanılır, örneğin:
  - ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, flukonazol ve posakonazol
- **antiviraller**, hepatit C enfeksiyonunun tedavisinde kullanılır
  - ledipasvir/sofosbuvir, sofosbuvir/velpatasvir ve sofosbuvir/velpatasvir/voksilaprevir
- **antibiyotikler**; tüberküloz gibi bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılır, şu maddeleri içerir:
  - rifabutin, klaritromisin veya telitromisin
- **antidepresanlar**, depresyon tedavisinde kullanılır:
  - trazodon veya essitalopram içeren ilaçlar
- **sakinleştirici ve uyutucular, endişe tedavisinde kullanılır:**
  - buspiron, klorazepat, diazepam, estazolam, flurazepam ve zolpidem
- **immünosüpresanlar; organ nakli sonrasında vücudunuzun immün cevabını kontrol etmekte kullanılır, örneğin:**
  - siklosporin, sirolimus ve takrolimus
- **kortikostreoidler, örneğin:**
  - betametazon, budesonid, flutikazon, mometazon, prednizon, triamsinolon.
  - Bu ilaçlar, alerjileri, astımı, iltihaplı bağırsak hastalıklarını, gözlerin iltihaplanma koşullarını, eklemleri ve kasları ve diğer enflamatuvar durumları tedavi etmek için kullanılır. Alternatifler kullanılamazsa, kullanımı tıbbi değerlendirmeden sonra ve doktorunuz tarafından kortikosteroid yan etkileri açısından yakın izlem altında yapılmalıdır.
- **diyabet tedavisinde kullanılan ilaçlar:**
  - metformin
- **doğum kontrol hapı**, gebeliği önlemek için kullanılır
- **erektil disfonksiyon ilaçları, iktidarsızlık tedavisinde kullanılır, örneğin:**
  - sildenafil, tadalafil ve vardenafil

- **kalp ilaçları, örneğin:**
  - digoksin, disopiramid, flekainid, lidokain, meksiletin, propafenon, metoprolol, timolol, amlodipin, diltiazem, felodipin, nikardipin, nifedipin ve verapamil
- **pulmoner arteriyel hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar:**
  - bosentan
- **antikoagülanlar, kan pıhtılarını önlemek ve tedavi etmek için kullanılır, örneğin:**
  - varfarin, edoxaban, apixaban ve rivaroxaban
- **bronkodilatörler, astım ve diğer akciğerle ilgili sorunların tedavisinde kullanılır:**
  - salmeterol
- **kolesterol düşüren ilaçlar, örneğin:**
  - rosuvastatin, atorvastatin, pravastatin, fluvastatin ve pitavastatin
- **gut tedavisinde kullanılan ilaçlar:**
  - kolşisin
- **antiasitler, mide yanması veya asit reflüsünün tedavisinde kullanılır, örneğin:**
  - alüminyum/magnezyum hidroksit

**Bir antiasit veya multivitamin takviyesi alıyorsanız, STRIBILD'den en az 4 saat önce veya en az 4 saat sonra alın.**

**Bu ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız doktorunuza bildirin.** Doktorunuzla görüşmeden tedavinizi kesmeyin.

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### 3. STRIBILD nasıl kullanılır?

Bu ilacı her zaman tam olarak doktorunuzun size söylediği şekilde alınız. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

#### Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

##### Yetişkinler için önerilen doz:

- **Gıdayla birlikte günde bir kez ağızdan tek tablet.**

##### Uygulama yolu ve metodu:

Ağız yolu ile alınır. Tableti çiğnemeyin, ezmeyin veya bölmeyin.

**Her zaman doktorunuzun önerdiği dozu alınız.** Bu, ilacınızın tamamen etkili olduğundan emin olmak ve tedaviye karşı direnç geliştirme riskini azaltmak içindir. Doktorunuz söylemediği sürece dozu değiştirmeyiniz.

Alüminyum/magnezyum hidroksit gibi bir **antiasit** veya **multivitamin takviyesi alıyorsanız, STRIBILD'den en az 4 saat önce veya en az 4 saat sonra alın.**

#### Değişik yaş grupları

**Çocuklarda kullanım:** Çocuklar ve gençler için değildir.

**Yaşlılarda kullanım:** 65 yaşın üzerindeki hastalarda doz önerisinde bulunmak için

herhangi bir veri yoktur.

### **Özel kullanım durumları:**

**Böbrek yetmezliği:** STRIBILD kreatinin klerensi 70 ml/dak.'nın altında olan hastalarda başlanmamalıdır.

**Karaciğer yetmezliği:** Hafif veya orta şiddette karaciğer bozukluğu olan hastalarda STRIBILD için doz ayarlaması yapılması gerekmez. STRIBILD, şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda araştırılmamıştır. Bu nedenle, şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda STRIBILD kullanımı önerilmez.

*Eğer STRIBILD'in etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

### **Kullanmanız gerekenden fazla STRIBILD alırsanız**

*STRIBILD'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

Kazara önerilen dozdan daha fazla STRIBILD alırsanız, bu ilaca ilişkin olası yan etkileri yaşama riskiniz artabilir (*bkz. bölüm 4, Olası yan etkiler*).

Tavsiye için hemen doktorunuza veya en yakın acil servise başvurun. Ne aldığınızı kolayca açıklayabilmeniz için tablet şişesini yanınızda bulundurun.

### **STRIBILD'i kullanmayı unutursanız**

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

STRIBILD dozunun atlanmaması önemlidir.

Bir dozu atlarsanız:

- STRIBILD'i normalde aldığınız saatten sonraki **18 saat içinde fark ederseniz** tableti en kısa sürede almalısınız. Tableti her zaman gıdayla birlikte alınız. Sonraki dozu normal saatinde alınız.
- STRIBILD'i normalde aldığınız saatten **18 saat veya daha uzun süre sonra fark ederseniz** atlanan dozu almayınız. Bekleyin ve sonraki dozu gıdayla birlikte normal saatinde alınız.

**STRIBILD'i aldıktan sonra 1 saatten az bir süre içinde kusarsanız** gıdayla birlikte başka bir tablet alınız.

### **STRIBILD ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler**

**STRIBILD almayı kesmeyiniz.**

**Doktorunuzla konuşmadan STRIBILD almayı kesmeyiniz.** STRIBILD'in kesilmesi gelecekteki tedaviye cevabınızı ciddi şekilde etkileyebilir. Herhangi bir nedenle STRIBILD almayı keserseniz STRIBILD tabletlerini almaya yeniden başlamadan önce doktorunuzla konuşunuz.

**Elinizde bulunan STRIBILD'in azalması durumunda**, doktorunuzdan veya eczacınızdan yenisini alınız. İlacın kısa süre için dahi kesilmesi durumunda virüs miktarı artmaya başlayabileceğinden, bu son derece önemlidir. Aksi takdirde hastalığın tedavisi zorlaşabilir.

**Sizde HIV enfeksiyonu ve hepatit B varsa**, ilk önce doktorunuzla konuşmadan STRIBILD tedavinizi kesmemek özellikle önemlidir. Tedavi kesildikten sonra birkaç ay kan testleri yaptırmanız gerekebilir. İlerlemiş karaciğer hastalığı veya sirozu olan bazı hastalarda, tedavinin durdurulması hepatitinizin yaşamı tehdit edici olabilecek şekilde kötüleşmesine yol açabileceğinden tedavinin kesilmesi önerilmez.

→ Tedaviyi kestikten sonra, özellikle hepatit B enfeksiyonuyla ilişkilendirdiğiniz semptomlar olmak üzere yeni veya olağandışı semptomları (cildinizde veya gözünüzün beyaz kısmında sararma olması, koyu “çay rengi” idrar, açık renkli dışkılar, birkaç gün veya daha uzun süre iştahsızlık, hasta hissetme veya hasta olma veya mide bölgesi ağrısı gibi) **hemen doktorunuza bildiriniz**.

Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız varsa, doktorunuza veya eczacınıza sorun.

#### **4. Olası yan etkiler nelerdir?**

HIV tedavisi sırasında, vücut ağırlığında artış ve ayrıca kan lipidleri ve kan şekeri düzeylerinde yükselme olabilir. Bu durum kısmen düzelen sağlığa ve yaşam tarzına, kan lipidleri açısından ise bazen HIV ilaçlarının kendisine bağlıdır. Doktorunuz bu değişiklikler için test uygulayacaktır.

Tüm ilaçlar gibi STRIBILD'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. HIV enfeksiyonunu tedavi ederken, istenmeyen bazı etkilerin STRIBILD kaynaklı mı, aynı zamanda almakta olduğunuz diğer ilaçlar kaynaklı mı, yoksa HIV hastalığının kendisi kaynaklı mı olduğunu belirlemek her zaman mümkün değildir.

**Aşağıdakilerden biri olursa, STRIBILD'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- yüzde, dudaklarda, dilde veya boğazda şişme

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin STRIBILD'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**



- Kanda laktik asit fazlası (**laktik asidoz**) Laktik asit fazlalığı seyrek ancak ciddi bir yan etkidir ve ortaya çıktığında ölüme sebebiyet verebilir. Aşağıdakiler laktik asidoz belirtileri olabilir:
  - halsizlik ya da normalden daha yorgun hissetme
  - alışılmadık kas ağrısı
  - nefes darlığı ya da hızlı nefes alıp verme
  - mide ağrısı ile beraber bulantı, kusma
  - el ve ayaklarda morarma
  - baş dönmesi veya sersemlik
  - hızlı veya anormal kalp atışı

➔ **Sizde laktik asidoz olabileceğini düşünüyorsanız, hemen doktorunuza bildirin.**

- **İnflamasyonun veya enfeksiyonun herhangi bir belirtisi.** İlerlemiş HIV enfeksiyonu (AİDS) ve fırsatçı enfeksiyon (zayıf bağışıklık sistemine sahip kişilerde görülen enfeksiyonlar) hikayesi olan bazı hastalarda, önceki enfeksiyonlardan kaynaklanan inflamasyon belirtisi ve semptomları anti-HIV tedavisi başladıktan hemen sonra görülebilir. Bu semptomların, vücutta belirgin semptomlar göstermeksizin mevcut olan enfeksiyonlarla savaşmasını sağlayan vücudun immün cevabındaki bir gelişme nedeniyle görüldüğü düşünülmektedir. HIV enfeksiyonunuzun tedavisi için ilaç almaya başladıktan sonra fırsatçı enfeksiyonların yanı sıra otoimmün bozukluklar da (bağışıklık sistemi sağlıklı vücut dokusuna saldırdığında meydana gelen bozukluk) meydana gelebilir. Otoimmün bozukluklar tedavi başladıktan aylar sonra da meydana gelebilir. Enfeksiyon belirtileri veya kas güçsüzlüğü, ellerde ve ayaklarda başlayan ve vücuda yayılan güçsüzlük, çarpıntı, titreme veya hiperaktivite gibi başka belirtiler fark ederseniz, lütfen gerekli tedaviyi almak için hemen doktorunuza bildirin.

➔ **İnflamasyon veya enfeksiyon semptomları fark ederseniz, hemen doktorunuza bildirin.**

**Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.**

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:**

Tüm ilaçlar gibi, STRIBILD'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler şu şekilde sınıflandırılır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

**Çok yaygın**

- ishal
- kusma
- mide bulantısı (bulantı)
- güçsüzlük
- baş ağrısı, baş dönmesi

- döküntü

Testler ayrıca şunları da gösterebilir:

- kanınızdaki fosfatta azalma
- kas ağrısına ve güçsüzlüğe yol açabilen kandaki kreatin kinaz düzeylerinde artış

### **Yaygın**

- iştahta azalma
- uyumada güçlük (*uykusuzluk*), anormal rüyalar
- ağrı, mide ağrısı
- yemeklerden sonra rahatsızlığa neden olan sindirim sorunları (*dispepsi*)
- şişkinlik hissetme
- kabızlık, gaz (*şişkinlik*)
- alerjik reaksiyon olabilecek döküntü (kırmızı noktalar veya bazen kabarcıklar ve deride şişlikle görülebilen kabartılar), kaşıntı, deride koyu lekeler oluşması gibi deri renginde değişiklik
- diğer alerjik reaksiyonlar
- yorgunluk

Testler ayrıca şunları da gösterebilir:

- düşük beyaz kan hücresi sayımı (enfeksiyona eğiliminizi artırabilir)
- kanda şeker, yağ asitleri (trigliseridler), bilirubin artışı
- karaciğer ve pankreas sorunları
- kanınızdaki kreatinin düzeylerinde artış

### **Yaygın olmayan**

- intihar düşüncesi ve intihar girişimi (önceden depresyon veya psikiyatrik hastalık hikayesi olan hastalarda), depresyon
- böbrek yetmezliği dahil böbrek sorunlarının yol açtığı sırt ağrısı. Doktorunuz, böbreklerinizin doğru çalışıp çalışmadığını görmek için kan testleri yapabilir.
- Böbrek tübüle hücrelerinde hasar
- yüzde, dudaklarda, dilde veya boğazda şişme
- karında (midede) pankreas enflamasyonunun (*pankreatit*) yol açtığı ağrı
- kas yıkımı, kas ağrısı veya güçsüzlük

Testler ayrıca şunları da gösterebilir:

- anemi (düşük eritrosit sayımı)
- kandaki düşük potasyum düzeyleri
- idrarınızda değişiklikler

### **Seyrek**

- laktik asidoz (*bkz. Olası ciddi yan etkiler: derhal doktora bildirin*)
- ciltte veya gözlerde sarılık, kaşıntı, veya karında (midede) karaciğer enflamasyonunun (*hepatit*) yol açtığı ağrı
- karaciğerde yağlanma
- böbrek enflamasyonu (*nefrit*)
- çok fazla idrara çıkma ve susama (*nefrojenik diabetes insipidus*)
- kemiklerde yumuşama (kemik ağrısıyla birlikte ve bazen kırıklarla sonuçlanan)

Böbrek tübüle hücrelerindeki hasar kas yıkımı, kemiklerde yumuşama (kemik ağrısıyla birlikte ve bazen kırıklarla sonuçlanan), kas ağrısı, kas güçsüzlüğü ve kandaki potasyum veya fosfat düzeylerinde düşüğe yol açabilir.

→ Herhangi bir yan etki ciddileşirse doktorunuza bildirin.

#### **HIV tedavisi sırasında görülebilen diğer etkiler**

Aşağıdaki yan etkilerin sıklığı bilinmemektedir (sıklık, eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

- **Kemik sorunları.** STRIBILD gibi antiretroviral kombinasyon ilaçları alan bazı hastalar, *osteonekroz* (kemiğe kan tedariki kaybının yol açtığı kemik dokusunun ölümü) olarak bilinen bir kemik hastalığı geliştirebilirler. Bu tür ilaçların uzun süre kullanımı, kortikosteroid kullanımı, alkol kullanımı, çok zayıf bağışıklık sistemine sahip olmak ve aşırı kilolu olmak, bu hastalığın gelişmesine ilişkin birçok risk faktöründen bazıları olabilir. Osteonekroz belirtileri şunlardır:
  - Eklemlerde sertlik
  - Eklemlerde ağrı ve acı (özellikle kalça, diz ve omuzlarda)
  - Hareket güçlüğü

→ Bu semptomlardan herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildirin.

#### **Yan etkilerin raporlanması**

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri [www.titek.gov.tr](http://www.titek.gov.tr) sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM) ‘ne bildirin. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

#### **5. STRIBILD’in Saklanması**

*STRIBILD’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

#### **Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız**

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra STRIBILD’i kullanmayınız. Son kullanma tarihi belirtilen ayın son gününü ifade eder.

30°C'nin altındaki oda sıcaklığında ve nemden korumak için orijinal ambalajında saklayınız. Şişeyi sıkıca kapalı olarak saklayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

#### ***Ruhsat Sahibi:***

Gilead Sciences İlaç Tic. Ltd. Şti.  
İçerenköy Mahallesi, Umut Sokak, No:10/12, Kat:21  
And Ofis  
34752 Ataşehir, İstanbul  
Tel: 0216 559 03 00

***Üretim Yeri:***

Gilead Sciences Ireland UC  
IDA Business & Technology Park Carrigtohill,  
County Cork, İrlanda

*Bu kullanma talimatı ..... tarihinde onaylanmıştır.*