

KULLANMA TALİMATI

PİMAFUCİN® deri pomadı
Haricen uygulanır.

- **Etkin madde:** 1 g pomad, 20 mg pimarisin (natamisin) içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Balık nefsi, decyl oleate, metil paraben (E218), propil paraben (E216), stearyl alkol, sodyum lauril sülfat, sodyum stearyl sülfat, sodyum hidroksit, hidroklorik asit ve distile su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **PİMAFUCİN® nedir ve ne için kullanılır?**
2. **PİMAFUCİN®'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **PİMAFUCİN® nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **PİMAFUCİN®'in saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. PİMAFUCİN® nedir ve ne için kullanılır?

- PİMAFUCİN®, mantarların yol açtığı enfeksiyonlarda kullanılan bir antibiyotiktir.
- PİMAFUCİN®, 15 g'lık alüminyum tüplerde sunulur. Beyaz-çok açık krem renğinde, homojen pomad görünümündedir.
- PİMAFUCİN®, cilt ve tırnaklarda başta *Candida Albicans* (özellikle nemli cilt bölgelerinde enfeksiyona sebep olan bir mantar türü) olmak üzere muhtelif mantarların sebep olduğu akut ve kronik hastalıkların tedavisinde kullanılır.
- *Candida* ve/veya *Trichomonas vaginalis*in sebep olduğu vajina yangılarının tedavisinde tekrar enfeksiyonu önlemek için (kasık bölgesi ve perineal bölge derisine uygulanır).

2. PİMAFUCİN®'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

PİMAFUCİN®'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

- PİMAFUCİN®'in herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlıysanız.

PİMAFUCİN®'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

- PİMAFUCİN®'in antibakteriyel etkisi yoktur. Bu sebeple doktorunuz aynı zamanda mikrobik bulaşma olduğunu saptamış veya düşünüyorsa size PİMAFUCİN®'in yanısıra antibakteriyel etkili bir ilaç önerebilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

PİMAFUCİN®'in yiyecek ve içecek ile kullanılması
Uygulanabilir değildir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelikte kullanımına ilişkin yeterli veri bulunmamaktadır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

İlacın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.

Araç ve makine kullanımı

PİMAFUCİN®'in araç veya makine kullanma becerinizi etkilediğine dair bilgi yoktur.

PİMAFUCİN®'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

PİMAFUCİN®'in içeriğinde bulunan stearyl alkol, bölgesel deri reaksiyonlarına (kontakt dermatit gibi) sebebiyet verebilir.

PİMAFUCİN®'in içeriğinde bulunan metil paraben (E218) ve propil paraben (E216) alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

PİMAFUCİN® ile diğer ilaçlar arasında bilinen bir etkileşim mevcut değildir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. PİMAFUCİN® nasıl kullanılır?

• **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:** PİMAFUCİN®, günde 3-4 defa hasta cilt bölgesine ince bir tabaka halinde sürülür.

Tedavi süresi, vakaya göre 1-2 hafta ile 1 ay arasında değişir. Doktorunuz PİMAFUCİN® ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

• **Uygulama yolu ve metodu:** Hasta cilt bölgesine ince bir tabaka halinde sürülür.

• **Değişik yaş grupları**

Çocuklarda kullanımı: Çocuklarda kullanımına ilişkin özel bir durum bulunmamaktadır.

Yaşlılarda kullanımı: Yaşlı hastalarda kullanımına ilişkin özel bir durum bulunmamaktadır.

• **Özel kullanım durumları**

Özel kullanım durumları bulunmamaktadır.

Eğer PİMAFUCİN®'in etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Kullanmanız gerekenden daha fazla PİMAFUCİN® kullandıysanız

PİMAFUCİN®'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

PİMAFUCİN®'i kullanmayı unutursanız
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

PİMAFUCİN® ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler
Bilinmemektedir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, PİMAFUCİN®'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa PİMAFUCİN®'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

- Deride yaygın kaşıntı ve döküntülerle beraber, dudakta, yüzde, boğazda ve dilde şişme, yutma veya nefes alma güçlüğü (aşırı duyarlılık-anafilaksi)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin PİMAFUCİN®'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz

Seyrek (10000 hastada 1'den fazla ve 1000 hastada 1'den az):

- Yanma hissi,
- Tahriş.

Bunlar PİMAFUCİN®'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. PİMAFUCİN®'in saklanması

PİMAFUCİN®'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Kutu üzerinde yazılı olan son kullanma tarihinden sonra PİMAFUCİN®'i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi: Astellas Pharma Europe B.V. Hollanda lisansı ile, Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş.

Okmeydanı, Boruçiçeği Sokak, No: 16 34382 Şişli-İSTANBUL

Tel: (+90 212) 220 64 00

Fax: (+90 212) 222 57 59

Üretim Yeri: Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş.

Sofalçeşme Sokak, No: 72-74 34091 Edirnekapı-İSTANBUL

Tel: (+90 212) 534 79 00

Fax: (+90 212) 521 06 44

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.