

KULLANMA TALİMATI

ESTRADERM TTS 100

Deri üzerine yapıştırılarak kullanılır.

- **Etkin madde:** Her bir plaster 8.0 mg estradiol (hemihidrat olarak) içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Etanol, hidroksipropilselüloz, polietilen tereftalat, etilenvinilasetat kopolimeri, sıvı parafin, poliizobütilen ve koruyucu astarın iç tarafını (plasteri uygulamadan önce çıkarılan) kaplayan silikon.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
- Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
- Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
- Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
- Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu kullanma talimatında

1. **ESTRADERM TTS nedir ve ne için kullanılır?**
2. **ESTRADERM TTS'yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **ESTRADERM TTS nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **ESTRADERM TTS'nin saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. ESTRADERM TTS NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

ESTRADERM TTS; ince, yuvarlak, çok katlı, arka yüzünde "CG FBF" baskılı, sağlam deri üzerine yapıştırılan, saydam bir plasterdir. İlaç haznesi toplam olarak 8.0 mg estradiol (hemihidrat olarak) içerir. 20 cm² alana sahip plaster, derinize yapıştırdığınız bölgede küçük miktarlarda estradiol salımı gerçekleştirir, salınan estradiol doğrudan kan dolaşımınıza geçer. Böylece vücudunuzda günde yaklaşık 100 mikrogram estradiol emilimi gerçekleşir.

ESTRADERM TTS, alüminyum folyodan yapılmış ve ısıyla kapatılmış ambalajlarda takdim edilmektedir.

ESTRADERM TTS, hormon replasman tedavisinde (HRT) kullanılır..

Menopoz belirtilerinin giderilmesi: ESTRADERM TTS, menopoz esnasında ve sonrasında yaşayabileceğiniz sıkıntıları azaltmaya yardımcı olarak kullanılır. Menopoz genellikle 45-55 yaşları arasında olmak üzere, doğal olarak tüm kadınlarda görülür. Aynı zamanda yumurtalıkları cerrahi işlemle alınmış genç kadınlarda da görülmektedir. Menopoz sonrasında vücudunuz eskiden olduğundan daha az miktarda estrogen üretir. Bu durum yüz, boyun ve göğüste yanmalar, sıcak basmaları (tüm vücutta ani sıcaklık artışı ve terleme), uyku problemleri, aşırı hassasiyet ve depresyon gibi rahatsız edici belirtilere sebep olabilir. Bazı kadınlarda idrar kontrol problemleri ve cinsel ilişki esnasında ve sonrasında rahatsızlığa neden olabilen kadın cinsel organı (vajina) kuruluğu da oluşabilir. Estrojenler bu belirtileri azaltmak ya da ortadan kaldırmak amacıyla verilebilir.

Osteoporozun önlenmesi

ESTRADERM TTS aynı zamanda, hızlanan kemik kaybını önlemek için de kullanılır. 40 yaş üzerinde özellikle menopoz sonrası, bazı kadınlarda osteoporoz gelişir. Bu durum, özellikle omurga, el bileği ve kalça kemiklerinin zayıflamasına ve kırılmaya daha müsait hale gelmesine neden olan incelmeye bağlıdır. Estrojen eksikliğinde osteoporoz (kemik erimesi) riski artar. Menopoz sonrası estrojen alımı kemik kaybını yavaşlatıp osteoporozu önlemeye yardımcı olur. ESTRADERM TTS ve diğer alternatif tedavilerin fayda ve risklerini doktorunuzla görüşmeliniz.

ESTRADERM TTS kalp hastalığını önlemek için kullanılmamalıdır.

ESTRADERM TTS, gebelikten korunmak için kullanılan bir ilaç değildir, gebeliği önlemez ve doğurganlığınızı eski haline getirmez.

Bu ilacın size neden verildiği hakkında herhangi bir sorunuz olursa doktorunuza danışınız.

2. ESTRADERM TTS'Yİ KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

ESTRADERM TTS'yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

- Estrojenlere ya da ESTRADERM TTS'nin içerdiği ve bu Kullanma Talimatının başında listelenen yardımcı maddelere karşı alerjik iseniz,
- Meme veya endometriyum (rahim içi) ya da estrojenlere duyarlı başka herhangi bir tipte kanserinizi varsa veya daha önce olduysa,
- Vajinal kanamanızda anormal ve araştırılmamış değişiklikler varsa,
- Ağır karaciğer hastalığınız varsa,
- Porfiri adlı karın ağrısı ve kas kramplarına neden olan bir çeşit kalıtsal hastalığınız varsa,
- Damarlarınızda kan pıhtılaşmasında problem varsa ya da geçmişte olduysa. Bu durum toplardamarların iltihabına bağlı kan pıhtısı oluşumu (tromboflebit) ya da bacaklarda [derin toplardamar trombozu (kanın damarda ya da kalpte pıhtılaşması)], akciğerlerde (pulmoner emboli) veya diğer organlardaki kan damarlarında tıkanmaya neden olabilir,
- Kalp krizi veya inme geçirdiyeniz,
- Hamileyseniz veya hamile kalmayı düşünüyorsanız,
- Emziriyorsanız.

ESTRADERM TTS'yi aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

- nefes alma ya da yutkunma zorluğu, göğüste sıkışma, kurdeşen, genel deri döküntüsü, şişlik, kaşıntı, sersemlik, kusma, karın ağrısı (şiddetli bir alerjik reaksiyonun olası belirtileri) ya da yüzde, dudaklarda, dilde, boğazda ve/veya uzuvlarda şişme (anjiyoödem olası belirtileri) varsa,

ESTRADERM kullanmayı bırakınız ve acilen doktorunuza haber veriniz.

Eğer:

- Birinci dereceden yakınlarınızda meme kanseri,
- Memede yumrular,
- Rahimde fibröz (artmış hücre arası lifli doku) veya diğer iyi huylu tümörler,
- Endometriozis (adet dönemlerinin ağrılı olmasına sebep olan pelvis rahatsızlığı),
- Kalp, böbrek veya karaciğer problemleri,
- Hamilelik döneminde ya da estrojen kullanımıyla bağlantılı sarılık veya kaşıntı,
- Safra kesesi hastalığı,
- Sara,
- Migren,
- Astım,
- Diyabet (şeker hastalığı),
- Yüksek kan basıncı,
- Kandaki lipid düzeylerinde artış,
- Otoskleroz (kulak içi kemiklerdeki soruna bağlı işitme kaybı).
- Tiroid bezinizin yeterli miktarda tiroid hormonu üretmediği ve tiroid hormon replasman tedavisi görmenizi gerektiren bir durum olan hipotriodizm,
- Kalıtsal anjiyoödem veya eller, ayaklar, yüz, dudaklar, gözler, dil, boğaz (hava yolu tıkanması) veya sindirim sistemine ilişkin hızlı şişme ile seyreden rahatsızlık dönemleriniz oluyorsa,

Eğer sizde bu durumlardan herhangi biri mevcutsa doktorunuz özel önlemler almak isteyebilir.

Damarlarınızda pıhtı oluşma riskinde artış olabileceğini düşünüyorsanız, bunu doktorunuza söylediğinizden emin olunuz. Bu risk yaşla birlikte artar. Ayrıca aşağıdaki durumlarda da artabilir:

- Sizde ya da birinci derece yakınlarınızdan birinde daha önce, bacaklardaki veya akciğerlerdeki damarlarda pıhtılar olmuşsa,
- Sizde sistemik lupus eritematozus (ciltte pullanmayla kendini gösteren bir hastalık) varsa,
- Aşırı kiloluysanız,
- Birden fazla düşük yaptıysanız,
- Varisiniz varsa.

ESTRADERM TTS'yi kullanmadan önce, doktorunuzla kendi tıbbi öykünüz ve aile öykünüz konusunda görüşmelisiniz. Aynı zamanda tam bir fiziksel ve jinekolojik muayene yapılması gereklidir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ESTRADERM TTS'nin yiyecek ve içecek ile kullanılması

Kullanım yöntemi açısından ESTRADERM TTS'nin yiyeceklerle birlikte ya da tek başına alınmasında bir sakınca yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer hamileyseniz veya hamile kalmayı düşünüyorsanız ESTRADERM TTS'yi kullanmayınız. Estrojenler hamilelik sırasında alınırsa bebeğinize zarar verebilir.

ESTRADERM TTS hamileliği önlemez ve doğum kontrolü amacıyla kullanılmaz..

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ESTRADERM TTS kullanıyorsanız bebeğinizi emzirmeyiniz.

Araç ve makine kullanımı

Bilinen bir etkisi yoktur.

ESTRADERM TTS'nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ESTRADERM TTS'nin içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıdaki ilaçlardan birini alıyorsanız, dozu değiştirmeniz ve/veya başka önlemler almanız gerekebilir:

- Kaygı giderici ilaçlar (örn: meprobamat),
- Sara tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn: karbamazepin, fenitoin veya fenobarbital,),
- İltihap giderici bir ilaç olan fenilbutazon,
- Antibiyotikler ve enfeksiyon tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar (örn: rifampisin, rifabutin, nevirapin, efavirenz, ritonavir, nelfinavir),

- Bitkisel ilaçlar (örn: St. John's Wort yani sarı kantaron).

Bu ilaçlar ESTRADERM TTS tarafından etkilenebilir ya da tam aksine bu ilaçlar ESTRADERM TTS'nin etki gösterme düzeyini etkileyebilir. Doktorunuz tedavi dozunuzu ayarlama gereğini duyabilir.

Laboratuar testleri yaptırıcaksanız doktorunuza ESTRADERM TTS ile tedavi gördüğünüzü söyleyin. Glukoz toleransı (şeker hastalığı tanısı için) veya tiroid fonksiyonu testleri gibi bazı laboratuar testleri ESTRADERM TTS tedavisinden etkilenebilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacımıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. ESTRADERM TTS NASIL KULLANILIR?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Tedavi genellikle en düşük dozla başlatılmalıdır. Tedavi süreci içerisinde sizin kişisel gereksinimlerinize göre doktorunuz kullanacağınız dozu ayarlayacaktır.

Eğer histerektomi (rahmin cerrahi yolla alınması) geçirmediyse, doktorunuz size, estrojenin rahmin iç yüzeyine olan etkilerini dengeleyen progestajen adlı hormonu içeren tabletlerden verecektir. Doktorunuz bu tabletleri nasıl almanız gerektiğini size açıklayacaktır.

ESTRADERM TTS sadece gerek duyulduğu sürece kullanılmalıdır.

Genellikle ESTRADERM TTS'yi birkaç ay ya da daha uzun kullanmanız istenir. Bu menopoza sonrası belirtilerinizi kontrol etmeye ve kemik kaybının engellenmesine yardımcı olacaktır.

Belirli aralıklarla, doktorunuzla HRT (hormon yerine koyma tedavisi) ile ilişkili olası riskleri ve faydaları ve halen tedaviye ihtiyacınız olup olmadığını görüşmelisiniz.

HRT (hormon yerine koyma tedavisi) kullanan kadınlarda pıhtılaşma, meme kanseri, rahim kanseri, kalp hastalığı, inme ve muhtemel demans (bunama) gelişiminde risk artışı bulunabilir.

Eğer histerektomi (rahmin cerrahi yolla alınması) geçirmediyse, doktorunuz size, rahim kanseri riskini azaltmak için ek olarak progestajen adlı hormonu içeren tabletlerden verecektir. Progestajen tedavisi sonunda tedavinin kesilmesine bağlı kanama görülebilir. Eğer düzensiz ve/veya fazla kanamanız olursa doktorunuza söyleyiniz.

Tek başına uzun süre estrojen alan kadınlarda progestajen ile kombinasyonuna oranla yumurtalık kanseri gelişme riski yüksektir. Yumurtalık kanseri ve ESTRADERM TTS arasındaki ilişki bilinmemektedir..

Doktorunuzla kişisel tıbbi durumunuzu göz önünde bulundurarak bu riskleri ve faydaları tartışmalısınız.

Uygulama yolu ve metodu

Plasteri sürekli olarak kullanmanız gerekmektedir. Plasterinizi her 3-4 günde bir değiştirmelisiniz.

Plaster nereye uygulanmalıdır

Belinizden aşağıda herhangi bir deri bölgesini seçiniz. Bayan hastaların çoğu kaba etin en iyi bölge olduğunu ve bu bölgede deri tahrişinin daha az olduğunu bildirmişlerdir. Bundan dolayı ESTRADERM TTS'yi mümkün olduğunca kaba ete uygulayınız. Ayrıca sırtın alt bölgelerine, kalça, karın ya da uyluk bölgesinin üst tarafına da uygulanabilir. Dar giysiler plasterin yerinden çıkmasına sebep olabileceği için bel bölgesine uygulamaktan kaçınınız.

Uygulayacağınız bölgedeki deride iltihap, kesik ya da tahriş olmamalıdır. Plasterin daha iyi yapışması için, deri temiz, tıysüz, kuru ve serin olmalı ve deride nemlendirici, krem, losyon, yağ ya da pudra olmamalıdır.

Flasterinizi deęiřtirirken (3 ila 4 gnlk programınızla uyumlu olarak) yeni flasteri farklı bir blgeye uygulayın. Daha nceki bir flasterde kullanılan deri blgesine yeni bir flaster uygulamadan nce en az bir hafta bekleyin. Flasteri doęrudan gneř iřiđına maruz bırakmayın.

Plasteri asla meme zerine ya da yakınına yapıřtırmayınız.

Plasteri doęrudan gneř iřınına maruz bırakmayınız.

Tek dozluk paketlerin aılması

Her ESTRADERM TTS plasteri hava geirmez tek dozluk bir pakete konularak hava sızdırmayacak řekilde kapatılmıřtır. Bir haftalık tedavi iin gerekli ift paket iinde delikli bir izgiyle ayrılmıř iki paket vardır. Pořetlerden birini entikli tarafından yırtarak aınız ve plasteri ıkarınız. Makas kullanmayınız nk bu plastere zarar verebilir. İkinici pořetin zarar grmediđinden emin olunuz, nk kullanımdan nce hava ile temas etmesi halinde plaster etkisini kaybetmektedir. Yırtma esnasında paketlerin ikisi de aılırsa birini atınız.

Yeni plasteri yerleřtirmeden nce eskisini ıkarıp attıđınızdan emin olunuz.

Koruyucu astarın ıkarılması

Sert ve saydam olan koruyucu astar sistemin yapıřkan tarafını (yani derinize temas edecek olan tarafı) kaplar. Saydam astarın kk parasını ıkarınız. Sonra byk parasını sıyırın. Yapıřkan kısma dokunmaktan kaınınız ve yapıřkan kısımların birbirine yapıřmasını engellemek iin plasterin katlanmamasına dikkat ediniz. Artık plasteri uygulayabilirsiniz..

Plasterin uygulanması

Plasterin yapıřkan tarafını, setiđiniz deri blgesine avu iinizle sıkıca bastırınız. Bu řekilde 10-20 saniye kadar tutunuz. zellikle kenar blgelerinin iyi yapıřtıđını parmađınızla kontrol ediniz. Derinize yapıřtırdıktan sonra plasteri ekerek yapıřıp yapıřmadıđını kontrol etmeyiniz.

Pořeti aıp koruyucu astarı ıkardıktan sonra hemen derinize yapıřtırınız.

Plaster ne zaman ve nasıl ıkarılmalıdır

Plasteri haftada iki kez, haftanın aynı iki gnnde (rn: Pazartesi ve Perřembe gnleri) deęiřtiriniz. Hatırlayacađınızı dřndđnz iki gn seiniz. Kutu iinde hatırlamanıza yardımcı olması amacıyla hazırlanmıř etiketler bulacaksınız.

Tedaviye bařladıđımız haftanın gnne ait etiketi ıkarıp kutunun i kısmına yapıřtırınız. Plasteri deęiřtirme zamanınız geldiđinde, plasteri cildinizden ekip ıkarınız ve yapıřkan kenarı i kısma gelecek řekilde ikiye katlayınız. Halen iinde bir miktar ila bulunabileceđinden ocukların eriřemeyeceklerine emin olduđunuz bir yere dikkatlice atınız. Eđer cildinizde yapıřkan kalırsa o blgeyi 15 dakika kurumaya bırakınız. Daha sonra bu blgedeki yapıřkanı, yađ bazlı bir krem veya losyon ile yavařça ovarak temizleyebilirsiniz. Cildinizin temiz ve kuru farklı bir blgesine yeni bir plaster yapıřtırınız. Plasteri ıkardıktan sonra en az bir hafta boyunca aynı blgeye bařka bir plaster yapıřtırılmamalıdır.

Diđer faydalı bilgiler

- Uygulama doğru bir şekilde yapıldığı takdirde, banyo yapma, yüzme, duş alma veya egzersiz yapma durumunda plaster bundan etkilenmeyecektir. Plasterin çıkması halinde, üzerindeki suyu silkeleyerek uzaklaştırdıktan sonra derinizi kurulayınız ve tekrar yerine her zamanki gibi yapıştırınız.
- Güneşlenirken veya solaryum esnasında plasterin üzerinin giysilerle örtülü olduğundan emin olunuz.
- Yüzerken plaster mayonuzun içinde kalabilir.
- Plasteri asla terli bölgelere ya da sıcak bir banyo veya duştan hemen sonra uygulamayınız. Derinizin tamamen soğumasını ve kurumasını bekleyiniz.
- Eğer plaster düşerse, aynı plasteri derinizin başka bir yerine uygulayabilirsiniz ("Plaster nereye uygulanmalıdır" bölümüne bakınız). Deride temiz ve kuru olan ve losyon sürülmemiş bölge seçtiğinize emin olunuz. Plaster cildinize tamamen yapışmazsa yeni bir plaster kullanınız. Bunun hangi günde olduğu önemli değildir, başlangıçtaki çizelgeyle aynı günlerde plasteri değiştirmeye devam ediniz.
- Plasterdeki ilaç renksiz bir jel içindedir. Bu plasterin boş olduğu anlamına gelmez.

ESTRADERM TTS kullanırken

Doktorunuza düzenli olarak gidiniz ve en az yılda bir kez genel kontrol yaptırınız. Bazı hastaların daha sık gitmeleri gerekebilir. Doktorunuzla tedaviyi sürdürme ya da ayarlamalar yapma hakkında görüşmelisiniz.

Doktorunuz meme ve pelvis bölgesi muayenesi yapacaktır. Meme kontrolünüzü nasıl yapacağınızı öğrenmeniz ve bunu düzenli yapmanız önemlidir. Bu uygulama HRT'nin (hormon yerine koyma tedavisi) istenmeyen etkilerinin önlenmesine yardımcı olacaktır. Eğer herhangi bir anormallikten şüphelenirseniz doktorunuza bundan bahsediniz.

Hastaneye yatacaksanız ya da bir cerrahi operasyon geçirecekseniz bu konuda doktorunuzu önceden bilgilendiriniz. Eğer beklenmedik bir şekilde hastaneye gitmek zorunda kalırsanız, sizi kabul eden doktora ESTRADERM TTS kullandığınızı söyleyiniz. Uzun süre yatakta kalma, ciddi yaralar ya da ameliyatlar damarlarınızda pıhtı gelişiminde geçici risk artışına yol açabilir. Tamamen hareketli hale gelinceye kadar ESTRADERM TTS'ye yeniden başlamayınız.

ESTRADERM TTS kullanırken eğer kendinizi iyi hissetmezseniz, mümkün olan en kısa sürede doktorunuza ya da eczacınıza haber veriniz.

Sorularınız varsa doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanım

ESTRADERM TTS çocuklarda kullanılmamalıdır..

Yaşlılarda kullanım

Yaşlı hastalar için özel bir doz ayarlaması gerekli değildir.

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği

Böbrek/karaciğer yetmezliği olan hastalarda özel bir doz ayarlaması gerekli değildir. Ancak bu hastaların yakından takibi gereklidir.

Doktorunuz ya da eczacınız tarafından verilen talimatları dikkatle uygulayınız.

Doktorunuzla konuşmadan kullandığımız dozu değiştirmeyiniz ya da tedavinizi kesmeyiniz.

Eğer ESTRADERM TTS'nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ESTRADERM TTS kullandıysanız

ESTRADERM TTS'nin uygulanma şekline göre dozu aşımı olasılığı bulunmamaktadır.

ESTRADERM TTS'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ESTRADERM TTS'yi kullanmayı unutursanız

Plasteri uygulamayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz yeni bir plaster uygulayınız. Bunun hangi gün olduğu önemli değildir, başlangıçtaki çizelgeyle aynı günlerde plasteri değiştirmeye devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, ESTRADERM TTS'nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Bu yan etkiler bazen ciddi olabilir, ama çoğunlukla ciddi değildir.

ESTRADERM TTS'nin kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir:

Aşağıdakilerden biri olursa, ESTRADERM TTS'yi kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

- Alerjik yanıt belirtileri: nefes alma ya da yutkunma zorluğu, göğüste sıkışma, kurdeşen, genel deri döküntüsü, kabarma, kaşıntı, sersemlik, kusma, karın ağrısı
- Anjiyoödem belirtileri: yüzde, dudaklarda, dilde, boğazda ve/veya uzuvlarda şişme.
- Sarılık belirtileri: deride ya da gözlerde sararma, idrarın koyulaşması ve deride kaşıntı
- Vücudunuzda kan pıhtıları oluşmasına bağlı belirtiler: uyluk, baldır ve göğüste ağrı, ani nefes darlığı, öksürükle birlikte ağızdan kan gelmesi ya da baş dönmesi,
- Kalp krizi belirtileri: göğüs ağrısı, baş dönmesi, bulantı, nefes darlığı, düzensiz nabız,
- İnme belirtileri: yığılma=kollaps, kollarda ve bacaklarda hissizlik ya da kuvvetsizlik, baş ağrısı, baş dönmesi ve zihin karışıklığı, görme bozukluğu, yutma güçlüğü, geveleyerek konuşma ya da konuşamama.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ESTRADERM TTS'ye karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Yukarıdaki yan etkiler çok ciddi yan etkilerdir ve acil tıbbi müdahale gerektirir.

Bu ciddi yan etkiler seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz

- Memede hassasiyet, şişlik ya da ağrı,
- Ani kanama
- Plaster altında kaşıntı, ağrı ve plaster çıkarıldıktan sonra derinizde kızarıklık olması,

Bu yan etkiler çok yaygın görülür.

- Baş ağrısı
- Baş dönmesi
- Karında şişkinlik
- Ağrı (kol ve bacaklarda ağrı, karın ağrısı, sırt ağrısı)

Bu yan etkiler yaygın görülür.

- Memede şişlik veya kitle (meme kanserinin olası belirtileri)

Bu yan etki yaygın olmayan yan etkilerdir.

- Bař dönmesi
- Bacakların alt kısmında, bileklerde, parmaklarda ve karında su toplanmasına baėlı şişme
- Kiloda deėişmeler

Bu yan etkiler seyrek görülür..

- Kan basıncında artma
- Kaşıntı, döküntü ve deride iltihap
- Deri renginde deėişme

Bu yan etkiler çok seyrek görülür.

- Duygu durumunda hızlı deėişiklikler (depresyon, asabiyet vs.)
- Cinsel istekte deėişimler
- Migren
- İshal
- Kusma
- Safra kesesi bozuklukları (safra taşı oluřturma yatkınlığı)
- Saç dökülmesi
- Özellikle yüz ve karında derinin koyulařması (kloasma)
- Düzensiz aėır vajinal kanama veya sürekli leke řeklinde kanama (endometriyal hiperplazi adı verilen durumun olası belirtileri)
- Fibroidler (rahimde oluřan iyi huylu yapılar)

Bu yan etkilerin görülme sıklığı bilinmemektedir.

Hormon replasman tedavisi ile iliřkilendirilen diėer yan etkiler

- Rahim içi kanseri (endometrial kanser) gibi, estrogenlere baėlı anormal tümör büyümesi
- Hafıza ve zihinsel beceri kaybı
- Göz kuruluėu
- Lenste rahatsızlık

Eėer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karřılařırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. ESTRADERM TTS'NİN SAKLANMASI

ESTRADERM TTS'yi çocukların göremeyeceėi, erişemeyeceėi yerlerde ve ambalajında saklayınız.

ESTRADERM TTS'yi, 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız ve direkt güneş ışığından uzak tutunuz.

ESTRADERM TTS'yi buzdolabında saklamayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra ESTRADERM TTS'yi kullanmayınız.

Eėer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ESTRADERM TTS'yi kullanmayınız.

RUHSAT SAHİBİ

Novartis Ürünleri 34912, Kurtköy/İstanbul

ÜRETİCİ

Novartis Pharma AG Basel, İsviçre

Bu kullanma talimatı 17.02.2012 tarihinde onaylanmıştır.