

## KULLANMA TALİMATI

**ADDAMEL N IV İnfüzyon için konsantre solüsyon**  
**Damar içine uygulanır.**

**Etkin madde:** Krom klorür, bakır klorür, demir klorür, manganer klorür, potasyum iyodür, sodyum florür, sodyum molibdat.2H<sub>2</sub>O, sodyum selenit.(anhidr), çinko klorür

**Yardımcı Madde(ler):** Ksilitol, hidroklorik asit, enjeksiyonluk su

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.*

### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. **ADDAMEL N nedir ve ne için kullanılır?**
2. **ADDAMEL N kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **ADDAMEL N nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **ADDAMEL N'in saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

#### **1. ADDAMEL N nedir ve ne için kullanılır?**

- ADDAMEL N, vücut için gerekli olan eser elementleri içeren, damardan kullanılmak üzere hazırlanmış, steril çözeltidir
- ADDAMEL N; berrak hemen hemen renksiz çözelti içeren 10 ml'lik 20 adet plastik ampul içeren kutulardadır.
- ADDAMEL N yetişkinlerin damar yoluyla beslenmesinde eser element gereksinimini karşılamak üzere tamamlayıcı olarak kullanılır.

#### **2. ADDAMEL N kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

**ADDAMEL N'yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

- Safra yollarının tam tıkanması
- ADDAMEL N'in etkin maddelerinden ya da yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık durumları

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

## **ADDAMEL N'nin yiyecek ve içecek ile kullanılması**

ADDAMEL N'in yiyecek ve içeceklerle kullanılmasında bilinen bir etkisi yoktur.

### **Hamilelik:**

Bu ürünle ilgili, hamilelik sırasında klinik araştırmalar ve hayvanlarda üreme çalışmaları gerçekleştirilmemiştir. Buna rağmen, hamile bir kadının eser elementlere olan gereksinimi, hamile olmayan kadınlarla karşılaştırıldığında aynıdır veya hatta hafifçe artmıştır. ADDAMEL N hamilelik sırasında kullanılacağı zaman yarar/risk durumu değerlendirildikten sonra karar verilmelidir.

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

*Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

### **Emzirme:**

ADDAMEL N'in emzirme döneminde kullanımından önce risk/yarar ilişkisi dikkate alınmalıdır.

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

### **Araç ve makine kullanımı:**

Herhangi bir olumsuz etkiye rastlanılmamıştır.

### **Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı:**

Diğer ilaçlarla etkileşim görülmemiştir.

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

## **3. ADDAMEL N nasıl kullanılır?**

### **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

**Yetişkinlerde kullanımı:** ADDAMEL N 'nin bazal gereksinimi orta derecede artmış hastalarda günlük dozu 10 ml (1 ampul)'dir.

### **Uygulama yolu ve metodu:**

Damar yoluyla verilir.

ADDAMEL N seyreltilmeden verilmemelidir.

### **Değişik yaş grupları:**

**Çocuklarda kullanımı:** 15 kg ve üstündeki çocuklarda tavsiye edilen doz kg başına günde 0,1 ml ADDAMEL N'dir.

**Yaşlılarda kullanımı:** Özel bir doz ayarlaması gerekmemektedir.

**Böbrek/Karaciğer yetmezliği:** ADDAMEL N, eser elementlerin atılımının belirgin biçimde azalabileceği karaciğer ve/veya böbrek bozukluğu olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. ADDAMEL N, biyokimyasal veya klinik olarak karaciğer yetmezliği belirtisi olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

*Eğer ADDAMEL N'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

**Kullanmanız gerekenden daha fazla ADDAMEL N kullandıysanız:**

*ADDAMEL N'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

**ADDAMEL N'yi kullanmayı unutursanız:**

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

#### **4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar için geçerli olduğu gibi ADDAMEL N'nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

ADDAMEL N içeriğinde bulunan eser elementlere ait herhangi bir yan etki bildirilmemiştir.

#### **5. ADDAMEL N'nin saklanması**

25 °C' nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

*ADDAMEL N'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ADDAMEL N'yi kullanmayınız.*

#### **Ruhsat sahibi:**

Fresenius Kabi İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.  
Güney Plaza Eski Büyükdere Asfaltı,  
No:17/4B, Kat:2, 34398, Maslak/ İstanbul  
Tel: (212) 365 56 56  
Faks: (212) 365 56 99  
e-posta: info.turkey@ fresenius-kabi.com

#### **Üretici:**

Fresenius Kabi Norge AS,  
P.O. Box 430  
1753 Halden  
Norveç

*Bu kullanma talimatı ..... tarihinde onaylanmıştır.*