

## KULLANMA TALİMATI

**ANZİBEL 5 mg / 4 mg / 3 mg MEYANBALLI pastil**  
Ağızda eriterek alınır.

- **Etkin madde:** Her bir pastil 5 mg klorheksidin hidroklorür, 4 mg benzokain ve 3 mg enoksolon içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Sorbitol (Sorbideks S16606) (E420), asesülfam potasyum, magnezyum stearat ve meyanbalı (Liquorice PF 1062)

**Bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

*Bu ilaç sizin reçetesiz olarak temin edip bir doktor yardımı olmadan eczacınızın tavsiyesi ile hafif bir hastalığı tedavi etmeniz içindir. Buna karşın, yine de ANZİBEL MEYANBALLI'dan en iyi sonuçları alabilmeniz için dikkatli kullanmanız gerekmektedir.*

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

### **Bu Kullanma Talimatında:**

- 1. ANZİBEL MEYANBALLI nedir ve ne için kullanılır?***
- 2. ANZİBEL MEYANBALLI'yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler***
- 3. ANZİBEL MEYANBALLI nasıl kullanılır?***
- 4. Olası yan etkiler nelerdir?***
- 5. ANZİBEL MEYANBALLI'nın saklanması***

**Başlıkları yer almaktadır.**

## 1. ANZİBEL MEYANBALLI nedir ve ne için kullanılır?

ANZİBEL MEYANBALLI, etkin madde olarak 5 mg klorheksidin hidroklorür, 4 mg benzokain ve 3 mg enoksolon içerir. 20 pastil içeren ambalajlarda satışa sunulmuştur.

ANZİBEL MEYANBALLI, içerdiği aktif maddelerden klorheksidin'in antiseptik etkisi, enoksolon'un ağız-boğaz mukozası üzerindeki iltihap giderici etkisi ve benzokain'in lokal anestezi etkisinin bir araya gelmesiyle, ağız-boğaz bölgesindeki tahrişlere bağlı rahatsızlıkların ortadan kaldırılmasına yardımcı olur.

ANZİBEL MEYANBALLI burun akıntısı, ani ısı değişimi, toz gibi dış faktörler nedeniyle meydana gelebilen, boğaz ağrıları ve ağız-boğaz bölgesinin hafif enfeksiyöz ve iltihabi durumlarında bölgesel ve geçici rahatlama sağlar.

## 2. ANZİBEL MEYANBALLI'yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

### ANZİBEL MEYANBALLI'yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

- ANZİBEL MEYANBALLI pastil'in etken maddelerine ya da içeriğinde bulunan diğer yardımcı maddelere veya diğer anestezi etkili ester türevlerine karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa
- Fenilketonüri (Folling hastalığı) denen, kalıtsal enzim eksikliği sonucunda ortaya çıkan metabolik hastalığınız varsa

### ANZİBEL MEYANBALLI'yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

- Bölüm 3'te belirtilen dozlardan daha yüksek dozlarda kullanmayınız.
- Eğer durumunuz kötüleşiyorsa, 2 günden daha uzun süredir devam ediyorsa ya da eşlik eden ateş, baş ağrısı, bulantı veya kusma varsa doktorunuza bildirin.
- Yaşlılar, çocuklar ve zayıf hastalar benzokain'e karşı daha duyarlı olabileceğinden dikkatli kullanınız.
- Enoksolon ile yüksek dozda ve sürekli tedavi, vücutta sodyum fazlalığına, ödem ve yaşlılarda yüksek tansiyona neden olabilir.
- Belli bir bölgeyi uyuşturma amaçlı kullanılan diğer ester tipi lokal anestezikleri (özellikle para-aminobenzoik asit (PABA) türevleri), parabenleri ve parafenilendiaminleri tolere edemeyen hastalar benzokaini de tolere edemez.
- Ağız içinde ciddi travma oluşumu varsa, risk-yarar oranı doktor tarafından değerlendirilmelidir.
- Kesici dişlerin dolgusu sırasında eğer dolgunun yüzeyi veya kenarlar pürüzlü ise klorheksidin ile kalıcı lekeler oluşabilir. Bu durumda, risk-yarar oranı doktor tarafından değerlendirilmelidir.
- Klorheksidin, diş eti iltihabınız varsa, dişeti üstünde diş taşına artışa neden olur.
- Klorheksidin'in neden olduğu diş lekelenmeleri ve plak birikimini azaltmak için, tartar kontrollü diş macunu ile ağız içi hijyeni sağlanmalıdır.
- Bu ürünün bileşiminde bulunan benzokain, doping kontrolünün pozitif sonuç vermesine neden olabilir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

### **ANZİBEL MEYANBALLI'nın yiyecek ve iecek ile kullanılması**

ANZİBEL MEYANBALLI pastil a ya da tok karına kullanılabilir. Ancak pastili ağızınızda eritirken herhangi bir Őey yememeli ya da imemelisiniz. İlacı almadan nce ağızınızı nemlendirmek iin bir miktar su iebilirsiniz.

### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

ANZİBEL MEYANBALLI hamilelikte doktor nerisi ile yarar/zarar oranı deęerlendirilerek kullanılmalıdır.

*Tedaviniz sırasında hamile olduęunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

### **Emzirme**

*İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

ANZİBEL MEYANBALLI'nın ierięinde bulunan maddeler anne stne geebilir. ANZİBEL MEYANBALLI kullanıyorsanız bebeęinizi emzirmeyiniz.

### **Ara ve makine kullanımı**

ANZİBEL MEYANBALLI'nın ara ve makine kullanımı zerine bildirilen herhangi bir olumsuz etkisi yoktur.

### **ANZİBEL MEYANBALLI'nın ierięinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında nemli bilgiler**

ANZİBEL MEYANBALLI pastil tatlandırıcı madde olarak sorbitol iermektedir. Eęer doktorunuz tarafından bazı Őekerlere karřı hassasiyetiniz olduęu sylenmiře, bu ilacı kullanmadan nce doktorunuza danıřınız.

### **Dięer ilalar ile birlikte kullanımı**

ANZİBEL MEYANBALLI ile birlikte bařka bir ila kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Anestezi amalı kullanılan benzokain, Myastenia Gravis, glokoma (gz tansiyonu), Alzheimer gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan kolinesteraz inhibitrleri ve çeřitli bakterilerin neden olduęu enfeksiyonların tedavisinde kullanılan slfonamidler diye adlandırılan ilalarla etkileřim gsterebilir.

Antiseptik ieren dięer ilalarla kullanmayınız.

Enoksolon ve hidrokortizonun birlikte kullanımının hidrokortizonun deri zerindeki etkisini artırdıęına dair hayvan alıřmaları bulunmaktadır.

ANZİBEL MEYANBALLI, ierięindeki meyanın potasyum minerali zerindeki etkisinden dolayı, idrar sktrc olarak kullanılan furosemid/tiyazid diretikleri, kalp hastalıkları iin kullanılan dijital glikozitleri ve kalp ritim bozukluęunda kullanılan prokainamid, kinidin gibi ilalar ile birlikte kullanılmamalıdır.

ANZİBEL MEYANBALLI, kortikosteroidler ile birlikte kullanılmamalıdır.

Anyonik bileşikler, süspansiyon ajanları, diş macununun içeriğinde bulunan maddeler klorheksidin'in etkinliğini azaltabilir. Bu nedenle, dişlerinizi fırçaladıktan sonra ağızınızı iyice yıkamalısınız.

ANZİBEL MEYANBALLI pastil, bentromid kullanılarak yapılan pankreas fonksiyon testleri ile etkileşebilmektedir. Bu testleri yaptırmadan en az 3 gün önce, ANZİBEL MEYANBALLI kullanmayı bırakınız ve doktorunuza bilgi veriniz.

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### **3. ANZİBEL MEYANBALLI nasıl kullanılır?**

#### **Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:**

ANZİBEL MEYANBALLI pastil ağız ve boğaz bölgesine uygulanır. Doktorunuz tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde belirtilen dozlarda kullanınız.

*12 yaşından büyük çocuklar ve erişkinler için önerilen doz:*  
2-3 saatlik aralar ile alınan 1 pastil ağızda yavaşça eritilir.  
Günde en fazla 8 pastil alınabilir.

Doktorunuz ANZİBEL MEYANBALLI pastilleri ne kadar süre boyunca kullanmanız gerektiğini size söyleyecektir. Tedavi süresi genellikle 2 gündür. Eğer durumunuz kötüleşirse doktorunuza bildiriniz.

#### **Uygulama yolu ve metodu:**

ANZİBEL MEYANBALLI pastilleri çiğnmeden ve yutmadan ağızda yavaşça eriterek kullanınız.

Pastiller çiğnenmemeli ve yutulmamalıdır; çünkü bölgesel etkili bir ürün olan ANZİBEL MEYANBALLI pastil ancak iltihaplı ağız-boğaz bölgesine uzun süre direkt temas ettiği fayda sağlamaktadır.

#### **Değişik yaş grupları:**

##### **Çocuklarda kullanım:**

*6-12 yaş arasındaki çocuklar için önerilen doz:*  
4-5 saatlik aralar ile alınan 1 pastil ağızda yavaşça eritilir.  
Günde en fazla 6 pastil alınabilir.

6 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.

##### **Yaşlılarda kullanım:**

Yaşlılar benzokainin zararlı etkilerine daha duyarlı olabilir.

*Eğer ANZİBEL MEYANBALLI'nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

**Kullanmanız gerekenden daha fazla ANZİBEL MEYANBALLI kullandıysanız:**

*ANZİBEL MEYANBALLI'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

**ANZİBEL MEYANBALLI'yı kullanmayı unutursanız:**

ANZİBEL MEYANBALLI'yı kullanmayı unutursanız, hatırladığımız anda alınız.

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

**ANZİBEL MEYANBALLI ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:**

Bulunmamaktadır.

**4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi, ANZİBEL MEYANBALLI'nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkilerin sınıflandırılmasında aşağıdaki sıklık sıralaması kullanılmıştır;

Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- Alerjik reaksiyonlar (bazen eşlik eden burun akıntısı, kaşıntı ve deri döküntüsü ile birlikte)
- Ağızda veya dil ucunda tahriş
- Ağız içinde veya etrafında batma, kaşıntı, şişme veya kızarıklık
- Tad alma bozukluğu
- Ödem (vücutta sıvı tutulumuna bağlı oluşan şişme)
- Yüksek tansiyon (hipertansiyon)
- Dişlerde renk değişikliği

Bunların hepsi ciddi ancak seyrek görülen yan etkilerdir.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

**Yan etkilerin raporlanması**

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri [www.titck.gov.tr](http://www.titck.gov.tr) sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

## **5. ANZİBEL MEYANBALLI'nın saklanması**

*ANZİBEL MEYANBALLI'yı çocukların göremeyeceđi, erişemeyeceđi yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

### **Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ANZİBEL MEYANBALLI'yı kullanmayınız.*

Eđer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ANZİBEL MEYANBALLI'yı kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

### ***Ruhsat sahibi:***

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.  
Ümraniye 34768 İSTANBUL

### ***Üretim yeri:***

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.  
Sancaklar 81100 DÜZCE

*Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.*