

## KULLANMA TALİMATI

### ARTHROTEC® 75 mg / 200 mcg Tablet

Ağızdan alınır.

- **Etkin maddeler:** Her tablet 75 mg diklofenak sodyum, 200 mikrogram misoprostol içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Laktoz monohidrat, mikrokristalin selüloz, mısır nişastası, PVP K 30, magnezyum stearat , metakrilik asit kopolimer tip C, sodyum hidroksit, talk, trietil sitrat, hipromelloz (HPMC) 3mPa.s, krospovidon, koloidal susuz silika, hidrojenlenmiş hint yağı. Ürün, sığır kaynaklı laktoz monohidrat hammaddesini içermektedir.

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa lütfen, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük doz kullanmayınız.***

### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. *ARTHROTEC nedir ve ne için kullanılır?*
2. *ARTHROTEC'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler*
3. *ARTHROTEC nasıl kullanılır?*
4. *Olası yan etkiler nelerdir?*
5. *ARTHROTEC'in saklanması*

**Başlıkları yer almaktadır.**

### **1. ARTHROTEC nedir ve ne için kullanılır?**

ARTHROTEC 10 ve 20 tabletlik blister ambalajlarda piyasada bulunmaktadır.

ARTHROTEC;

- Eklemlerde ağrı, şişlik ve şekil bozukluğuna neden olan devamlı bir hastalığın (romatoid artrit)
- Eklemlerin aşınması sonucu ortaya çıkan ve halk arasında kireçlenme olarak bilinen bir hastalığın (osteoartrit)

- Sıklıkla bel, sırt ve boyun bölgelerini etkileyen ve buralarda ağrı, hareket kısıtlılığı ve şekil bozukluğuna (kamburluk) neden olabilen bir hastalığın (ankilozan spondilit)

belirti ve bulgularının tedavisinde,

Ayrıca;

- Akut kas-iskelet sistemi ağrıları
- Travma ve ameliyat sonrası ağrılı iltihap ve şişlikleri
- Akut gut artriti
- Ağrılı adet görme (dismenore)

tedavisinde endikedir.

ARTHROTEC diklofenak ve misoprostol içerir. Diklofenak steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) adı verilen bir ilaç grubuna aittir.

NSAİİ'ler ağrıyı azaltsalar da, mide duvarındaki prostaglandinler adı verilen doğal koruyucu maddelerin azalmasına sebep olurlar.

Bu da NSAİİ'lerin midenin bozulmasına ya da mide ülserinin oluşmasına neden olduğu anlamına gelir. ARTHROTEC midenizi korumanıza yardım edecek olan bu prostaglandinlere çok benzer olan misoprostolü de içerir.

## **2. ARTHROTEC'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

### **ARTHROTEC'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

Eğer:

- Diklofenak ya da aspirin (asetilsalisilik asit), misoprostol ya da diğer prostaglandin ilaçlar ya da ARTHROTEC'in birleşiminde yer alan herhangi bir bileşenin alımından sonra deri döküntüsü, deride şişme ya da kaşıntı, şiddetli burun tıkanıklığı, astım ya da hırıltı gibi alerjik reaksiyonlar yapıyorsa,
- Mideniz ya da bağırsağınızda mevcut ülser ya da delik varsa,
- Hali hazırda mide, bağırsak ya da beyin kanaması geçiriyorsanız,
- Kalp ameliyatı (koroner arter by-pass greftleme (KABG)) geçirdiyeniz ya da geçirecekseniz,
- Şiddetli karaciğer ya da böbrek yetmezliğiniz varsa,
- Teşhis edilmiş kalp ve/veya beyin-damar hastalığınız varsa, örneğin; kalp krizi, felç, geçici iskemik atak, kalp veya beyin damarlarında bir tıkanıklık ve bununla ilgili cerrahi müdahale veya bypass geçirdiyeniz,
- Önceden geçirdiğiniz veya devam etmekte olan dolaşım sistemi problemlerinizi varsa (periferik damar hastalıkları)
- Hamile veya hamile kalmayı planlayan kadınlarda düşüğe sebep olabileceği için kullanılmamalıdır. Henüz menapoza girmemiş kadınlar ARTHROTEC kullanırken güvenilir bir korunma yöntemi kullanmalıdır.
- Çocuk doğurma yaşında olan bir kadınsanız ve hamile kalmaktan kaçınmak için etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanmıyorsanız (ayrıntılı bilgi için 'Hamilelik'le ilgili kısma bakınız).

## ARTHROTEC’i ařağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eęer;

- Böbrek ya da karacięer hastalıęı gibi saęlık problemleriniz var ise dikkatli kullanınız. Eęer řiddetli böbrek veya karacięer yetmezlięiniz var ise ARTHROTEC’i kullanmayınız.
- Daha önceden ülser veya mide, baęırsak kanaması geçirdiyseniz dikkatli kullanınız. Sürekli ülser veya mide ya da baęırsak kanaması geçiriyorsanız ARTHROTEC’i kullanmayınız.
- Kolayca kanama ya da morarma oluřuyorsa,
- Baęırsaklarınızda iltihap varsa (ülseratif kolit ya da Crohn hastalıęı),
- Astım veya alerji hastasıysanız ya da daha önceden geçirdiyseniz,
- Enfeksiyon kaptıysanız (ARTHROTEC ateři ya da enfeksiyon göstergelerini maskeleyebilir. ),
- Su kaybınız varsa,
- 65 yařın üstündeyseniz
- Deri rahatsızlıęınız varsa
- Anemi gibi, kan ile ilgili rahatsızlıęınız varsa, doktorunuz sizi düzenli kontrol altında tutmak isteyecektir.
- Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız (ayrıntılı bilgi için ‘Hamilelik’le ilgili kısımaya bakınız). Fetusa zarar verme riskinden dolayı Arthrotec tedaviniz hemen durdurulmalıdır
- Çocuk doğurma yařındaysanız (ayrıntılı bilgi için ‘Hamilelik’le ilgili kısımaya bakınız). Bu ilacı alırken etkili doğum kontrol yöntemleri kullanılması önem tařır.

ARTHROTEC gibi NSAİİ’ler kanamaya ya da ülserleřmeye sebep olabilirler. Bu durum görölürse tedavi bırakılmalıdır. ARTHROTEC’in aspirin dıřında bařka bir NSAİİ ile birlikte (örn. ibuprofen) kullanımı, aynı zamanda mide-baęırsak ülseri veya kanaması sıklıęını arttırabilir.

ARTHROTEC, kortikosteroid (örn. prednizon), ağızdan alınan kan sulandırıcı (oral antikoagölan) veya antidepresan (Seęici serotonin geri salım inhibitörü olan sertralin) kullanıyor veya alkol alıyorsanız, mide ve baęırsak komplikasyonları bařta olmak üzere ciddi yan etkilere neden olabilir.

Ařağıdakiler sizin için geçerliyse ARTHROTEC almadan önce doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz:

- Sigara kullanımı
- Diyabet
- Angina (göęüs aęrısı), kan pıhtılařması, yüksek kan basıncı, kan yağlarında artış (kolestrol veya trigliserid)

ARTHROTEC gibi ilaęlar kalp krizi (miyokart enfarktüsü) ya da inme riskinin az miktarda artışına sebep olabilir. Göęüs aęrısı, nefes darlıęı, güçsüzlük, düzgün konuřma yetisinde bozulma gibi belirti ve semptomlardan herhangi birini fark etmeniz durumunda derhal doktorunuzu arayınız. Uzun dönem tedavide ya da yüksek dozda risk artar. Tedavi boyunca tavsiye edilen dozu ařmayınız.

Yan etkiler, gerekli olan en kısa süre için, en düşük etkili doz kullanılarak azaltılabilir.

Diğer NSAİİ'ler gibi (örneğin ibuprofen) ARTHROTEC kan basıncının artmasına sebep olabilir ve doktorunuz kan basıncınızı düzenli olarak izleyebilir.

Kalp, karaciğer ya da böbrek probleminiz varsa, doktorunuz sizi düzenli olarak gözlemlemek isteyecektir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

### **ARTHROTEC'in yiyecek ve içecek ile kullanılması**

ARTHROTEC yemeklerle birlikte alınmalıdır.

### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

Hamile iseniz, hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız ya da hamile kalmayı planlıyorsanız ARTHROTEC kullanmayınız. Fetusa zarar verme riski olasılığı nedeniyle tedaviye başlamadan önce hamile olmadığınızdan emin olmalısınız. Henüz menapoza girmemiş kadınlar ARTHROTEC kullanırken, güvenilir bir korunma yöntemi kullanmalıdır.

ARTHROTEC alırken hamile kalmanız durumunda düşük, prematüre doğum, fetusta normal dışı oluşuma (doğum kusurları) neden olabileceğinden doktorunuz size riskler konusunda bilgi verecektir. Hamile iseniz, çocuğunuzda, ölüm dahil özellikle kalp, akciğerler ve/veya böbreklerde ciddi sonuçlar doğurabileceğinden bu ilacı KESİNLİKLE kullanmayınız. Hamilelik sırasında bu ilaçla tedavi aldıysanız, doktorunuzla görüşünüz. Hamileliğe devam etmeye karar vermeniz durumunda gebeliğin kol ve bacaklar ile kafaya özel dikkat göstererek dikkatli bir ultrason taramasıyla izlenmesi gerekir.

*Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

### **Emzirme:**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

Emzirme dönemi süresince ARTHROTEC kullanmayınız.

### **Araç ve makine kullanımı**

ARTHROTEC'i aldıktan sonra baş dönmesi, sersemlik olursa, normal hissedene kadar araç ve makine kullanmayınız.

### **ARTHROTEC'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

ARTHROTEC'in içinde laktoz (bir tip şeker) bulunmaktadır. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı duyarlılığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

ARTHROTEC'in içinde hidrojen hint yağı bulunmaktadır. Mide bulantısına ve ishale sebep olabilir.

### **Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

Bazı ilaçlar diğer ilaçların çalışma sistemini etkileyebilir. Doktorunuza ya da eczacınıza hangi ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

- Aspirin (asetilsalisik asit) veya diğer NSAİİ'ler (örneğin ibuprofen)
- Siklo-oksijenaz-2 (COX-2) inhibitörleri olarak bilinen eklem iltihabı ve kireçlenmeyi tedavi eden ilaçlar
- Diüretikler (örneğin furosemid) (vücudunuzdaki fazla sıvının tedavisi için kullanılır.)
- Siklosporin ya da takrolimus (bağışıklık sistemini baskılama, organ nakli sonrası)
- Lityum (bazı depresyon tiplerinin tedavisinde kullanılır)
- Digoksin (düzensiz kalp atışı ve/veya kalp yetmezliği için kullanılan ilaç)
- Varfarin ya da diğer oral (ağızdan alınan) antikoagulanlar (kanın pıhtılaşmasını azaltan kan inceltici ajanlar, örn. aspirin)
- Anksiyete (kaygı) ve depresyon tedavisinde kullanılan seçici seratonin geri alım inhibitörleri (SSRI) olarak bilinen ilaçlar
- Kan şekerinizi kontrol eden ilaçlar (diyabet için ağızdan alınan hipoglisemikler)
- Metotreksat (eklem iltihabı, sedef hastalığı, kan kanseri için kullanılan ilaç)
- Steroid tedavisi (örneğin genellikle antienflamatuar ilaçlar olarak kullanılan kortikosteroidler)
- Yüksek kan basıncı için ilaçlar (antihipertansifler)
- Magnezyum içerikli antiasitler (sindirim güçlüğü ve mide yanması gibi durumların tedavisinde kullanılır.)
- Kinolon antibiyotikler (bazı enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.)
- Ketokonazol, flukonazol, mikonazol ve vorikonazol (mantar enfeksiyonunu tedavi etmek için kullanılır.)
- Amiodoron (anormal kalp atışını tedavisinde kullanılır)
- Sülfipirazol (gut tedavisinde kullanılır)
- Eğer mifepriston (gebeliği sonlandırmak için kullanılır) adlı bir ilacı 12 gün içerisinde kullandıysanız, ARTHROTEC'i mifepristonun alımından itibaren 8-12 gün boyunca kullanmayınız.
- Güçlü CYP2C9 inhibitörleri (örn. sülfipirazon, vorikonazol)

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### **3. ARTHROTEC nasıl kullanılır?**

#### **• Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

ARTHROTEC'i doktorunuzun veya eczacınızın tavsiye ettiği şekliyle kullanınız. Emin olmadığınız durumlarda doktor veya eczacınız ile birlikte kontrol ediniz.

İlacı almanıza sebep olan belirtileri kontrol altına alabilecek en kısa süreli, etkili en düşük doz ile istenmeyen etkiler azaltılabilir.

- **Uygulama yolu ve metodu**

Günde iki kez yemekle beraber 1 tablet alınır. Tabletler bütün olarak yutulmalı, çiğnenmemelidir.

- **Değişik yaş grupları:**

**Çocuklarda kullanımı:**

ARTHROTEC yalnızca yetişkinler içindir, 18 yaş altı çocukların kullanımı için değildir.

**Yaşlılarda kullanımı:**

Doktorunuz sizi yakın gözetim altında tutacaktır. Dozda değişiklik gerekmez.

- **Özel kullanım durumları:**

**Böbrek ve karaciğer yetmezliği:**

Karaciğer ve böbrek bozukluğu olan hastalarda, doktorunuz sizi yakın gözetim altında tutacaktır. Dozda değişiklik gerekmez.

*Eğer ARTHROTEC'in etkisinin çok güçlü ve zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

**Kullanmanız gerekenden fazla ARTHROTEC kullandıysanız:**

Doktorunuzun size önerdiğinden daha fazla tablet kullanmayınız.

*ARTHROTEC'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

**ARTHROTEC'i kullanmayı unutursanız**

Eğer ARTHROTEC almayı unutursanız hemen bir doz alınız.

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

**ARTHROTEC ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler**

Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe, ARTHROTEC'i kesmeyiniz. Bu ürünün kullanımı ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, doktorunuza ya da eczacınıza sorunuz.

**4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi ARTHROTEC'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Eğer yan etkilerle ilgili endişeleniyorsanız, doktorunuza sorunuz. Eğer ARTHROTEC'in bir yan etkisi varsa, bu etkilerin neler olabileceğini bilmek önemlidir. ARTHROTEC bazen yan etkilere sebep olabilir ama bunlar genellikle tedavi sırasında vücudunuz bu ilaca alıştığında yok olur.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.

Çok yaygın : 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.  
Seyrek : 1000 hastanın birinden az, fakat 10000 hastanın birinden fazla görülebilir.  
Çok seyrek : 10000 hastanın birinden az görülebilir.  
Bilinmiyor : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilmiyor.

**Aşağıdakilerden biri olursa, ARHROTEC’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- Halsizlik veya vücudun bir tarafını hareket ettirememeye, geveleyerek konuşma (felç) veya göğüs ağrısı (kalp krizi) veya kalp yetmezliği veya çarpıntı (kalp atışını hissetme)
- Nefes darlığı
- ARHROTEC, beyaz kan hücrelerinin (bunlar vücudunuzu enfeksiyon ve hastalıklara karşı korumaya yardımcı olurlar) sayısında azalmaya ve üşüme, ani ateş, boğaz ağrısı veya grip benzeri belirtilerin eşlik ettiği enfeksiyona neden olabilir.
- Şiddetli mide ağrısı, siyah ya da kana bulanmış dışkı ya da kan kusma gibi midede veya bağırsakta kanama ya da yırtılma
- Döküntü, sıvı dolu kabarcık, deride soyulma gibi ciddi deri reaksiyonları (Stevens-Johnson sendromu, ekzfoliyatif dermatit ve toksik epidermal nekroliz)
- Deride döküntü, yüzde şişme, hırıltı ya da nefes almada güçlük (anafilaktik şok) gibi ciddi deri reaksiyonları
- Sarılık (deriniz ya da gözlerinizin akı sararır)
- Trombosit sayısında düşüş (kanama veya morarma olasılığında artış)
- Beyin zarı iltihabı (menenjit) belirtileri (boyunda sertlik, baş ağrısı, mide bulantısı, kusma, ateş ya da bilinç kaybı)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

**Çok yaygın:**

- Mide ağrısı, ishal, mide bulantısı, sindirim güçlüğü

İshal en genel problemdir ve bazen şiddetlidir. ARHROTEC’i yiyeceklerle birlikte alırsanız ishal olma riskiniz azalır. Eğer antiasit kullanırsanız (midenizdeki asiti azaltmaya çalışan ilaç) magnezyumlu antiasitlerden kaçınınız çünkü ishalinizi şiddetlendirebilir. Eczacınız size uygun bir antiasit seçmenize yardımcı olacaktır. Eğer ishal devam ederse ve şiddetli ise doktorunuza söyleyiniz.

**Yaygın:**

- Döküntü, kaşıntı
- Kusma, gaz, kabızlık, geğirme, gastrit (sindirim güçlüğü, mide ağrısı, kusma)
- Midede ya da bağırsakta ülser
- Baş ağrısı, sersemlik
- Uykuda zorluk
- Karaciğere bağlı olarak kan testlerindeki değişiklik
- Bağırsaklar dahil olmak üzere sindirim kanalında iltihap (örn. bulantı, ishal, karın ağrısı)
- Anormal fetus oluşumu

**Yaygın olmayan:**

- Ağzın şişmesi
- Vücudun su tutmasından kaynaklanan ayak bileğindeki ve ayaklardaki şişme
- Anormal beklenmedik vajinal kanama, adet rahatsızlıkları
- Trombosit sayısında azalma (kan pıhtılaşmasını sağlayan kan hücreleri azalması sonucu kanama ve morarma ihtimalinin artması)
- Purpura (deride mor noktalar)
- Kurdeşen (ürtiker)
- Vajinal enfeksiyon (kaşınma, yanma, sızı, özellikle cinsel ilişki ya da idrara çıkma sırasında ağrı)
- Görme bulanıklığı
- Kan basıncının yükselmesi
- İştahta azalma
- Genellikle çok ya da az kanama gibi adet bozukluklar veya adet gecikmesi
- Soğuk terleme veya ateş
- Uyuşukluk, yorgunluk, şüphe hissi
- Kulaklarda çınlama
- Depresyon ve endişeli olma hissi
- Karıncalanma veya iğnelenme
- Ağız yaraları ve ağız kuruluğu
- Vajina (kadın cinsel organı) iltihaplanması
- Aşırı duyarlılık

**Seyrek:**

- Karaciğer iltihaplanması (derinin sarıya dönmesi, baş ağrısı, ateş, üşüme, genel güçsüzlük)
- Şiddetli karın ve sırt ağrısına yol açan pankreas iltihabı
- Öksürme, balgamda artış gibi belirtileri olan akciğer iltihabı
- Meme ağrısı
- Kan kusma
- Ülseratif kolit (İnce bağırsak iltihabı) hastalığının kötüleşmesi
- Boğazda zedelenme
- Dilde şişme
- Kan basıncında düşme
- Saç dökülmesi
- Işığa karşı duyarlılıkta artış
- Kabus görme

**Çok seyrek:**

- Karaciğer yetmezliği de dahil olmak üzere şiddetli karaciğer hastalıkları

**Bilinmiyor:**

- Crohn hastalığının (Kalın bağırsak iltihabı) kötüleşmesi
- Böbrek problemleri
- Nöbet geçirme
- Kan damarları iltihabı (ateşe, ağrıya, mor lekelerle sebep olabilir)
- Psikotik bozukluklar (ruhsal bozukluk olan gerçek ile bağlantı kaybı)



- Hal deęişiklięi, asabiyet, hafıza problemleri, karışıklık hissi
- Görmeye zorluk, tat duyusunda deęişiklik
- İltihap
- Anormal rahim kasılması, rahim yırtılması, doğumda plasentada tutulma, amniyotik sıvı (cenini kaplayan sıvı) geçişiiyle ya da cenin maddesinin anne kan dolaşımına geçişiiyle annede hayatı tehdit edici reaksiyon, rahimde kanama, düşük, bebeęin doğmadan ölmesi, erken doğum
- Düşük kan basıncı, soluk renkte deriye ve güçsüzlüęe ya da nefessizlik durumlarına sebep olan kansızlık (kırmızı kan hücrelerinin sayısının azalması)
- Adet dönemi ağrısı/sancısı
- Kadın üreme kabiliyetinde azalma

ARTHROTEC gibi ilaçlar kalp krizi riskinin biraz artmasına sebep olabilirler.

ARTHROTEC gibi ilaçlar inme riskinin biraz artmasına sebep olabilirler.

Bunlar ARTHROTEC'in hafif yan etkileridir.

*Eęer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

#### Yan etkilerin raporlanması

Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri [www.titck.gov.tr](http://www.titck.gov.tr) sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi'ne (TÜFAM) bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenlilięi hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

#### **5. ARTHROTEC'in saklanması**

*ARTHROTEC'i çocukların göremeyeceęi, erişemeyeceęi yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında kuru bir yerde saklayınız.*

#### **Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ARTHROTEC'i kullanmayınız.*

Eęer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ARTHROTEC'i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

**Ruhsat Sahibi:** Pfizer İlaçları Ltd. Şti.  
Muallim Naci Cad. No:55  
34347 Ortaköy-İSTANBUL  
Tel : 0 212 310 70 00  
Faks : 0 212 310 70 58

**Üretim Yeri:** Piramal Healthcare UK Limited  
Whalton Road, Morpeth  
Northumberland NE61 3YA İngiltere

*Bu kullanma talimatı ... tarihinde onaylanmıştır.*