

# KULLANMA TALİMATI

## ASCORVİT 500 mg/5 ml ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ

Kas içine, damar içine veya deri altına uygulanır.

### Steril

- **Etkin madde:** Her ampulde (5ml); 500 mg C vitamini (Askorbik asit) içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Metil paraben (E218), propil paraben (E216), EDTA disodyum, sodyum hidroksit (pH ayarlayıcı), enjeksiyonluk su.

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
- Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
- Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
- Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
- Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.

### Bu Kullanma Talimatında

1. ASCORVİT nedir ve ne için kullanılır?
2. ASCORVİT'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. ASCORVİT nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. ASCORVİT'in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

#### 1. ASCORVİT NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

- Her ampul 500 mg C vitamini içerir.
- ASCORVİT 5 ml'lik şeffaf cam ampuller içerisinde, her kutuda 5 adet ampul içeren ambalajlarda sunulur.
- ASCORVİT, C Vitamininin akut eksikliğinde veya ağızdan kullanımının mümkün olmadığı durumlarda (örneğin yara iyileşmesi, yanıklar, iltihap oluşturan mikrobik hastalıklar, travma, tiroid zehirlenmesi ve ameliyat sonrasında) kullanılır. Ayrıca idiyopatik methemoglobinemi (bir tür kan hastalığı) tedavisine yardımcı olarak kullanılır.

#### 2. ASCORVİT'İ KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

ASCORVİT'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

- C vitaminine veya ASCORVİT'in içeriğindeki diğer maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız varsa,
- Hiperoksalüri (idrarda oksalik asitin normalden fazla bulunması) durumunuz varsa,
- Asidüri (idrarda asidik olması) ya da idrar pH'sının normal olup idrarda oksalik asitin bulunması durumunun eşlik ettiği böbrek taşı varsa.

## **ASCORVİT'i ařağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

Eęer;

- Böbrek sorunuz varsa,
- Çeřitli türlerde kansızlıęınız (Akdeniz anemisi, sideroblastik anemi, orak hücreli anemi) varsa, özellikle karacięerde olmak üzere bařlıca organlarınızda demir birikmesi (hemokromatoz) varsa, kanınızdaki alyuvar miktarı artmıřsa (polisitemi) veya lösemiyseniz (kan hücrelerinin kanseri)
- G6PD (glukoz-6-fosfat dehidrogenaz) enzim eksiklięiniz varsa (bu eksiklik kan řekeri metabolizmasında hayati önem tařıyan bir enzimin eksik olması veya yeterince aktif olamamasıdır)
- Kalp veya akcięer hastalıęınız varsa,
- řeker hastalıęınız varsa (C vitamini idrarda řeker testi sonuçlarında yanlıřlıklara neden olabilir. Testten birkaç gün önce C vitamini kullanımı kesilmelidir)
- İlerlemiş kanser hastalıęınız varsa,
- Sigara içiyorsanız.

Bu uyarılar, geçmiřteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danıřınız.

### **ASCORVİT'in yiyecek ve ieceklerle birlikte kullanımı**

Enjeksiyon yolu ile uygulandıęında yiyecek ve iecek ile etkileřimi yoktur, ancak ASCORVİT ile tedaviniz sırasında alkol kullanmayınız.

### **Hamilelik**

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız..

C vitamini anne karnındaki yavruya geer. Doktorunuz ASCORVİT'in size olan yararının olası sakıncalarından fazla olduęunu düşünürse ila kullanılabılır.

Tedaviniz sırasında hamile olduęunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

### **Emzirme**

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız..

C vitamini anne sütüne gemektedir. Doktorunuz ASCORVİT'in size olan yararının olası sakıncalarından fazla olduęunu düşünürse ila kullanılabılır.

### **Ara ve makine kullanımı**

ASCORVİT'in ara ve makine kullanımı üzerine olumsuz etkisi yoktur.

### **ASCORVİT'in ierięinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

Bu tıbbi ürün her 5 ml'lik dozunda 72,24 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

ASCORVİT, metil paraben (E218) ve propil paraben (E216) ierięinden dolayı alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) ve istisnai olarak bronkospazma neden olabilir..

### **Dięer ilalar ile birlikte kullanımı**

Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında ASCORVİT'in ya da kullanılan diğer ilacın etkisi değişebilir.

**Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:**

- Doğum kontrol hapları
- Varfarin ve dikumarol gibi ağızdan alınan kan pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar
- Kansızlık tedavisinde kullanılan demir ilaçları
- Desferrioksamin (aşırı demir yükü hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilaç)
- İzoprenalin (sempatik sinir sistemini uyarıcı bir ilaç)
- Disülfiram (alkol bağımlılığı tedavisinde kullanılan bir ilaç)
- Meksiletin (kalp ritim bozukluğuna karşı kullanılan bir ilaç)
- Primidon gibi barbitüratlar (sakinleştirici ve uyku verici ilaç veya ilaç grubu)
- Amfetamin (sempatik sinir sistemini uyarıcı bir ilaç)
- Trisiklik antidepresanlar (ruhsal çöküntüye karşı etkili ilaç grubu)
- Flufenazin ve diğer fenotiyazinler (şizofreni ve psikotik depresyon gibi psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaç veya ilaç grubu)
- Aspirin
- Sara tedavisinde kullanılan ilaçlar (ör. fenitoin)
- Bir antibiyotik olan tetrasiklin
- İştah baskılayıcılar

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

### **3. ASCORVİT NASIL KULLANILIR?**

#### **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar**

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecektir.

Yetişkinlerde günde 1 ya da 2 kez 100-250 mg olarak önerilmektedir. Şiddetli durumlarda 1-2 grama kadar dozlar uygulanabilir.

#### **Özel doz talimatları**

İdiyopatik methemoglobinemide, bölünmüş halde günlük 300-600 mg dozlar tavsiye edilmektedir.

#### **Uygulama yolu ve metodu**

ASCORVİT kas içine (IM), deri altına (SC) ya da damar içine (IV) verilebilir. Kas içine (IM) uygulama tercih edilir. Damar içine (IV) uygulama yapılırken yavaş infüzyonla uygulanmalıdır çünkü hızlı intravenöz enjeksiyon geçici olarak sersemliğe neden olabilir..

ASCORVİT uygulaması doktorunuz ya da hemşireniz tarafından gerçekleştirilecektir.

#### **Değişik yaş grupları**

##### **Çocuklarda kullanımı**

Askorbik asit eksikliğinin tedavisinde genel doz uygulaması günlük 100 mg ila 300 mg'dır..

##### **Yaşlılarda kullanımı**

Yaşlılarda kullanımına ilişkin özel bir doz uygulaması yoktur, yetişkinlerdeki gibidir.

## **Özel kullanım durumları**

### **Böbrek yetmezliği**

Kronik olarak hemodiyalize giren hastalara önerilen doz 100-200 mg/gün'dür. Böbrek işlevleri bozulmuş veya böbrek taşı öyküsü olan hastalara ASCORVİT verilirken dikkatli olunmalıdır.

### **Karaciğer yetmezliği**

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez.

Eğer ASCORVİT'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

### **Kullanmanız gerekenden daha fazla ASCORVİT kullandıysanız**

C vitamininin yüksek dozları ishale ve idrarınızın asidik olması durumunda böbrek taşı oluşumuna sebep olabilir. 600 mg ve üzerindeki dozlar sık idrara çıkmanıza sebep olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri sizi rahatsız ediyorsa lütfen doktorunuza danışınız..

ASCORVİT'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

### **ASCORVİT'i kullanmayı unutursanız**

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Doktorunuz ya da hemşireniz ihtiyacınız olan C vitaminini almanızı sağlayacaktır. Bu konu hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz doktorunuzla konuşunuz.

### **ASCORVİT ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler**

ASCORVİT ile tedavi sonlandırıldığında olumsuz bir etki beklenmemektedir.

## **4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?**

Tüm ilaçlar gibi ASCORVİT'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

**Aşağıdakilerden biri olursa, ASCORVİT'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz**

- Döküntü, kaşıntı, nefes almada güçlük, göğüste darlık, ağız, yüz, dudak ve dilde şişme gibi alerjik reaksiyonlar
- Böbrek taşı oluşumu, hiperoksalüri (idrarda aşırı miktarda oksalat bulunması), idrar yapmada güçlük, diürez (idrara hızında, dolayısıyla hacminde artma)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz**

- Mide krampı, ishal, bulantı ya da kusma
- Kol ve bacaklarda duyarlılık, ağrı, ateş ya da şişlik
- Enjeksiyon bölgesinde ciddi reaksiyonlar, ağrı, şişlik

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz**

- Baş ağrısı, baş dönmesi ya da sersemlik, yorgunluk, uyku bozukluğu
- Flushing (al basması) ya da kızarıklık

Bunlar ASCORVİT'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

**Yan etkilerin raporlanması**

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri [www.tick.gov.tr](http://www.tick.gov.tr) sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız..

**5. ASCORVİT'İN SAKLANMASI**

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan koruyarak saklayınız.

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ASCORVİT'i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz, ASCORVİT'i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

**RUHSAT SAHİBİ**

MS Pharma İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Ergene/TEKİRDAĞ

Tel: 0 282 655 55 05

**ÜRETİM YERİ**

Mefar İlaç Sanayii A.Ş

Kurtköy-Pendik/İstanbul

Bu Kullanma Talimatı 15.05.2018 tarihinde onaylanmıştır.