

# KULLANMA TALİMATI

## AXİVOL 5 mg FİLM TABLET

**Ağızdan alınır.**

- **Etkin madde:** Her bir tablet 5 mg desloratadin içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Isomalt, prejelatinize mısır nişastası, mikrokristalin selüloz, magnezyum oksit, hidrokspipril selüloz, krospovidon, magnezyum stearat, deiyonize su, opadry II Blue 85F30605 (polivinil alkol, titanyum dioksit, makrogol/PEG 3350, talk ve FD&C Blue indigo karmin alüminyum lak) içerir.

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
- Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
- Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
- Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
- Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.

### **Bu Kullanma Talimatında**

1. **AXİVOL nedir ve ne için kullanılır?**
2. **AXİVOL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **AXİVOL nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **AXİVOL'ün saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

### **1. AXİVOL NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?**

AXİVOL 5 mg film tabletler, mavi, yuvarlak, bikonveks film kaplı tabletlerdir. 10,20 ve 30 tablet içeren Al/Al ambalajlarda sunulmaktadır.

AXİVOL, uyku hali oluşturmeyen antialerjik bir ilaçtır. Alerjik reaksiyonlar ve alerji belirtilerinin kontrol altına alınmasına yardımcı olur.

AXİVOL alerjik nezle ile ilişkili hapşırık, burunda akıntı ve kaşıntı, damakta kaşınma ve gözlerde kaşınma, kızarıklık veya yaşarma gibi belirtileri (örneğin saman nezlesi, ev tozu akarına karşı alerji) giderir.

AXİVOL ayrıca, ürtiker ile birlikte kaşıntının giderilmesi, derideki kabartı ve kızarıklık gibi belirtilerin ortadan kaldırılmasında da kullanılır.

Bu belirtiler tüm gün boyunca giderilmiş olur ve normal günlük aktiviteleriniz ve uykunuza yeniden kavuşmanıza yardımcı olur.

### **2. AXİVOL KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER**

## **AXİVOL'ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

Eğer,

Desloratadin, loratadin veya bu ilacın içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz.

## **AXİVOL'ü aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

- Böbrek yetmezliğinizde dikkatli kullanılmalıdır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

## **AXİVOL'ün yiyecek ve içecek ile kullanılması**

AXİVOL aç veya tok karına alınabilir.

## **Hamilelik**

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer hamile iseniz, AXİVOL kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

## **Emzirme**

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bebeğinizi emziriyorsanız AXİVOL kullanmayınız..

## **Araç ve makine kullanımı**

Önerilen dozlarda, AXİVOL'ün sizde uyku hali oluşturması veya dikkatinizin azalmasına neden olması beklenmemektedir. Ancak çok seyrek de olsa AXİVOL, bazı hastalarda uyku hali oluşturabilir. Bu durum sizin araç ve makine kullanmanızı etkileyebilir.

## **Diğer ilaçlar ile birlikte kullanım**

AXİVOL'ün diğer ilaçlarla bilinen bir etkileşimi yoktur..

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

## **3. AXİVOL NASIL KULLANILIR?**

### **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar**

#### **Erişkinler ve 12 yaş ve üzerindeki çocuklar**

Günde bir kez bir tablet alınız. Tableti suyla, besinlerle beraber veya ayrı alınız.

Tedavi süresi konusunda, doktorunuz sizdeki alerjik nezlenin tipini belirleyerek ne kadar süreyle AXİVOL almanız gerektiğine karar verecektir.

Eğer sizdeki alerjik nezle, aralıklı tip (belirtilerin haftada 4 günden daha az ya da 4 haftadan daha kısa süreyle var olması) ise, doktorunuz hastalığın geçmişini değerlendirecek ve size bu doğrultuda bir tedavi programı önerecektir.

Eğer sizdeki alerjik nezle, kalıcı/sürekli tip (semptomların haftada 4 gün ya da daha fazla ve 4 haftadan daha uzun süreyle var olması) ise, doktorunuz size daha uzun süreli bir tedavi önerebilir..

Ürtikerin tedavi süresi hastadan hastaya farklılık gösterebilir, bu nedenle doktorunuzun talimatlarına uymalısınız.

### **Uygulama yolu ve metodu**

Tableti bütün olarak aç ya da tok karına bir bardak su ile yutunuz. Doktorunuzun belirttiği süre boyunca tabletleri almaya devam ediniz.

### **Değişik yaş grupları**

#### **Çocuklarda kullanımı**

AXİVOL sadece erişkinler ve 12 yaş ve üzerindeki çocuklarda kullanılmaktadır.

#### **Yaşlılarda kullanımı**

AXİVOL'ün etkinlik ve güvenliliği yaşlılarda henüz belirlenmemiştir.

### **Özel kullanım durumları**

#### **Karaciğer yetmezliğinde kullanım**

Karaciğer yetmezliği kullanımı ile ilgili veri bulunmamaktadır..

#### **Böbrek yetmezliğinde kullanım**

Şiddetli böbrek yetmezliğinde AXİVOL dikkatle kullanılmalıdır.

Eğer AXİVOL'ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

### **Kullanmanız gerekenden daha fazla AXİVOL aldıysanız**

AXİVOL'ü yalnızca size reçete edildiği kadar kullanınız. Kazara alınan aşırı doz ile ilişkili ciddi sorunlar beklenmemektedir..

AXİVOL'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

### **AXİVOL'ü almayı unutursanız**

Eğer almanız gereken dozu zamanında almayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz o dozu alınız, daha sonra tedavinize olağan şekilde devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

### **AXİVOL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler**

Herhangi bir etki bildirilmemiştir.

### **4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?**

Tüm ilaçlar gibi, AXİVOL'ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Yetişkinlerde yan etkiler plaseboyla (tedavi edici özelliği olmayan bir ilaç türü) benzerdir. Ancak, yorgunluk, ağız kuruluğu ve baş ağrısı plaseboya göre daha sık gözlemlenen yan etkilerdir. Ergenlerde baş ağrısı en sık bildirilen yan etkidir.

#### **Yaygın:**

Bitkinlik

#### **Yaygın olmayan:**

Ağız kuruluğu, baş ağrısı

Bunlar AXİVOL'ün hafif yan etkileridir.

Çok seyrek: Alerjik reaksiyonlar (nefes almada zorluk, hırıltılı solunum, kaşıntı, ürtiker (kurdeşen), döküntü), hayal görme, inme, artan vücut hareketiyle huzursuzluk, çarpıntı, kalp atışının hızlanması, karaciğer fonksiyon testlerinde anormallik, karaciğerde iltihap, baş dönmesi, fiziksel ve ruhsal aşırı hareketlilik durumu, mide ağrısı, bulantı (hastalık hissi), kusma, ishal, uykusuzluk, uyku hali, kas ağrısı, şişkinlik

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu ya da eczacınızı bilgilendiriniz..

### **5. AXİVOL'ÜN SAKLANMASI**

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında, nemden koruyarak saklayınız.

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve orijinal ambalajında saklayınız.

#### **Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

Ambalajdaki veya kartondaki son kullanma tarihinden sonra AXİVOL'ü kullanmayınız.

Eğer tabletlerin görünümünde herhangi bir değişiklik fark ederseniz kullanmayınız ve eczacınıza bildiriniz.

#### **RUHSAT SAHİBİ**

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.  
Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi No: 4  
34467 Maslak/Sarıyer/İstanbul

#### **ÜRETİM YERİ**

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Sanayi Mahallesi, Tun Caddesi No: 3  
Esenyurt-İstanbul

Bu kullanma talimatı 27.11.2012 tarihinde onaylanmıřtır.