

Cetityrol 10 mg Film Tablet



ÖNERİLEN KULLANMA TALİMATI

KULLANMA TALİMATI

CETITYROL 10 mg film tablet

Ağız yoluyla uygulanır.

• **Etkin Madde:** Her film tablet;
10 mg setirizin dihidroklorür içerir.

• **Yardımcı Maddeler:**
Laktoz monohidrat, mikrokristalin selüloz, koloidal silika anhidr, magnezyum stearat

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **CETITYROL nedir ve ne için kullanılır?**
2. **CETITYROL'ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **CETITYROL nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **CETITYROL'ün saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. CETITYROL nedir ve ne için kullanılır?

CETITYROL, oblong, çift tarafında çentik bulunan, beyaz film kaplı tabletlerdir. 10 ve 20 adet tablet içeren blisterlerde ambalajlanmıştır.

CETITYROL, antihistaminikler (alerji tedavisinde kullanılan) olarak bilinen ilaç sınıfına dahildir.

CETITYROL, aşağıdaki durumların tedavisinde kullanılır:

- Saman nezlesi (mevsimlere bağlı alerjik rinit ve konjonktivit (gözün konjonktiva tabakasının iltihaplanması))
- Kronik alerjik rinit (sulu veya tıkalı burun, aksırma)
- Alerjik kaşıntılar
- Nedeni belli olmayan ürtiker (kurdeşen)

2. CETITYROL'ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CETITYROL'ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

- Setirizine ya da CETITYROL'ün içeriğindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa
- Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

CETITYROL'ü aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

- Böbrek veya karaciğer yetmezliğiniz varsa, size uygulanacak günlük doz yarıya indirilmelidir.
- Yaşlı hastalarda azalan böbrek işlevleri doğrultusunda idrarla atılım bir miktar azalabileceğinden dikkatli kullanılmalıdır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

CETITYROL'un yiyecek ve içecek ile kullanılması

İlacınızı yemeklerden önce veya sonra herhangi bir içecek ile kullanabilirsiniz. Ancak alkolle birlikte kullanmayınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelerde kullanımından kaçınılmalıdır.

Ancak, doktorunuzun risk/yarar oranını gözетerek verdiği reçeteye göre kullanabilirsiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Setirizin sütte geçtiği için emziren anneler kullanmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

Motorlu araç kullanan ve dikkat gerektiren işlerde çalışan kişiler, doktorun tavsiye ettiği dozu aşmamalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Merkezi sinir sistemi fonksiyonlarındaki azalma nedeniyle, bu sisteme etki eden ilaçlarla ve alkolle birlikte kullanılmamalıdır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. CETITYROL nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Erişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklara yemeklerden önce ya da sonra günde bir film tablet önerilir.

İstenildiğinde 10 mg'lık günlük doz 5 mg sabah ve 5 mg akşam olmak üzere ikiye bölünerek verilebilir.

CETITYROL 10 mg film tablet

Tedavi süresi şikayetlere bağlı olarak hekim tarafından belirlenmelidir.
Mevsimsel alerjik rinit (saman nezlesi) vakalarında 3 – 6 haftalık tedavi gereklidir.

Uygulama yolu ve metodu:

Yeterli miktar sıvı ile ağız yolundan alınır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

6 –12 yaş arası çocuklarda günde 5 – 10 mg (½ - 1 film tablet CETITYROL),
6 yaşından küçük çocuklara ise setirizinin şurup formu önerilir.

Yaşlılarda kullanımı:

Özel bir uygulama olmamakla birlikte, yaşlı hastaların böbrek fonksiyonları bozulmuş olabileceğinden, ilacın idrarla atılımı azalabilir. Bu durumda, setirizinin vücutta birikim yapmaması için hekim tarafından dozunun ayarlanması gerekebilir.

Özel kullanım durumları:

(Böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği, vb.)

Kreatinin klirensi 11 - 31 mL/dak. olan böbrek hastalarında ve karaciğer bozukluğu olanlarda günde 5 mg setirizin önerilir (½ film tablet CETITYROL).

Eğer CETITYROL'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CETITYROL kullandıysanız:

Yanlışlıkla ya da kasıtlı olarak aşırı dozda kullanıldığında ilk görülecek belirti uyku halidir. Diğer önemli belirtiler ise; ishal, sersemlik, bitkinlik, baş ağrısı, kırıklık, kaşıntı, huzursuzluk, uyuşukluk, çarpıntı, titreme ve idrar sıkıştırması olabilir.

CETITYROL'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

CETITYROL'ü kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

CETITYROL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

İlacın kesilmesiyle ilişkilendirilebilecek herhangi bir etki görülmez.

Ancak yeterli tedavi gerçekleşmeden ilaç kesilirse, tedaviye başlamadan önceki belirtiler (kaşıntı, göz yaşarması, burun akıntısı gibi) tekrar görülebilir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi CETITYROL'ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa CETITYROL'ü kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Kaşıntı ve döküntülerinizin çok daha fazla artmasıyla karakterize aşırı duyarlılık hali
- Solunumun zorlanması ve bilinç kaybı ile karakterize anafilaktik şok

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

CETITYROL 10 mg film tablet

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin CETITYROL'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Saldırganlık, depresyon, halüsinasyon (gerçekte var olmayan görüntüler)
- Bulanık görme
- Hareket bozuklukları
- Baygınlık
- Çarpıntı
- İshal
- İdrar yapma zorluğu

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

- Kilo artışı
- Tat duyunuzda bozukluk
- Yorgunluk, takatsiz kalma

Bunlar CETITYROL'ün hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. CETITYROL'ün saklanması

CETITYROL'ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra CETITYROL'ü kullanmayınız.

Ruhsat sahibi: Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş. Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Bulvarı 9.Cad. No:1 41400 Gebze/Kocaeli

Üretici: Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş. Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Bulvarı 9.Cad. No:1 41400 Gebze/Kocaeli

*Bu kullanma talimatı onaylanmıştır
(gün, ay ve yıl)*