

KULLANMA TALİMATI

DEQUADİN™ Pastil

Ağızdan alınır.

Etkin madde: Dekualinyum klorür içerir.

Yardımcı maddeler: Sodyum sakkarin, gün batımı sarısı (E110), nane yağı, limon yağı esansı, sitrik asit susuz, magnezyum sterat, sukroz, sıvı glikoz, jelatin, kafur, saf su.

Bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu ilaç sizin reçetesiz olarak temin edip bir doktor yardımı almadan eczacınızın tavsiyesi ile hafif bir hastalığı tedavi etmeniz içindir. Buna karşın, yine de DEQUADİN'den en iyi sonuçları alabilmeniz için dikkatli kullanmanız gerekmektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

- 1. DEQUADİN nedir ve ne için kullanılır?**
- 2. DEQUADİN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
- 3. DEQUADİN nasıl kullanılır?**
- 4. Olası yan etkiler nelerdir?**
- 5. DEQUADİN'in saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

DEQUADİN nedir ve ne için kullanılır?

DEQUADİN etkin madde olarak dekualinyum klorür içeren, pastil formunda bir üründür.

DEQUADİN boğaz preparatları olarak adlandırılan ilaç grubunun antiseptikler sınıfına dahil bir üründür.

DEQUADİN 30 adet pastil içeren blister ambalajlarda sunulmaktadır.

DEQUADİN pastil, ağız ve boğaz enfeksiyonlarının lokal tedavisi için kullanılır.

2. DEQUADİN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DEQUADİN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

DEQUADİN pastil, bileşimindeki maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığı olanlarda kullanılmamalıdır.

DEQUADİN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer kutu ilk kullanımdan önce açılmışsa kullanmayınız. Tavsiye edilen dozu aşmayınız. Herhangi bir istenmeyen yan etki görüldüğünde, bir kaç gün kullanıldığında iyileşme görülmediğinde veya aşırı doz durumunda ilacın kullanımını kesilmelidir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

DEQUADİN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yeterli veri bulunmamaktadır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

DEQUADİN'in hamilelikte kullanımının güvenliliği henüz belirlenmemiş olsa da hamilelik döneminde kullanımına ilişkin bir tehlike öngörülmemektedir. Gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Yeterli veri bulunmamaktadır. Gerekli olmadıkça emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

Yeterli veri bulunmamaktadır.

DEQUADİN ' in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün sukroz ihtiva eder. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı hassasiyetiniz olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. Dişlere zararlı olabilir.

Bu tıbbi ürün sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır. Ancak kullanım yolu nedeni ile herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Bu tıbbi ürün renklendirici olarak gün batımı sarısı (E110) içerir. Alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

Yeterli veri bulunmamaktadır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. DEQUADİN nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; DEQUADİN pastil, her 2-3 saatte bir, bir tane olacak şekilde ağızda emilerek kullanılır.

Şiddetli enfeksiyonların tedavisinde doz daha sık aralıklarla alınabilir.

Günde 8 pastilden fazla alınmamalıdır.

Eğer Dequadin'in etkisinin güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izlemınız var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Uygulama yolu ve metodu:

Oral kullanım içindir.

DEQUADİN'in hoş bir tadı vardır. Ağızda emilerek kullanılır.

Değişik yaş grupları:**Çocuklarda kullanım:**

DEQUADİN'in 12 yaş altındaki çocuklarda kullanımı önerilmez.

Yaşlılarda kullanım:

Yaşlılarda doz ayarlanmasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları:

Veri yoktur.

Eğer DEQUADİN'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden fazla DEQUADİN kullandıysanız:

DEQUADİN pastillerle yapılmış bir aşırı dozaj çalışması yoktur, ancak normal destekleyici ve semptomatik tedbirler alınmalıdır. Dekualinyum klorür ağızdan emilemez.

DEQUADİN'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

DEQUADİN'i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

DEQUADİN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Herhangi bir olumsuz etki göstermesi beklenmez.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, DEQUADİN'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Tedavi sırasında aşırı hassasiyet tespit edilirse DEQUADİN uygulamasına son verilmelidir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Seyrek: Alerjik reaksiyonlar, dilde ağrı

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. DEQUADİN'in saklanması

DEQUADİN'i çocukların göremeyeceđi, erişemeyeceđi yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25° C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra DEQUADİN'i kullanmayınız.

Eđer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz DEQUADİN'i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

GlaxoSmithKline Services Unlimited lisansı ile GlaxoSmithKline İlaçları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Levent / İSTANBUL

İmal yeri:

Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., İstanbul

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.