

KULLANMA TALİMATI

LACRYVISC steril oftalmik jel
Göze damlatılarak uygulanır.

- **Etkin madde:** 1 g'da 3 mg karbomer
- **Yardımcı maddeler:** Sorbitol, benzalkonyum klorür, sodyum hidroksit ve saf su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçetelendirilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **LACRYVISC nedir ve ne için kullanılır?**
 2. **LACRYVISC'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
 3. **LACRYVISC nasıl kullanılır?**
 4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
 5. **LACRYVISC'in saklanması**
- Başlıkları yer almaktadır.**

1. LACRYVISC nedir ve ne için kullanılır?

LACRYVISC, göz kuruluğu vakalarında göz yüzeyinin eksik veya bozuk yapıda ıslatılmasından kaynaklanan durumlarda gözyaşının yerine geçer.

LACRYVISC, suni gözyaşları olarak adlandırılan bir grup ilaçtan biridir.

LACRYVISC, 10 g'lık lamine bir tüpte sunulan, hafif şeffaf bir jeldir.

2. LACRYVISC'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

LACRYVISC'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

- Eğer ilacın içerdiği herhangi bir maddeye karşı hassasiyetiniz (alerjiniz) var ise
- Kontakt lens gözünüzde iken

LACRYVISC'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

- Bu ilaç göze uygulanır. Enjekte edilmemeli veya yutulmamalıdır.
- Başka ilaçlar da kullanıyorsanız. Lütfen 'Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı' bölümünü okuyunuz.

- Kontakt lens kullanıyorsanız. Gözünüzde kontakt lensleriniz varken, LACRYVISC kullanılmamalıdır.
- Gözünüzde ağrı, görüş değişiklikleri, gözünüzde tahriş, geçmeyen bir kızarıklık meydana gelirse ve durumunuz kötüleşirse kullanmayı bırakınız ve doktorunuza danışınız.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

LACRYVISC'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Ürün önerildiği şekilde kullanıldığı takdirde, besinlerle ve içeceklerle bir ilişkisi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Araç ve makine kullanımı

Diğer göz jellerinde olduğu gibi, jel gözün yüzeyi üzerinde tamamen yayılana kadar geçici olarak görüşünüz bozulmuş olabilir. Bu etki geçinceye kadar araç ya da makine kullanmayınız.

LACRYVISC'in içeriğinde bulunan bir yardımcı madde hakkında önemli bilgi

LACRYVISC'in içindeki koruyucu (benzalkonyum klorür) lenslerin rengini bozabilir ve göz tahrişine neden olabilir. Gözünüzde kontakt lensleriniz varken, LACRYVISC'i kullanmayınız. LACRYVISC'i kullanmadan önce kontakt lenslerinizi çıkarınız ve lensleri takmadan önce 15 dakika bekleyiniz.

LACRYVISC sodyum ve sorbitol içermektedir ancak, uygulama yolu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer birden fazla göz ilacı kullanacaksanız, uygulamalar arasında en az 5 dakikalık bir ara olmalıdır. Göz pomadları ve jelleri en son uygulanmalıdır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. LACRYVISC nasıl kullanılır?



Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

LACRYVISC'i her zaman yalnızca doktorunuzun söylediği gibi kullanınız. Emin değilseniz doktorunuza ve eczacınıza danışınız.

Genellikle günde dört kez veya doktorun önerdiği kadar bir miktar jel, hasta göz(ler)e uygulanır.

LACRYVISC'i yalnızca gözlerinize kullanınız.

Uygulama yolu ve metodu:



1. LACRYVISC tüpünü ve bir ayna alınınız.
2. Ellerinizi yıkayınız.
3. Tüpün kapağını açınız.
4. Tüpü baş ve işaret parmağınızın arasında tutunuz.
5. Başınızı arkaya eğiniz. Temiz bir parmakla alt göz kapağınızı, göz kapağınız ve gözünüz arasında bir "kese" oluşuncaya kadar aşağı doğru çekiniz. Jel buraya damlatılacaktır. Bunu yaparken tüpü alt üst ediniz.
6. Başı arkaya yatırıp tüpün ucunu gözünüze yaklaştırınız. Yardımı olacaksa aynayı kullanınız. Tüpü alt üst etmeniz doğru miktarda ilacın göze ulaşmasını sağlayacak ve kirpiklerinizin yapışmasını önleyecektir.
7. Enfeksiyonu önlemek için tüpün ağzını gözünüze veya göz kapağınıza, gözünüzün çevresine veya başka yüzeylere değdirmeyiniz. LACRYVISC'i kullandıktan sonra göz kapağınızı bırakınız ve jelin gözün tüm yüzeyine yayıldığından emin olmak için bir kaç kez göz kırpınız. Gözlerinizi yavaşça kapatınız; bu LACRYVISC'in vücudun geri kalan kısmına geçmesini engelleyecektir.
8. Eğer jeli iki gözünüze de uygulayacaksanız, aynı basamakları diğer gözünüz için de uygulayınız.
9. Kullandıktan hemen sonra tüpün kapağını sıkıca kapatınız.

Kapak çıkarıldıktan sonra güvenlik kilidi halkası gevşekse, ürünü kullanmadan önce halkayı çıkarınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Güvenlilik ve/veya etkinliğe ilişkin veri yetersizliği nedeniyle kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda kullanımı yetişkinlerdeki kullanımı ile aynıdır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği/Karaciğer yetmezliği:

LACRYVISC'in böbrek veya karaciğer yetmezliğinde özel bir kullanımı yoktur.

Özel kullanımı yoktur.

Eğer LACRYVISC'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla LACRYVISC kullandıysanız:

LACRYVISC, ihtiyaç oldukça sıkça kullanılabilir, bu nedenle gözlere uygulandığı sürece doz aşımı mümkün değildir. Tüm tüpün yutulması durumunda bile herhangi bir istenmeyen etki görülmecektir.

LACRYVISC'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

LACRYVISC'i kullanmayı unutursanız:

LACRYVISC ihtiyaç duyuldukça kullanılabilir. Kullanabildiğiniz kadar kullanınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

LACRYVISC ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Tedaviyi sonlandırmanız durumunda, kuru göz belirtileri tekrar oluşabilir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, LACRYVISC'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Çok yaygın	: 10 hastanın en az 1'inde görülebilir.
Yaygın	: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan	: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek	: 1000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek	: 10000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor	: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Çok yaygın:

- bulanık görme

Yaygın:

- gözde rahatsızlık

Yaygın olmayan:

- gözde şişme
- göz ağrısı
- göz kaşınması
- göz kızarıklığı
- gözyaşında artış

Vücudun diğer kısımlarında meydana gelen reaksiyonlar:

Yaygın olmayan:

- deri iltihabı

Raporlanmış pazarlama sonrası deneyimlerinden elde edilen ilave yan etkiler:

Bilinmeyen:

- aşırı duyarlılık (alerji)

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak doğrudan Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildirebileceğiniz gibi, 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını da kullanabilirsiniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. LACRYVISC’in saklanması

LACRYVISC’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra *LACRYVISC’i kullanmayınız.*

25°C’nin altında oda sıcaklığında saklanmalıdır. Tüpün kapağını sıkıca kapatınız. Tüpün ucuna dokunmayınız.

Tüp ilk kez açıldıktan sonra 4 hafta içinde kullanılmalıdır.

Ruhsat Sahibi: Alcon Laboratuvarları Tic. A.Ş.
Kavacık Ticaret Merkezi
Kavak Sok. No: 18 B-Blok Kat: 1 34805
Kavacık-Beykoz / İstanbul

Üretim yeri: Alcon Pharmaceuticals Ltd. /İsviçre lisansı ile
s.a. ALCON Couvreur n.v.
Rijksweg Puurs, Belçika

Bu kullanma talimatı.....tarihinde onaylanmıştır.