

## KULLANMA TALİMATI

**NOXDYL FORT %5 deri spreyi**  
**Kuru saç ve kafa derisine haricen uygulanır.**

**Etkin madde:**

- Bir şişe (60 ml) sprey 3 g minoksidil içerir.

**Yardımcı maddeler:**

- Propilen glikol, etanol %96, deiyonize su

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

Bu ilaç sizin reçetesiz olarak temin edip bir doktor yardımı almadan eczacınızın tavsiyesi ile hafif bir hastalığı tedavi etmeniz içindir. Buna karşın, yine de *NOXDYL FORT* 'tan en iyi sonuçları alabilmeniz için dikkatli kullanmanız gerekmektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

**Bu kullanma talimatında:**

1. *NOXDYL FORT nedir ve ne için kullanılır?*
2. *NOXDYL FORT 'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler*
3. *NOXDYL FORT nasıl kullanılır ?*
4. *Olası yan etkiler nelerdir ?*
5. *NOXDYL FORT 'un saklanması*

**Başlıkları yer almaktadır.**

**1. NOXDYL FORT nedir ve ne için kullanılır?**

- Bir şişe NOXDYL FORT (60ml) 3 g minoksidil içerir.
- NOXDYL FORT, Topikal saç büyümesi uyarıcı bir ilaçtır.
- 60 ml NOXDYL FORT 30 günlük kullanım dozunu içerir.
- NOXDYL FORT; kellik (Androgenetik Alopesi)'in uzun süreli tedavisinde, saç dökülmesinin önlenmesi ve saç büyümesinin uyarılmasında kullanılır.
- 60 ml NOXDYL FORT 30 günlük kullanım dozunu içerir. Her bir püskürtme 7 mg minoksidil içerir.

**2. NOXDYL FORT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

**NOXDYL FORT ' u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

- NOXDYL FORT erkekler içindir. Kadınlarda kullanmayınız.

- Eđer NOXDYL FORT 'un ierięinde bulunan etkin madde minoksidil'e veya formülasyon ierisindeki maddelerden herhangi birine aşırı duyarlıysanız,
- Eđer saçlı kafa derinizde iltihap, kızarıklık, enfeksiyon, tahriş gibi cilt hastalıkları var ise,
- Eđer Guanetidin ieren (tansiyon düşürücü) bir ilaç kullanıyorsanız,
- Eđer 18 yaşından küçük veya 65 yaşından büyükseniz,
- Eđer gebelik veya emzirme dönemindeyseniz.

### **NOXDYL FORT'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:**

- Eđer karacięer veya böbrek yetmezlięiniz var ise,
- Eđer kardiyovasküler hastalıęınız var ise,
- Eđer diüretik veya antihipertansif ilaç kullanıyorsanız,

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

### **NOXDYL FORT'un yiyecek ve iecek ile kullanılması**

Yiyecek ve ieceklerle etkileşimi yoktur.

### **Hamilelik**

*İlacı almadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

NOXDYL FORT erkekler iindir. Kadınlarda kullanmayınız.

Topikal uygulanan minoksidil ile hayvanlarda ve gebelerde yeterli araştırma mevcut deęildir. Bu nedenle eđer gebelik dönemindeyseniz kullanmayınız.

*Tedaviniz sırasında hamile olduęunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

### **Emzirme**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

NOXDYL FORT erkekler iindir. Kadınlarda kullanmayınız

Minoksidil'in topikal (cilt üzerine) uygulamada az miktarda da olsa süte geçtięi bilinmektedir. Potansiyel yan etkilerden dolayı emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

### **Ara ve makine kullanımı**

NOXDYL FORT 'un ara ve makina kullanma becerisini etkiledięini gösteren hiçbir veri bulunmamaktadır.

### **NOXDYL FORT 'un ierięinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

NOXDYL'in ierięindeki alkol; göz, mukozalar veya duyarlı ya da bütünlüęünü yitirmiş deri bölgeleri ile temas ettięinde yanma hissine veya tahrişe neden olabilir. Bu tip bölgelerle temas halinde, temas bölgesi bol soęuk su ile yıkanmalıdır.

NOXDYL FORT' un ierięindeki propilen glikol; ciltte iritasyona neden olabilir.

### **Dięer ilaçlarla birlikte kullanımı**

Diüretik (idrar söktürücü) veya dięer antihipertansif bir ilaç kullanıyorsanız, doktora danışmadan kullanmayınız. Guanetidin kullanıyorsanız, NOXDYL FORT'u kullanmayınız.

NOXDYL FORT'u, saçlı deriye uygulanan dięer ilaçlarla birlikte kullanmayınız.

*Eđer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### 3. NOXDYL FORT NASIL KULLANILIR?

#### Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

- NOXDYL FORT 'u saç dökülmesi olan bölgeye; günde 2 kez 7 püskürtme (1ml) sabah ve akşam olmak üzere uygulayınız.
- NOXDYL FORT 'u kuru saç ve kafa derisi dışında vücudunuzun hiçbir yerine kullanmayınız.
- Kuru saç ve kafa derisi dışında bir bölgeye istenmeden temas ettirildiğinde bölgeyi bol su ile yıkayınız.
- Saç ile ilgili yapılacak kimyasal işlemlerden (boya, perma vb.) 24 saat önce NOXDYL FORT 'un kullanımı bırakılmalıdır.
- Saç spreyi, jöle, şampuan veya diğer benzer kimyasal içerikli saç ürünleri NOXDYL FORT uygulamasından en az 30 dakika sonra kullanılmalıdır.
- Güneş kremleri NOXDYL FORT 'un etkisini azaltabileceğinden, NOXDYL FORT uygulanan kafa derisi üzerine en az 4 saat sonra kullanılmalıdır.
- Tedaviyi erken kesmeyiniz; çünkü NOXDYL FORT, saç dökülmesinin önlenmesi ve saç çıkmasının sağlanmasında uzun süreli kullanılır. Saç çıkması 4 ila 6 ay sürekli uygulamadan sonra, maksimum etki 12 ay sonunda görülür.
- İlacınızı zamanında kullanmayı unutmayınız.
- Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatları takip ediniz.

#### Uygulama yolu ve metodu

NOXDYL FORT 'u saç dökülmesinin olduğu bölgeye bir kez püskürtüp, parmaklarınızla masaj yaparak yayınız.



- Bu işlemi 7 kez tekrarlayıp, ardından ellerinizi iyice yıkayınız.
- Bölgenin büyüklüğü ne olursa olsun 7 püskürtmeyi (1 ml) aşmayınız.
- Bir şişe NOXDYL FORT 30 günlük kullanım dozu içerir.
- NOXDYL FORT haricen uygulanır. Ağız veya nefes yoluyla kullanmayınız ve içmeyiniz. Minoksidil'in yanlışlıkla içilmesi durumunda sıvı tutulumu ve çarpıntı ile karakterize bir kardiyovasküler tablo ortaya çıkması olasıdır. Böyle bir durumda sıvı tutulumu uygun bir idrar söktürücü tedavisi ile düzeltilebilir. Klinik olarak önemli çarpıntı bir beta blokerle kontrol altına alınabilir. Hipotansiyon gelişmesi durumunda sıvı replasmanı ile tedavi edilmelidir. Norepinefrin ve epinefrin gibi ilaçlardan aşırı kardiyak uyarıcı etkileri nedeniyle sakınılmalıdır. Belirli bir antidotu yoktur.

Eğer NOXDYL FORT 'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

## **Değişik yaş grupları:**

### **Çocuklarda kullanımı**

18 yaşından küçüklerde kullanılmaz.

### **Yaşlılarda kullanımı**

65 yaşından büyüklerde kullanılmaz.

## **Özel kullanım durumları**

### **Böbrek/Karaciğer yetmezliği**

Karaciğer veya böbrek yetmezliği olanlarda ilacın metabolizması veya böbrekten eliminasyonunun etkilenebilmesi olasılığı göz önüne alınarak, bu tip hastalar NOXDYL FORT'u doktora danışmadan kullanmamalıdır.

### **Kullanmanız gerekenden daha fazla NOXDYL FORT kullandıysanız:**

*NOXDYL FORT' dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

### **NOXDYL FORT'u kullanmayı unutursanız:**

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

NOXDYL FORT'u kullanmayı unutursanız, bir sonraki gün yine normal dozlarda kullanınız.

### **NOXDYL FORT ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler**

Tedavi sonlandırıldığında; tedavinin sağladığı yarar ortadan kalkmakta, saç dökülmesi tekrar başlamaktadır.

## **4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?**

Tüm ilaçlar gibi NOXDYL FORT'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

**Aşağıdakilerden biri olursa NOXDYL FORT'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- Ani alerji işaretleri; örneğin eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde,
- Ciltte döküntü (ürtiker)
- Ani tansiyon düşmesi (hipotansiyon)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin NOXDYL FORT'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

**Aşağıdakilerden herhangi birini farkederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- Göğüs ağrısı (angina),
- Kalp atışınızda değişiklikler (hızlanma veya yavaşlama),
- Nefes almada zorluk (özellikle yatar pozisyona geçildiğinde),

- Açıklanamayan hızlı kilo alma,
- Öncesine göre daha az idrara çıkma

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:**

Bu yan etkiler, görülme sıklığına göre sıralanmıştır.

- Uygulama yerinde ortaya çıkan kaşıntı,
- Ciltte kuruma, pullanma,
- Ciltte tahriş ve yanma,
- Baş ağrısı,
- Egzama,
- Kabuklanma

Bunlar NOXDYL FORT' un hafif yan etkileridir.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

**Yan etkilerin raporlanması**

Herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca yan etkileri [www.titck.gov.tr](http://www.titck.gov.tr) sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak doğrudan Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildirebileceğiniz gibi, 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını da kullanabilirsiniz.

Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

**5. NOXDYL FORT’un saklanması**

NOXDYL FORT'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C altındaki oda sıcaklıklarında saklayınız.

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra NOXDYL FORT’u kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz NOXDYL FORT’u kullanmayınız.

**Ruhsat Sahibi:**

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.  
Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:4 34467  
Maslak /Sarıyer/İstanbul

**Üretim Yeri:**

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş  
Orhan Gazi Mah. Tunç Cad. No.3  
Esenyurt/İstanbul

*Bu kullanma talimatı 30.03.2016 tarihinde onaylanmıştır.*