

KULLANMA TALİMATI

PENZOL 40 mg Enterik Kaplı Tablet

Ağızdan alınır.

- **Etkin madde:** Her tablette 40 mg pantoprazole eşdeğer pantoprazol sodyum seskijidrat.
- **Yardımcı maddeler:** Mikrokristal selüloz, laktoz monohidrat, kroskarmeloz sodyum, kolloidal silika anhidroz, magnezyum stearat (bitkisel), Opadry II 85F32097 [sarı demir oksit (E172), titanyum dioksit (E171), talk, FD&C sarı/tartrazin alüminyum lake (E102), polivinil alkol, makrogol], Acryl-EZE® [metakrilik asit kopolimer, sodyum lauril sülfat, silika, talk, sodyum bikarbonat] ve trietil sitrat (E1505).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **PENZOL nedir ve ne için kullanılır?**
2. **PENZOL'ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **PENZOL nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **PENZOL'ün saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. PENZOL nedir ve ne için kullanılır?

- PENZOL, ilaçların midede çözülmesini engelleyen özel bir madde ile kaplı (enterik kaplı) tabletler şeklinde kullanıma sunulmuştur. Her bir tabletin içinde etkin madde olarak 40 mg pantoprazol (pantoprazol sodyum seskijidrat olarak) bulunmaktadır.
- PENZOL'ün etkin maddesi olan pantoprazol, "proton pompası inhibitörü" olarak isimlendirilen bir ilaç grubuna dahildir. Etkisini midenizde üretilen asit miktarını azaltarak gösterir. Midenin ve bağırsakların asitle ilişkili rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılır.
- PENZOL, alüminyum/alüminyum blister ambalajlarda, 14 veya 28 kaplı tablet içeren kutuda piyasaya sunulmaktadır. Tabletler sarı renkte, oblong şekillidir.

PENZOL;

12 yařın üzerindeki çocuklarda ve eriřkinlerde:

- Reflü özofajit (mide asit sıvısının yemek borusuna kaçıřına baėlı yemek borusunda iltihaplanma) tedavisinde,
- Gastro-özofajial reflü hastalığında (GÖRH).

Eriřkinlerde:

- *Helicobacter pylori (H.pylori)* isimli bir bakterinin neden olduėu duodenal (oniki parmak baėırsaėı) ve gastrik (mide) ülserlerde bu bakterinin yok edilmesi ve böylece bu ülserlerin tekrarını azaltmak amacıyla, uygun iki antibiyotikle birlikte,
- Peptik ülser tedavisinde (duodenal ülser ve gastrik ülser),
- Zollinger Ellison Sendromu (midede ařırı asit oluřmasına neden olan hormon üreten pankreastaki tümörler) ve ařırı derecede mide asidi salgılanmasına yol ačan diėer durumların tedavisinde kullanılmaktadır.

2. PENZOL'ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

PENZOL'ü ařaėıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eėer;

- Pantoprazol etkin maddesine veya PENZOL'ün bileřiminde bulunan yardımcı maddelerden birine, benzimidazollere (mantar hastalıkları için kullanılan ilaçlar) karřı alerjiniz (ařırı duyarlılıėınız) var ise
- Proton pompası inhibitörü ieren diėer ilalara alerjiniz var ise, PENZOL'ü kullanmayınız.

PENZOL'ü ařaėıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eėer;

- Aėır karaciėer bozukluėunuz varsa karaciėeriniz ile ilgili herhangi bir probleminiz olduysa doktorunuza bildiriniz. PENZOL ile tedavi sırasında, özellikle de uzun süreli kullanımda, karaciėer enzimlerinizi düzenli olarak izletmelisiniz. Karaciėer enzimlerinin yükselmesi durumunda PENZOL kullanımı kesilmelidir.
- Vücudunuzdaki B12 vitamini depoları azalmıř ya da B12 vitamini eksikliėi aısından risk faktörleri taşıyorsanız dikkatli olmalısınız. Pantoprazol, tüm diėer mide asidi azaltıcı ilalar gibi, B12 vitamini emilimini azaltabilir.
- 1 yıldan uzun süredir PENZOL kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Bu durumda doktorunuz muhtemelen sizi düzenli gözlem altında tutacaktır.Yeni ve olaėandıřı belirtiler görürseniz doktorunuza gittiėinizde bunları mutlaka söylemelisiniz.
- PENZOL ile tedavi, kanserle iliřkili belirtileri.(kilo kaybı, tekrarlayan kusma ,..... gibi belirtiler olabilmeye ihtimaline karřı) baskılayabilir ve sonuçta teřhisi geciktirebilir. Bu nedenle PENZOL tedavisinden önce, doktorunuz kanser hastası olmadıėınızdan emin olmak için size bazı testler yapabilir. Eėer tedaviniz sırasında semptomlarınız devam ederse, bařka incelemeler gerekebilir.

- Osteoporoz (kemik erimesi) hastalığınız varsa doktorunuza söyleyiniz. Çünkü tüm proton pompası inhibitörleri gibi PENZOL özellikle osteoporoz hastalığı olanlarda, yaşlı hastalarda ve diğer risk faktörlerinin tespit edildiği durumlarda, yüksek dozlarda ve uzun süreli (1 yıldan daha uzun) kullanıldığında, kalça, el bileği ve omurgada kırılma riskini az da olsa artırabilir. Bu durumda doktorunuz PENZOL ü daha düşük dozda veya daha kısa süreli kullanmanızı önerebilir.
- Daha önceden size hipomagnezemi (kanınızdaki magnezyum minerali düzeyinin düşüklüğü) teşhisi konuldu ise doktorunuza söyleyiniz. Çünkü tüm proton pompası inhibitörleri gibi PENZOL en az 3 ay (genellikle 1 yıldan daha uzun) süreli tedaviden sonra hipomagnezemiye yol açabilir. Bu durumda doktorunuz magnezyum takviyesi almanıza ya da PENZOL tedavinizin daha kısa süreli devam edilmesine karar verebilir.
- PENZOL tedaviniz süresince kalbinizin anormal derecede hızlı, yavaş veya düzensiz attığını hissederseniz, yorgunluk veya sersemlik hissi, kas spazmı ya da nöbet geçirirseniz doktorunuza bildirin. Çünkü bu belirtiler hipomagnezemi ile ilişkili olabilir. Ayrıca kullanmakta olduğunuz başka ilaçlar varsa bunları da doktorunuza söyleyiniz. Hipomagnezemi, kandaki potasyum ve kalsiyum düzeylerinde de azalmaya yol açabilir. Doktorunuz gerekli görürse düzenli olarak kanınızdaki magnezyum düzeyinin takip edilmesini isteyebilir.
- Nöroendokrin tümör tanı testleri yaptırıyorsanız doktorunuza söyleyiniz, çünkü tüm proton pompası inhibitörleri gibi PENZOL bu testlerin sonucunu etkileyebilir.
- Tüm proton pompası inhibitörleri gibi PENZOL üst mide-bağırsak yolunda, normalde de var olan bazı bakterilerin sayısını ve dolayısıyla enfeksiyon riskini (Salmonella ve Campylobacter) az da olsa arttırabilir.
- Non-steroidal anti-inflamatuar (steroid yapısında olmayan ağrı kesici, enflamasyon önleyici) ilaçların (NSAİ) tetiklediği ülserleri önlemek amacıyla kullanılıyorsa, PENZOL kullanımı, sürekli NSAİ ilaç kullanımına ihtiyaç duyan, mide-bağırsak sisteminde istenmeyen olay gelişme riski yüksek olan (örn. 65 yaş üstü, ülser veya mide kanaması geçmişi olan) hastalarla sınırlı olmalıdır.
- Varfarin ve fenprokumon gibi kanı yoğunlaştıran veya incelten ilaçlar kullanıyorsanız, ileri düzeyde kontroller yaptırmanız gerekebilir.
- Proton pompa inhibitörleri çok seyrek olarak subakut kütanöz lupus eritematozus (Bağışıklık sistemi kaynaklı deri ve bazı organlardaki hastalıktır.) vakaları ile ilişkilendirilmiştir. Özellikle derinin güneşe maruz kalan alanlarında olmak üzere lezyonların ortaya çıkması ve artraljinin eşlik etmesi durumlarında hasta acilen tıbbi yardım almalı ve sağlık mesleği mensubu PENZOL tedavisinin kesilmesini değerlendirmelidir. Daha önce bir proton pompa inhibitörü tedavisi sonrası subakut kütanöz lupus eritematozus gelişmiş olması, aynı durumun diğer proton pompa inhibitörleri ile de görülme riskini arttırır.

Aşağıdakilerden birini fark ederseniz DERHAL doktorunuza başvurunuz:

- Beklenmeyen kilo kaybı,

- Tekrarlayan kusmalar,
- Yutma zorluğu,
- Kan kusma,
- Solgun görünme ve kendini güçsüz hissetme (anemi/kansızlık)
- Dışkıda kan görülmesi
- Ağır ve sürekli ishal durumlarında
- Derinizin üzerinde değişiklik meydana gelmesi ve beraberinde özellikle eklem ağrınız olması durumunda

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

PENZOL'ün yiyecek ve içecek ile kullanılması

PENZOL yemekten 1 saat önce, çiğnenmeden veya kırılmadan, ve bir miktar su ile bütün olarak yutulmalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Pantoprazolün hamilelerde kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Eğer hamileyseniz veya hamile olduğunuzu düşünüyorsanız, ancak doktorunuz, ilacın sizin için öngörülen yararının, henüz doğmamış bebeğinizin zarar görmesi riskinden daha fazla olduğunu düşünüyor ise pantoprazolü kullanmalısınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Pantoprazolün anne sütüne geçtiği bildirilmiştir. Doktorun tavsiyesi üzerine emziren annelerde ancak ilacın anneye yararının, bebeğe zarar verme riskinden fazla olması halinde kullanılmalıdır.

Araç ve makine kullanımı

Baş dönmesi ve görme bozuklukları gibi durumlar yaşıyorsanız, araç veya makine kullanmayınız.

PENZOL'ün içeriğinde bulunan bazı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu ilaç laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu ilaç renklendirici olarak E102 tartrazin içerdiği için alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Bu ilaç her dozunda 1 mmol (23 mg)'den daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

- Pantoprazol, emilimi midedeki asit düzeyine (pH'ya) bağlı olan, ketokonazol, itrakonazol ve posakonazol gibi mantar enfeksiyonlarını önlemeye yönelik ilaçların, ya da erlotinib gibi bazı kanser ilaçlarının emilimini azaltarak etkisini zayıflatabilir.
- Proton pompası inhibitörleri, atazanavir gibi HIV (AIDS) tedavisinde kullanılan ilaçların emilimini azaltırlar. Pantoprazol dahil proton pompası inhibitörlerinin, atazanavir ile birlikte kullanılması tavsiye edilmemektedir.
- Pantoprazol, karaciğerde metabolize olur. Aynı şekilde karaciğerde metabolize olan diğer ilaçlarla pantoprazol arasında bir etkileşme olabilir. Bununla birlikte, aşağıdaki ilaçlar ile özel testler yapılmış ve klinik önemi olan bir etkileşme gözlenmemiştir:
 - Karbamazepin (epilepsi ve duyu durumu değişiklikleri ilacı),
 - Diazepam (kaygı bozukluğu gidermede kullanılır)
 - Nifedipin (kan basıncı yüksekliği tedavisinde kullanılır)
 - Glibenklamid (kan şekeri düşürücü),
 - Doğum kontrol hapları (levonorgestrel ve etinil östradiol içeren)
- Eğer kan pıhtılaşmasına etki eden (fenprokumon/varfarin gibi) bir ilaç kullanıyorsanız, pantoprazol tedavisi başladıktan ve sonlandırıldıktan sonra ve düzensiz kullanımı sırasında kan pıhtılaşma değerlerinizin izlenmesi önerilir.
- Antasitlerle birlikte kullanıldığında bir etkileşme görülmemiştir. Antasitler mide asidini azaltmak için kullanılan, genellikle çiğneme tableti veya şurup şeklindeki ilaçlardır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. PENZOL nasıl kullanılır?

- **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

Erişkinler ve 12 yaşın üzerindeki çocuklarda

Reflü özofajit (yemeklerin ve asidin mideden yemek borusuna kaçması) ve ilişkili belirtilerin (örneğin, göğüste yanma ve ağrı, mide asidinin yemek borusuna geri kaçması, yutma sırasında ağrı) tedavisinde

Önerilen doz günde bir tane PENZOL 40 mg'dır. Doktorunuz günde 2 tablet PENZOL 40 mg kullanmanızı önerebilir. Tedavi süresi genellikle 4-8 haftadır. PENZOL ile tedavinizin ne kadar süreceği konusunda doktorunuz size bilgi verecektir.

Erişkinlerde

Uygun iki antibiyotikle kombine olarak *H.Pylori* isimli bir bakteri enfeksiyonunun neden olduğu duodenal ülser ve mide ülserinin tedavisinde

Amoksisilin, klaritromisin ve metronidazol (veya tionidazol) antibiyotiklerinden ikisi ile birlikte kombine olarak günde iki kez birer tablet PENZOL'dür. İlk tablet kahvaltıdan 1 saat önce ve ikinci tablet ise akşam yemeğinden 1 saat önce alınır. Tedavi süresi genellikle 1-2 haftadır. Doktorunuzun önerilerini takip ediniz ve bu antibiyotiklerin kullanma talimatlarını okuyunuz.

Gastrik ülser ve duodenal ülser tedavisinde

Önerilen doz günde 1 tablet PENZOL'dür. Doktorunuz günde 2 tablet PENZOL kullanmanızı önerebilir. Gastrik ülser için tedavisi süresi genellikle 4-8 haftadır. Duodenal ülser için ise tedavi süresi genellikle 2-4 haftadır. PENZOL ile tedavinizin ne kadar süreceği konusunda doktorunuz size bilgi verecektir.

Zollinger Ellison Sendromu'nun ve midenin çok aşırı asit üretimi yaptığı diğer durumların uzun süreli tedavisinde

Tavsiye edilen başlangıç dozu genellikle günde 2 tablet PENZOL'dür.

İki tablet de yemekten 1 saat önce aynı anda alınır. Midenizin asit üretimine bağlı olarak doktorunuz daha sonra ilacınızın dozunu ayarlayacaktır. Eğer doktorunuz, günde 2 tablettten daha fazla kullanmanızı önerirse, tabletler günde iki defa olacak şekilde alınır.

Eğer doktorunuz günde 4 tablettten fazla kullanmanızı önerirse, doktorunuz ilacı ne zaman bırakacağınızı söyleyecektir.

• **Uygulama yolu ve metodu:**

PENZOL çiğnenmemeli veya kırılmamalı; yemekten 1 saat önce bir miktar su ile bütün olarak yutulmalıdır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

12 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanım:

PENZOL yaşlılarda doz ayarlaması yapılmadan kullanılabilir.

Özel kullanım durumları :

Böbrek yetmezliği:

Böbrek fonksiyon bozukluğunuz ve ağır ya da orta derecede karaciğer problemlerinizi varsa, PENZOL'ü *H.pylori* tedavisi için kullanmayınız.

Karaciğer yetmezliği:

Ağır karaciğer bozukluğu olan hastalarda günlük 20 mg pantoprazol dozu aşılmamalıdır.

Eğer PENZOL'ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla PENZOL kullandıysanız:

PENZOL'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

PENZOL kullanmayı unutursanız:

İlacınızı almayı unutursanız, unutulmuş dozu telafi etmek için çift doz almayınız. Tedavinizi, doktorunuzun verdiği doz şemasına göre, bir sonraki dozdan itibaren sürdürünüz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

PENZOL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

PENZOL ile tedavinizin ne kadar süreceği konusunda doktorunuz size bilgi verecektir. Tedaviye erken son vermeyiniz, çünkü hastalığınızın belirtileri geri dönebilir veya ağırlaşabilir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, PENZOL'ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki sıklık derecelerine göre sınıflandırılmaktadır.

- Çok yaygın (10 hastanın 1'inden fazlasında görülür.)
- Yaygın (100 hastanın 1 ila 10'unda görülür)
- Yaygın olmayan (1000 hastanın 1 ila 10'unda görülür)
- Seyrek (10.000 hastanın 1 ila 10'unda görülür)
- Çok seyrek (10.000 hastanın 1'inden azında görülür)
- Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

Aşağıdakilerden biri olursa, PENZOL'ü kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Dil ve/veya boğazda şişme, yutma/yutkunma güçlüğü, kurdeşen (ürtiker), nefes alma güçlüğü, yüzde alerjik şişme (Quincke hastalığı/anjioödem), çok hızlı kalp atımı ve terlemeyle seyreden baş dönmesi.
- Deride ani gelişen, yaygın, kabarcıklar şeklinde, ağrılı döküntüler, genel sağlık durumunun hızla kötüye gitmesi, göz, burun, ağız/dudak ve cinsel organda tahriş (hafif kanlanma) (bunlar Steven Johnson Sendromu, Eritema multiforme ve Lyell Sendromu gibi ciddi cilt reaksiyonlarının belirtileri olabilir) ve ışığa hassasiyet

- Deride veya gözlerin beyaz kısmında sarılaşma (karaciğer hücrelerinde ağır hasar, sarılık) veya ateş, kurdeşen ve ağrılı idrar ve bel ağrısı ile birlikte böbreklerde büyüme (ciddi böbrek iltihabı)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin PENZOL'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Yaygın

- Midede iyi huylu polipler

Yaygın olmayan

- Baş ağrısı,
- Baş dönmesi,
- İshal,
- Kendini iyi hissetmeme,
- Kusma,
- Midede şişkinlik ve gaz,
- Kabızlık,
- Ağızda kuruluk,
- Karın ağrısı,
- Kızartı, kaşıntı ve deri döküntüsü gibi alerjik rahatsızlıklar,
- Halsizlik,
- Uyku bozuklukları,
- Karaciğer enzimlerinde artış,
- Bulantı,
- Özellikle bir yıldan daha uzun süre boyunca pantoprazol gibi bir proton pompası inhibitörü kullanan hastalarda kalça, el bileği veya omurgada kırık meydana gelme riski artar.

Osteoporoz hastalığınız varsa ya da osteoporoz riskini artıran kortikosteroidler kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

Seyrek

- Tat alma duyusunun bozulması veya tamamen yok olması,
- Bulanık görme gibi görme bozuklukları,
- Kurdeşen (ürtiker),
- Eklem ağrıları,
- Kas ağrıları,
- Kilo alma/verme,
- Vücut sıcaklığının artması,

- Yüksek ateş,
- El ve ayaklarda şişme (periferal ödem),
- Alerjik reaksiyonlar,
- Depresyon,
- Erkeklerde göğüs büyümesi (jinekomasti)
- Kanda bilirubin seviyesinde artış;
- Kanda trigliserid (yağ) seviyesinde artış,
- Beyaz kan hücrelerinin (akyuvar) sayısında ani düşüş (yüksek ateşle birlikte gözlenir).

Çok seyrek

- Oryantasyon bozukluğu
- Kanda pıhtılaşmayı sağlayan kan hücresi (trombosit) sayısında azalma (bu durum, normalden daha fazla kanamaya neden olabilir);
- Beyaz kan hücrelerinin (akyuvar) sayısında azalma (bu durum, daha sık enfeksiyona yakalanmanıza neden olabilir);
- Kırmızı kan hücresi (alyuvar), beyaz kan hücresi (akyuvar) ve pıhtılaşmayı sağlayan kan hücresi (trombosit) sayılarının hepsinde birden anormal derecede azalma da söz konusu olabilir.

Bilinmiyor

- Özellikle eğilimli olan hastalarda, gerçekte var olmayan şeyleri görme ya da işitme (halüsinasyon),
- Zaman ve mekan uyumunun kaybı ve zihin karmaşası hali (konfüzyon),
- Kan sodyum seviyesinde düşme (hiponatremi),
- Magnezyum seviyesinin düşmesi (hipomagnezami).

Eğer üç aydan uzun süredir PENZOL kullanıyorsanız kanınızdaki magnezyum seviyelerinin de düşmesi mümkündür.

- Cilt ve cilt altı hastalıkları (Subakut kütanöz lupus eritematozus)
- Yorgunluk,
- İstem dışı kas gerilmeleri,
- Oryantasyon bozukluğu,
- Kasılmalar,
- Baş dönmesi ve nabız yükselmesi
- Hepatoselüler(karaciğerden kaynaklı) hastalıklar,
- Sarılık,
- Hepatoselüler(karaciğer kaynaklı) yetmezlik,
- Steven Johnson sendromu (cildin üst katmanının ölerek dökülmesine neden olan cilde yayılan ağrılı kırmızı veya morumsu kızarıklıklar ve su kabarcıkları gözlenen sendrom)
- Lyell sendromu(tüm cilt ve mukozada içi su dolu kabarcıkların görülmesi, ciltte kuruluk, böbrekler ve diğer iç organ dokularında hasar, enfeksiyon oluşması ile izlenen sendrom)

- Eritema multiforme(vücutun her yerinde simetrik, kırmızı ve yükselen deri bölgeleri ile karakterize bir deri hastalığı),
 - Fotosensitivite(ışığa duyarlılık),
 - Interstisyel nefrit(böbrek yollarını çevreleyen bölgenin şişmesi),
- şekillerinde kendini gösterir. Magnezyum seviyesinin düşmesi aynı zamanda kanınızdaki potasyum ve kalsiyum seviyelerinin de düşmesine neden olabilir. Doktorunuz kanınızdaki magnezyum seviyelerini izlemek için düzenli testler yaptırmanızı isteyebilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “ İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. PENZOL’ün saklanması

PENZOL’ü *çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra PENZOL’ü kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz PENZOL’ü kullanmayınız.

Ruhsat sahibi: Pensa İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Polat Tower 441-442

Fulya Mah. Yeşil Çimen Sok.

34394 Şişli –İstanbul

Üretim yeri: Dinçsa İlaç San. Ve Tic. A.Ş.

I. Organize Sanayi Bölgesi Avar Cad. No : 2

06935 Sincan – ANKARA

Tel No : 0312 267 11 91 (pbx)

Faks No : 0312 267 11 99

Bu kullanma talimatı ./././... tarihinde onaylanmıştır.