

R-X SÜSPANSİYON 150 g/240 ml

FORMÜLÜ

240 ml Süspansiyon'da 150 gr Baryum Sülfat içerir.

Yardımcı Maddeler: Karboksi Metil Selüloz Sodyum, Sodyum Dioktil Sülfosüksinat, Sakkarin Sodyum, Nipajin M Sodik, Aroma.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

R-X Süspansiyon, Gastro İntestinal (G.I.) kanalın radyolojik incelemesinde kullanılmak üzere hazırlanmış çok küçük partiküllü (mikron düzeyinde) bir Baryum Sülfat süspansiyon'udur. Son literatürlerin ışığında özellikle rölief belirlenmesini sağlayan maddelerle formüle edilmiş olup tadı ve kokusu ile hastaların rahatlıkla içeceği yapıdadır, bulantı hissi olmaz.

ENDİKASYONLARI

Gastro İntestinal Track'in radyolojik incelenmesinde.

KONTRENDİKASYONLARI

Trakea özofageal fistüllerde.

Batın organ perforasyonlarında.

Özofagus atrezisinde,poşun pfasikasyonunu mutlaka önlemek gerekir.

Şayet ilaç verilmiş ise alabildiğince az verilip sonradan geri çekilmelidir.

İçerdiği maddelere karşı herhangi bir fuyarlılığı olan olan hastalarda kullanılmamalıdır.

UYARILAR / ÖNLEMLER

Bardağı açmadan 15-30 saniye kuvvetlice çalkalayınız.

Rektal yolla verildiğinde nadir olarak kolonlarda genişlemeye ve kabızlığa neden olabilir.

Enema şeklinde uygulanması, özellikle intestinal hastalığı olanlarda, çocuk, yaşlı ve düşkünlerde dikkat gerektirir.

Baryumun eliminasyonu uzun zaman aldığı için için tetkiki takib eden günlerdeki diğer batın incelemelerinin (üriner sistem veya tomodontometrik) sağlıklı yapılmasını engelleyebilir.

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER

Yoktur.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İlaçlarla etkileşme ve geçimsizliğine rastlanmamıştır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZ

Gastrinestinal kanalın çeşitli kesimlerinde ve tetkik şekline göre farklılık gösterir. Özofagusta R-x Süspansiyon sulandırılmaz, yalnız kuvvetle çalkalandıktan sonra kıvamda kullanılır.

Mide, duodenum'da norma tekik; R-X Süspansiyon'a 60 ml su ilavesi ile hazırlanan süspansiyon kullanılır.

Rölief Saptamasında; İlk etapta 50ml R-X Süspansiyon sulandırılmaksızın verilir. İkinci etapta, dolu mide ve mideden atılışı tetkik için 60 ml su ilave edilmiş R-X Süspansiyon kullanılır.

Yalnız ince barsak incelenecekse; 60 ml su ilavesi ile hazırlanan R-X Süspansiyon bir buçuk bardak verilip ½, 1, 1 ½saatlik aralarla grafiler alınır.

50-55 kg ağırlığın üzerindeki hastalarda R-X Süspansiyon (%100 240/240 mg) tercih edilmelidir.

SAKLAMA KOŞULLARI

25°C'nin altında saklanmalı, donması önlenmelidir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI

Bir dozluk cam kaplarda.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİM YERİ

Yenişehir Laboratuvarı Ltd. Şti. Plevne Cad. No:101

06350 Gülseren / ANKARA

Telefon : 0-312-351 34 60 - 61

Fax : 0-312-349 35 09

RUHSAT TARİH VE NUMARASI

02.02.1996 - 177/20

Reçete ile satılır.