

KULLANMA TALİMATI

VİLDABET 50 mg Tablet

Ağızdan alınır.

- **Etkin madde:** Her bir tablet 50 mg vildagliptin içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Mikrokristalin selüloz, susuz laktoz (inek sütünden elde edilmiştir), sodyum nişasta glikolat ve magnezyum stearat.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **VİLDABET nedir ve ne için kullanılır?**
2. **VİLDABET kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **VİLDABET nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **VİLDABET'in saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. VİLDABET nedir ve ne için kullanılır?

VİLDABET, ağız yolu ile kullanılan, kan şekerini düşüren ilaçlar olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.

VİLDABET, 28 ve 56 tablet içeren Alu/Alu blister ambalajlarda takdim edilmektedir.

VİLDABET, yalnızca diyet ve egzersizle kontrol altına alınamayan şeker hastalığının (Tip 2 diyabetin) tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Kan şeker düzeyinin kontrol altına alınmasına yardım eder.

Şeker hastalığı (Tip 2 diyabet), vücudunuzun yeterli miktarda insülin üretilmediği ya da üretilen insülin doğru şekilde çalışmadığında gelişir. Hastalık ayrıca, çok fazla glukagon adı verilen hormonun üretildiği durumlarda da gelişebilir.

İnsülin, özellikle yemeklerden sonra olmak üzere kanınızdaki şeker düzeyinin düşürülmesine yardım eden bir maddedir. Glukagon, karaciğerde şeker üretimini tetikleyerek kan-şekeri

düzeşinin yükselmesine neden olan bir maddedir. Bu maddelerin her ikisi de pankreas tarafından üretilir.

VİLDABET, pankreasın daha fazla insülin ve daha az miktarda glukagon üretmesini sağlar. Bu şekilde, kan şeker düzeyinin kontrol altında tutulmasına yardım eder.

Doktorunuz VİLDABET'i size kan şeker düzeyinin tek başına kullanılan bir ilaçla kontrol altına alınamadığı durumlarda başka bir kan şekerini düşüren ilaç ile kombinasyon şeklinde kullanmak üzere reçete edecektir.

VİLDABET ile tedavi görürken size önerilen diyet ve/veya egzersiz programına devam etmeniz önemlidir.

2. VİLDABET kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

VİLDABET'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

- Vildagliptine ya da VİLDABET'in içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa (yardımcı maddeler listesine bakınız).

VİLDABET'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

- Orta derecede ya da ileri derecede böbrek hastalığınız varsa, (VİLDABET dozunun azaltılması gerekebilir),
- Daha önce VİLDABET kullandıysanız ve yan etkiler (karaciğer hastalığı) nedeniyle bırakmak zorunda kaldıysanız, yeniden VİLDABET kullanmamalısınız
- Karaciğer hastalığınız varsa karaciğer fonksiyon testleri ve anomali oluşması durumunda tedavi kesilmelidir.
- Diyaliz hastası iseniz
- Kalp yetmezliğiniz varsa (Doktorunuz rahatsızlığınızın derecesine göre VİLDABET'i reçete edip etmeme kararı verecektir.)
- Tip 1 diyabetiniz (tip 1 şeker hastalığı) varsa yani vücudunuz insülin üretmiyorsa VİLDABET insülinin yerine geçmez.
- Diyabetik ketoasidoz (şeker hastalığına bağlı olarak kanda keton cisimleri olarak adlandırılan maddelerin biriktiği ve koma öncesi bir duruma neden olabilen bir rahatsızlıktır. Bu rahatsızlık nedeniyle karın ağrısı, hızlı ve derin soluma, uyku hali veya nefesin olağandışı meyvemsi bir kokuya sahip olması belirtiler ortaya çıkabilmektedir) olarak adlandırılan durumunuz varsa,
- Sülfonilüre olarak bilinen (diyabet için kullanılan başka bir ilaç) ilacı alıyorsanız (doktorunuz, kan şekerindeki düşüşün önüne geçme amacıyla, VİLDABET ile birlikte aldığınız sülfonilüre dozunu düşürmek isteyebilir).

Bu durumlar sizin için geçerli ise VİLDABET kullanmadan önce doktorunuzla, eczacınızla veya diyabet hemşireniz ile görüşünüz.

Őeker hastalığına baęlı deri yaraları Őeker hastalığının sık grlen sonularından biridir. Doktorunuz ya da hemŐireniz tarafından verilen deri ve ayak bakımı tavsiyelerine uyunuz.

Ayrıca, VİLDABET kullanırken ortaya ıkan kabarcık ya da yaralar konusunda zellikle dikkatli olmanız tavsiye edilmektedir.

Pankreatit (Pankreas iltihabı) ciddi, yaŐamı tehdit eden tıbbi bir durum olabilir. Eęer kusma ile birlikte olan veya olmayan ciddi ve inatı karın aęrısı yaŐarsanız pankreatitiniz olabilir, VİLDABET'i kesip doktorunuza baŐvurunuz.

VİLDABET tedavisine baŐlamadan nce karacięer fonksiyonunuzu deęerlendiren bir test yapılacak ve ilk yıl  ayda bir ve sonrasında periyodik olarak tekrarlanacaktır. Bu testler, karacięer enzimlerindeki artıŐ bulgularının mmkn olduęunca erken saptanabilmesi iin yapılmaktadır.

DPP-4 inhibitrleri olarak adlandırılan gruba ait ilaları kullanan hastaların bazılarında, Őiddetli ve sakatlıęa yol aabilen eklem aęrısı geliŐtięi bildirilmiŐtir. Belirtilerin ortaya ıkıŐı, tedavi baŐlangıcından itibaren bir gn ile yıllar arasında deęiŐmiŐtir. İla kesildięinde belirtiler sonlanmıŐtır ve hastalara aynı ila veya bu gruba ait baŐka bir ila yeniden verildięinde belirtilerin tekrar ortaya ıktıęı gzlemlenmiŐtir. Bu ila grubu, Őiddetli eklem aęrısının olası nedeni olarak dŐnlmeli ve uygunsa ila bırakılmalıdır.

Pazarlama sonrası dnemde, DPP-4 inhibitrleri olarak adlandırılan gruba ait ilaları kullanan bazı hastalarda, bllz pemfigoid (ii su dolu kabarcıklar oluŐturan ve bu su dolu kabarcıkların patlayıp aılması ile zeri kabuklanan, yzeyssel yaralar Őeklinde seyreden bir deri hastalığı) olarak adlandırılan ve hastaneye baŐvurmayı gerektiren bir durumun geliŐtięi rapor edilmiŐtir. İla bırakılması ve sistemik/topikal baęıŐıklık baskılayıcı ilalarla tedavi uygulanması durumunda hastaların biroęunda durumun dzeldięi grlmŐtr. VİLDABET kullanırken cildinizde kabarcık ve yzeyssel yaralar ortaya ıktıęını gzlemlemeniz durumunda bunun doktorunuza bildirmeniz gerekmektedir. Eęer kendinizde bllz pemfigoid geliŐtięinden Őpheleniyorsanız bu durumda VİLDABET kullanmayı bırakmak konusunda doktorunuza danıŐmalı ve uygun tanı ve tedavi iin bir dermatoloęa baŐvurulmalısınız.

Bu uyarılar gemiŐteki herhangi bir dnemde dahil olsa sizin iin geerliyse ltfen doktorunuza danıŐınız.

VİLDABET'in yiyecek ve iecek ile kullanılması

VİLDABET'i a ya da tok karnına alabilirsiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıŐınız.

Hamileyseniz, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız ya da hamile kalmayı planlıyorsanız VİLDABET kullanmadan önce doktorunuza danışınız. Hamilelik sırasında VİLDABET kullanmamalısınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

VİLDABET'in anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. VİLDABET tedavisi sırasında bebeğinizi emzirmemelisiniz.

Araç ve makine kullanımı

VİLDABET kullanırken baş dönmesini de içeren sersemlik hali gelişebilir. Bu nedenle, araç veya makine kullanımından kaçınmalısınız.

VİLDABET'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler:

VİLDABET, süt şekeri (laktoz) adı verilen bir madde içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Başka ilaçlar (örneğin tiyazidler, kortikosteroidler, tiroid hastalığı ilaçları ve sinir sistemini etkileyen belirli bazı ürünler ile birlikte sülfonilüreler, meglitinidler ve biguanidler sınıfı olarak adlandırılan kan şekerini düşüren ilaçlar) alıyorsanız doktorunuz VİLDABET dozunuzu değiştirmek isteyebilir.

ADE inhibitörleri olarak adlandırılan gruba dahil olan ve yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan ilaçları VİLDABET ile birlikte kullanan hastalarda, anjiyoödem olarak adlandırılan ciddi bir alerjik reaksiyon görülme riskinde artış olabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3.VİLDABET nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Kullanılması gereken VİLDABET dozu hastanın durumuna bağlı olarak değişir. Tam olarak kaç tablet VİLDABET almanız gerektiğini doktorunuz size söyleyecektir.

Genellikle kullanılan VİLDABET dozu:

- VİLDABET'i sülfonilüre isimli başka bir ilaçla birlikte kullanıyorsanız günde bir doz olarak sabahları 50 mg, ya da

- VİLDABET'i tek başına metformin veya glitazon isimli başka bir ilaçla birlikte metformin ve bir sülfonilüre ya da insülin ile kombinasyon halinde kullanıyorsanız sabah 50 mg ve akşam 50 mg olmak üzere günde 100 mg
- Orta derecede ya da şiddetli böbrek hastalığınız varsa veya diyaliz tedavisi alıyorsanız günde bir doz olmak üzere sabah 50 mg

VİLDABET'i her gün, doktorunuzun size kullanmanızı söylediği süre boyunca kullanmaya devam ediniz. Bu tedaviyi uzun bir süre devam ettirmeniz gerekebilir. Doktorunuz tedavinin sizde istenen etkiyi sağlayıp sağlamadığını kontrol etmek üzere durumunuzu düzenli olarak izleyecektir.

Doktorunuz size söylemedikçe VİLDABET kullanmayı bırakmayınız.

İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

VİLDABET'i ne kadar süreyle kullanacağınız konusunda sorularınız varsa, doktorunuza danışınız.

Uygulama yolu ve metodu:

- VİLDABET yalnızca ağızdan kullanım içindir.
- Tabletleri bütün olarak, bir bardak su ile yutunuz. Tabletler çiğnenmemeli, ezilmemeli ve bölünmemelidir.
- VİLDABET aç ya da tok karına alınabilir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklar ve ergenlerde kullanım:

VİLDABET'in çocuklarda ve ergenlerde (18 yaşından küçüklerde) kullanılmasıyla ilgili herhangi bir bilgi mevcut değildir.

Bu nedenle VİLDABET'in söz konusu hastalarda kullanılması önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanım:

VİLDABET, 65 yaş ve üstü kişilerde erişkinlerdeki ile aynı dozda kullanılabilir.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

Doktorunuz VİLDABET ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü VİLDABET tedavisini durdurmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir.

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Hafif derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.

Orta ya da ileri derecede böbrek yetmezliği ya da son dönem böbrek yetmezliği (ESRD) bulunan hemodiyaliz hastalarında önerilen VİLDABET dozu, günde bir defa 50 mg'dır.

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda VİLDABET kullanılması önerilmez.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

Eğer VİLDABET'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla VİLDABET kullandıysanız:

VİLDABET'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

VİLDABET'i kullanmayı unutursanız:

İlacınızı her gün aynı saatlerde, tercihen sabahları almanız önerilir. VİLDABET almayı unutursanız, anımsar anımsamaz alınız. Bunun ardından bir sonraki dozu gereken zamanda alınız. Ancak ilacı almayı unuttuğunuzu, bir sonraki dozun alınma saatine çok yakın bir saatte anımsarsanız, unuttuğunuz dozu almayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

VİLDABET ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

VİLDABET tedavisini durdurmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir.

Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe, tedaviyi durdurmayınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi VİLDABET'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın	:10 hastanın 1'inden fazla görülebilir.
Yaygın	:10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan	:100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek	:1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Çok seyrek	:10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor:	Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, VİLDABET'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Anjiyoödem olarak adlandırılan ciddi alerjik bir reaksiyona işaret eden, yüzde, dilde ya da boğazda şişme, yutkunma zorluğu, solunum güçlüğü, aniden başlayan döküntü ya da kurdeşen
- Karaciğer hastalığına (hepatit) işaret eden, gözlerde ve/veya deride sarı renk, mide bulantısı, iştah kaybı ya da idrar renginde koyulaşma
- Sırtta yansıyabilen, bulantı ve kusma ile seyredabilen şiddetli ve inatçı üst karın ağrısı (olası iltihaplı pankreas belirtisi)

- Bař ađrısı, uyuklama hali, gcszlk, sersemlik, zihin karıřıklıđı, abuk fkelenme, alık hissi, hızlı nabız, terleme, asabi hissetme ('hipoglisemi' adı verilen kanda kan řekeri dřklđnn olası semptomları)

Bu ok ciddi yan etkilerin hepsi olduka seyrek grlr.

Eđer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi mdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

VİLDABET ile metformin birlikte kullanıldıđında oluřabilecek yan etkiler:

Yaygın:

- Titreme
- Bař ađrısı
- Sersemlik hali
- Mide bulantısı
- Kan řekeri dzeyinde azalma

Yaygın olmayan:

- Yorgunluk

VİLDABET ile slfonilre grubu bir ila birlikte kullanıldıđında oluřabilecek yan etkiler:

Yaygın:

- Titreme
- Bař ađrısı
- Sersemlik hali
- Yorgunluk
- Dřk kan řekeri

Yaygın olmayan:

- Kabızlık

ok seyrek:

- Burun akıntısı
- Bođaz ađrısı

VİLDABET ile glitazon grubu bir ila birlikte kullanıldıđında oluřabilecek yan etkiler:

Yaygın:

- Kilo artıřı
- Eller, ayak bilekleri veya ayaklarda řiřkinlik (dem)

Yaygın olmayan:

- Bař ađrısı
- Yorgunluk
- Kan řekeri dzeyinde azalma

VİLDABET tek başına kullanıldığında oluşabilecek yan etkiler:

Yaygın:

- Sersemlik hali

Yaygın olmayan:

- Baş ağrısı
- Kabızlık
- Ellerde, ayak bileklerinde ya da ayaklarda şişme (ödem),
- Eklem ağrısı
- Kan şekeri düzeyinde azalma

Çok seyrek:

- Boğaz ağrısı
- Burun akıntısı
- Ateş

VİLDABET, metformin ve bir sülfonilüre ile birlikte kullanılırken oluşabilecek yan etkiler:

Yaygın:

- Sersemlik
- Titreme
- Yorgunluk
- Düşük kan şekeri
- Aşırı terleme.

VİLDABET ile insülin birlikte kullanılırken (metformin ile veya metforminsiz) oluşabilecek yan etkiler:

Yaygın:

- Baş ağrısı
- Üşüme
- Bulantı
- Düşük kan şekeri
- Mide ekşimesi (reflü)

Yaygın olmayan:

- İshal
- Gaz

Ürün pazara sunulduktan sonra aşağıdaki yan etkiler bildirilmiştir:

Bilinmiyor (Eldeki veriler ile sıklığı belirlenemiyor):

- Kaşıntılı kurdeşen
- Pankreas iltihabı
- Derinin soyulmuş olduğu alanlar ve kabarcıklar
- Kas ağrısı

- İçi su dolu kabarcıklar oluşturan ve bu su dolu kabarcıkların patlayıp açılması ile üzeri kabuklanan, yüzeysel yaralar şeklinde seyreden bir deri hastalığı olan büllöz pemfigoid

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. VİLDABET’in saklanması

VİLDABET’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

VİLDABET’i 25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Nemden korumak için orijinal ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra VİLDABET’i kullanmayınız.

Eğer ambalajın hasar görmüş olduğunu fark ederseniz VİLDABET’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi:

İlko İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Veysel Karani Mah. Çolakoğlu Sok. No:10
34885 Sancaktepe /İstanbul
Tel: 0216 564 80 00

Üretim yeri:

İlko İlaç San. ve Tic. A.Ş.
3.Organize Sanayi Bölgesi
Kuddusi Cad. 23. Sok. No:1 Selçuklu / Konya

Bu kullanma talimatı 10.04.2018 tarihinde onaylanmıştır.