

KULLANMA TALİMATI

ZADE VİTAL CUCURMİN 320 mg yumuşak kapsül

Ağızdan alınır.

- **Etkin madde:** Her bir yumuşak kapsül 320 mg kabak (*Cucurbita pepo* L.) tohumu yağı (Oleum Cucurbitae semen) içerir.
- **Yardımcı maddeler:** dl α - tokoferol, dl α - tokoferil asetat, jelatin, saf su, gliserin.

Bu tıbbi ürünü kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATI'nın tümünü dikkatlice okuyunuz.

- *Bu kullanma talimatını muhafaza ediniz. Tekrar okumanız gerekebilir.*
- *Eğer başka sorularınız varsa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.*
- *Bu tıbbi ürün reçetesiz satılmaktadır. Bununla birlikte, ondan en iyi sonucu elde etmek için ZADE VİTAL CUCURMİN'i yine de dikkatlice kullanmanız gerekir.*
- *Eğer daha fazla bilgi veya tavsiyeye ihtiyaç duyarsanız doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.*
- *Eğer semptomlarınız kötüleşir ya da düzelmezse bir doktora görünmelisiniz.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **ZADE VİTAL CUCURMİN nedir ve ne için kullanılır?**
2. **ZADE VİTAL CUCURMİN'i kullanmaya başlamadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **ZADE VİTAL CUCURMİN nasıl kullanılmalıdır?**
4. **Olası yan etkileri nelerdir?**
5. **ZADE VİTAL CUCURMİN'in saklanması**
6. **Diğer bilgiler**

Başlıkları yer almaktadır.

1. ZADE VİTAL CUCURMİN nedir ve ne için kullanılır?

- ZADE VİTAL CUCURMİN şeffaf sarımsı renkte, oblong şeklinde yumuşak bir kapsüldür.
- Her bir yumuşak kapsül 320 mg kabak tohumu yağı içerir.
- 60 kapsüllük blister ambalajlarda bulunur.

• ZADE VİTAL CUCURMİN, esansiyel (temel) yağ asitleri içeriği açısından zengindir. İyi huylu prostat büyümesi (Benign Prostat Hiperplazisi; BPH), aşırı aktif mesane (idrar kesesi) ve idrar kaçırma/tutamama (inkontinans) ile alakalı alt üriner sistem semptomlarının tedavisine yardımcı olarak kullanılır.

2. ZADE VİTAL CUCURMİN'i kullanmaya başlamadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ZADE VİTAL CUCURMİN, 18 yaş üstü erişkinlerin kullanımı içindir. 18 yaşın altındaki çocuklarda ve ergenlerde kullanılmamalıdır.

ZADE VİTAL CUCURMİN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer;

- Etkin madde'ye veya ZADE VİTAL CUCURMİN'in herhangi bir bileşenine aşırı duyarlıysanız,
- Hamile iseniz,
- Emzirme döneminde iseniz,
- Karaciğer ve böbrek yetmezliğiniz varsa.

ZADE VİTAL CUCURMİN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

- Kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsanız, bu durumda ZADE VİTAL CUCURMİN'den en fazla 9 kapsül kullanmalısınız.
- ZADE VİTAL CUCURMİN'in kullanımı sırasında şikâyetleriniz kötüleşirse veya ateş, spazm, idrarda kan ve ağrılı idrar yapma gibi semptomlar gözlenirse doktorunuza danışınız.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ZADE VİTAL CUCURMİN'in etkisine tesir edebilecek besinlerle ve içeceklerle birlikte kullanılması

ZADE VİTAL CUCURMİN'in besinlerle birlikte alınmasının emilim üzerinde herhangi bir etkisi olduğu yönünde bir bilgi olmamakla beraber, tıbbi ürünün yemeklerden bir süre sonra alınması önerilir.

Gebelik

Bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

ZADE VİTAL CUCURMİN'e başlamadan önce hamile olmadığınızdan emin olmalısınız.

Hamilelik süresince ya da gebe olduğunuzdan kuşkulaniyorsanız ZADE VİTAL CUCURMİN kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorumuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

Bu tıbbi ürünü almadan önce doktorumuza ya da eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde ZADE VİTAL CUCURMİN kullanmayınız.

Araç ve makine kullanma

ZADE VİTAL CUCURMİN'in motorlu taşıt ya da makineleri kullanma yetisi üzerine yapılmış bir çalışması bulunmamaktadır.

ZADE VİTAL CUCURMİN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her bir kapsülde 0,0805 g gliserin içermektedir. Ancak bu dozda gliserine bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

ZADE VİTAL CUCURMİN ile birlikte diğer tıbbi ürünleri kullanmak

Günümüze kadar diğer ilaçlar veya tıbbi ürünlerle etkileşimi üzerine bir çalışma bulunmamaktadır. Ancak kan sulandırıcı (antikoagülan) ilaç kullanıyorsanız, bu durumda ZADE VİTAL CUCURMİN'den günde en fazla 9 kapsül kullanmalısınız.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorumuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. ZADE VİTAL CUCURMİN nasıl kullanılmalıdır?

Uygun kullanım ve doz/ uygulama sıklığı için talimatlar:

ZADE VİTAL CUCURMİN'i kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz, emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Doktorunuz tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde:

- ZADE VİTAL CUCURMİN erişkinler için olağan günlük doz, günde 3 kez 1-3 kapsüldür.

Uygulama yolu ve metodu:

ZADE VİTAL CUCURMİN'i ağızınızda, çiğnmeden ve ezmeden tercihen yemeklerden sonra bir bardak su ile yutunuz.

ZADE VİTAL CUCURMİN'in 2 aydan daha uzun süreli kullanımının doktora danışılarak sürdürülmesi önerilmektedir.

Değişik yaş grupları:**Çocuklarda kullanımı:**

ZADE VİTAL CUCURMİN, 18 yaş altındaki çocuklarda ve ergenlerde kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda doz ayarı gereksinimi tanımlanmamıştır.

Özel kullanım durumları:**Böbrek/Karaciğer yetmezliği:**

Böbrek/karaciğer yetmezliği olan hastalarda ZADE VİTAL CUCURMİN kullanılmamalıdır.

Eğer ZADE VİTAL CUCURMİN'in etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğu izlenimine sahipseniz doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz.

Kullanmanız gerekenden fazla ZADE VİTAL CUCURMİN kullanırsanız:

ZADE VİTAL CUCURMİN'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacınız ile konuşunuz.

ZADE VİTAL CUCURMİN kullanmayı unutursanız:

Unuttuğunuz dozu tamamlamak için çift doz almayınız.

ZADE VİTAL CUCURMİN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

ZADE VİTAL CUCURMİN ile tedavi kesildiğinde herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmemektedir.

4. Olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi ZADE VİTAL CUCURMİN'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde bulantı, kusma, ishal gibi yan etkiler olabilir.

Eğer bu kullanma talimatında değinilmeyen herhangi bir yan etki fark ederseniz, lütfen doktorunuzu ya da eczacınızı bildiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonunu tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. ZADE VİTAL CUCURMİN’in Saklanması

ZADE VİTAL CUCURMİN’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25⁰C’nin altındaki oda sıcaklığında, orijinal ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki/blisterdeki son kullanma tarihinden sonra ZADE VİTAL CUCURMİN’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ZADE VİTAL CUCURMİN’i kullanmayınız.

6. Diğer Bilgiler

Ruhsat Sahibi:

ZADE VİTAL İLAÇ KİMYA GIDA SAN. ve TİC. A.Ş

Büyükkayacık OSB Mahallesi,

Güzelkonak Sok. 8B-1

Selçuklu KONYA/TÜRKİYE

Tel : (332) 239 03 69-72

e-mail : zade@zade.com.tr

Üretim Yeri:

ZADE VİTAL İLAÇ KİMYA GIDA SAN. ve TİC. A.Ş

Büyükkayacık OSB Mahallesi,

Güzelkonak Sok. 8B-1

Selçuklu KONYA/TÜRKİYE

Tel : (332) 239 03 69-72

e-mail : zade@zade.com.tr

Bu kullanma talimatı 15.09.2018 tarihinde onaylanmıştır.

SADECE ECZANELERDE SATILIR.