

KULLANMA TALİMATI

Alutard® SQ Enjeksiyonluk Süspansiyon

Deri altına uygulanır.

Etkin Madde: Alutard® SQ Enjeksiyonluk Süspansiyon allerjenler içeren bir depo preparattır.

Yardımcı Maddeler: Sodyum klorür, sodyum hidrojen karbonat, fenol,alüminyum hidroksit enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek** veya **düşük** doz almayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. ALUTARD® SQ nedir ve ne için kullanılır?
2. ALUTARD® SQ kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. ALUTARD® SQ nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. ALUTARD® SQ' nun saklanması

1. ALUTARD® SQ Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

ALUTARD® SQ, bir veya daha fazla allerjenin neden olduğu allerjik hastalıkların tedavisinde kullanılan bir allerjen ekstraktıdır.

ALUTARD® SQ, cam flakonlar içinde iki farklı ambalaj halinde bulunmaktadır: gelişme aşaması ambalajı (birden çok güç içeren set) ve idame aşaması ambalajı (100.000 SQ U/mL).

Gelişme Aşaması Ambalajı

Flakon no.	Konsantrasyon (SQ-U/mL)	Renk
1	100	Gri
2	1 000	Yeşil
3	10 000	Turuncu
4	100 000	Kırmızı

İdame Aşaması Ambalajı

Flakon no.	Konsantrasyon (SQ-U/mL)	Renk
4	100 000	Kırmızı

2. ALUTARD® SQ' yu Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

ALUTARD® SQ' yu aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

- İmmün kompleks hastalık veya immünyetmezliği gibi bağışıklık sistemi hastalığınız varsa
- Kronik kardiyopulmoner hastalık, ağır arteryel hipertansiyon veya beta-reseptör blokerleri ile yapılan tedavi gibi anafilaktik reaksiyonun tedavisini engelleyen hastalığınız ya da bu tür durumunuz varsa
- Böbrek yetmezliğiniz varsa

ALUTARD® SQ' ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLE KULLANINIZ

Eğer aşağıdaki durumlardan herhangi birine sahipseniz doktorunuzu bilgilendiriniz;

- Antihistaminler, kortikosteroidler ya da mast hücresi stabilizörleri gibi ilaçlar alıyorsanız
- Aluminyum içeren ilaçlar alıyorsanız

'Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahil olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın'

Hamilelik:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelik sırasında ALUTARD® SQ tedavisine başlanmamalıdır. Tedavi sırasında hamile kalırsanız, doktorunuz, genel durumunuzu ve ALUTARD® SQ ile yapılan önceki enjeksiyonlara karşı oluşan reaksiyonları değerlendirerek tedaviye devam edebilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ALUTARD® SQ' nin laktasyon sırasında kullanımı ile ilgili herhangi bir veri yoktur.

Araç ve Makine Kullanımı:

ALUTARD® SQ tedavisi, motorlu araç ve makine kullanımını etkilememektedir.

Diğer İlaçlarla Birlikte Kullanımı:

Aşağıda yer alan ilaçları doktorunuza bildirmelisiniz:

- Antihistaminler, kortikosteroidler ya da mast hücresi stabilizörleri gibi ilaçlar
- Alüminyum içeren ilaçlar

‘Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.’

3. ALUTARD® SQ Nasıl Kullanılır?

Uygulama Yolu ve Metodu

Dilaltından alınır.

Özel Kullanım Durumları (Böbrek, Karaciğer Yetmezliği, Doz Ayarlaması vb)
ALUTARD® SQ böbrek yetmezliğinde kullanılmamalıdır.

Eğer ALUTARD® SQ’ in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuza ya da eczacınıza ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden fazla ALUTARD® SQ kullandıysanız

ALUTARD® SQ’ dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

İstenenden fazla ALUTARD® SQ dozu enjekte edilirse, sistemik reaksiyon riski artar. Hasta gözlem altında tutulmalı ve tüm reaksiyonlar ilgili semptomatik ilaç ile tedavi edilmelidir.

ALUTARD® SQ kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

4. Olası Yan Etkiler Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi ALUTARD® SQ’ nun içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

- Enjeksiyon bölgesinde yayılan şekilde şişme, kızamık, ağrı, kaşıntı ve ürtiker
- Deri altı nodülleri
- Ürtiker, yorgunluk, soluk kısılığı, göğüste basınç ve kızarma.
- Rinit, burun tıkanıklığı, öksürme, hapşırma, konjunktivit ve astım.
- Baş ağrısı, kaşıntı ve genel yorgunluk..
- Anjiyoödem, bronkospazm ve dilde ya da dudaklarda şişme.
- Hapşırma, rinit ve larengeal ödem.
- Bulantı, abdominal ağrı ve kramp, kusma ve ishal.
- Düşük kan basıncı, taşikardi, aritmi, ventriküler fibrilasyon ve şiddetli vakalarda şok ve kardiyak arrest.

- Bilinç kaybı ile devam edebilen bayılma ve koma riski.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorumuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. ALUTARD® SQ' nun Saklanması

ALUTARD® SQ' yu çocukların göremeyeceği veya erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

2-8 ° C' de buzdolabında ve orijinal ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihine uygun kullanınız. Etiketeki son kullanma tarihinden sonra ALUTARD® SQ' ı kullanmayınız/son kullanma tarihinden önce kullanınız.

Ruhsat Sahibi

Adı : Albio Allerji Ürünleri İthalat ve Ticaret Ltd. Şti.
Adresi : Mustafa Mahzar Bey Cad. Ateşer Apt. No 41-4 Selamiçeşme –İstanbul

Üretici ALK-Abello' A/S
BØge Alle' 6-8 2970 HØrsholm
DANİMARKA

Bu Kullanma Talimatı Onaylanmıştır.

Bu Kullanma Talimatının Son Ay ve Yıl