

E-Z-CAT BARYUM SÜLFAT SÜSPANSİYON ORAL 225 mL

OPAKİM

FORMÜLÜ

Baryum sülfat (%4.9 a/h, %4.6 a/a.). Ayrıca sorbitol, pektin, simetikon emülsiyon, ksantan zımkı, potasyum sorbat, sakarin sodyum, metil para-hidroksibenzoat, anhidr sitrik asit, sodyum sitrat dihidrat, polioksietilen gliseril monooleat, suni portakal tat maddesi, sodyum karragenan ve su içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Farmakodinamik

Baryum sülfat, yüksek yoğunluğu nedeniyle x-ışınlarına opakdır ve bu nedenle radyografik incelemelerde pozitif kontrast madde olarak etki eder.

Farmakokinetik

Biyolojik olarak inert olduğundan vücut tarafından absorbe ve metabolize olmaz. Vücuttan değişmeden elimine olur.

ENDİKASYON

Gastrointestinal sistemin Bilgisayarlı Tomografisinde (BT) opak görüntü sağlamak için.

KONTRENDİKASYONLAR

BT prosedürleri için baryum sülfat ürünleri, GI sisteminde bilinen veya şüphelenilen perforasyonu veya obstrüksiyonu olan hastalarda ve baryum sülfat formülasyonlarına hipersensitivitesi olanlarda kullanılmamalıdır.

UYARILAR / ÖNLEMLER

Kontrast maddeye daha önceden olan reaksiyon hikayesinde, geriatrik hastalar ve belirgin hipertansiyonu veya ilerlemiş kalp hastalığı olanlarda, özel dikkat gösterilmelidir.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

E-Z-CAT® oral kullanım içindir ve kullanılacak hacmi ve konsantrasyonu, tetkik altındaki bölge(ler)de gerekli kontrastlık derecesi ve yayılması ile kullanılacak ekipman ve tekniğe bağlıdır.

DOZAJ VE UYGULAMA

İçeriği 1lt'lik bir kaba dökün. Suyla total hacmi 900 ml'e tamamlayın. İyice çalkalayın. Elde edilen ürün 900 ml %1.2 a/a BaSO₄ süspansiyonudur.

E-Z-CAT® baryum süspansiyon, dönüşümlü olarak, farklı dansitede ürün için karıştırılabilir. Şöyle ki;

- İçeriği bir karıştırma kabına dökün, 700 ml'e kadar su ekleyin, ürün %1.5 a/a süspansiyondur.
- 600 ml'e kadar su ekleyin, ürün %1.7 a/a süspansiyondur.
- 500 ml'e kadar su ekleyin, ürün %2.1 a/a süspansiyondur.

Karın incelemeleri için önerilen 30 dakika baryum kullanma protokolü; 300 ml süspansiyon tetkikten 30 dk. ve 150 ml tetkikten hemen önce alınır.

Karın/Pelvis incelemeleri için önerilen 30 dakika baryum kullanma protokolü; 300 ml süspansiyon tetkikten 30 dk. ve 150 ml tetkikten hemen önce alınır. Daha sonra bir baryum eneması yapılır veya hekimin öngördüğü şekilde kullanılır.

Karın/Pelvis incelemeleri için önerilen 90 dakika baryum kullanma protokolü; 450 ml süspansiyon tetkikten 90 dk., diğer 300 ml tetkikten 30 dk. ve 150 ml tetkikten hemen önce alınır.

Diğer doz rejimleri uygulanabildiğince oluşturulabilir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

ÇOCUKLARIN ULAŞAMAYACAKALARI YERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.

GEBELER VE LAKTASYONDA KULLANIM

(Gebelik kategorisi C) Baryum sülfat inerttir, toksik değildir ve gastrointestinal sistemden absorbe edilmez, ancak gebe kadınlarda yapılmış kontrollü incelemeler yoktur ve hekim ilacın gebe kadına sağlayacağı faydanın, fötüs üzerindeki potansiyel riski haklı göstereceğine inanıyorsa kullanılmalıdır. Bununla birlikte, X-ışınlarına maruz kalınması bebeğe zarar verebileceğinden hamilelikte kullanılması tavsiye edilmez. Süt veren annelerde emniyetle kullanılabilir.

ARAÇ VE MAKİNA KULLANIMINA ETKİSİ

Bilinen etkisi yoktur.

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER

Özellikle yaşlılarda bulantı, kusma, karın krampı ve diyare gibi önemsiz advers reaksiyonlar olabilir.

SAKLAMA KOŞULLARI

25°C altında saklayınız. Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJI

225 ml PE şişe

RUHSAT SAHİBİ, İTHAL/SATIŞ YERİ İSİM VE ADRESİ

OPAKIM Tıbbi Ürünler Tic. Ltd., Tophaneliođlu Cad. No.76 Altunizade 34662 İst.

ÜRETİM YERİ İSİM VE ADRESİ

E-Z-EM Canada Inc, 11100 Colbert, Anjou, Quebec H1J 2M9 Kanada

RUHSAT TARİHİ VE NUMARASI

01.09.2005 - 118/42 Reçete ile satılır.