

# E-Z-HD ORAL SÜSPANSİYON İÇİN TOZ

OPAKİM

## FORMÜLÜ

Baryum sülfat %98 a/a Ph.Eur. Ayrıca sakarin sodyum içerir.

## FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Baryum sülfat radyografik işlemlerde tanısal yardımcı olarak kullanılır ve farmakolojik etkinliği yoktur. Vücuttan geçerken sindirim sisteminin duvarını sıvayarak ve X-ışınlarının absorpsiyonunu artırarak etki eder.

## ENDİKASYONLARI

Özofagus, mide ve duodenumun çift kontrast radyografisi

## KONTRENDİKASYONLARI

Gastro-intestinal sistemin herhangi bir kısmında perforasyon veya tıkanma şüphesi olan hastalarda gastrik çıkım bozuklukları veya baryum sülfatın kontrendike olduğu diğer durumlarda dikkatli kullanılmalıdır.

## GEBELER VE LAKTASYONDA KULLANIMI

X-ışınlarına maruz kalınması bebeğe zarar verebileceğinden hamilelikte kullanılması tavsiye edilmez. Süt veren annelerde emniyetle kullanılabilir.

## YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER

Çoğu hastada istenmeyen etkiler görülmemiştir. Bununla beraber bazı hastalarda kullanım sonrası kabızlık olmuştur. Nadirde olsa baryum sülfat intestinal obstrüksiyon veya kolon dilatasyonuna ve kardiyak aritmilere neden olabilir. Sorbitol içerdiğinden bazı hastalarda mide rahatsızlığı ve diyareye yol açabileceği bilinmelidir.

## KULLANIM ŞEKLİ VE DOZ

Oral kullanım içindir. Kullanım öncesinde ürün, likit süspansiyon oluşturmak için suyla karıştırılır. X-ışını tetkikinden önce, hastaya gaz yapıcı bir ilaç verilir. Daha sonra gaz, tetkik altındaki gastro-intestinal sistem bölgesini yavaşça genişletirken hastaya %250 a/h 340 g "E-Z-HD" süspansiyon içerilir. Doz radyolog tarafından belirlenir.

Yetişkinler ve yaşlılar: Uygun bir gaz yapıcı maddenin verilmesinden sonra %250 a/h 240 g "E-Z-HD"

Çocuklar: Doz çocuğun yaşına ve ağırlığına balı olarak ayarlanır.

#### Karıştırma Talimatı

1. Şişeye 65 ml su ilave et.
2. Kapağı emniyete al, şişeyi ters yüz et ve dibe yapışan tozu salıvermek için hafifçe vur.
3. 10-20 sn. kuvvetle çalkala.
4. Kullanmadan önce 10-20 sn. yeniden kuvvetle çalkala.
5. Kapağı aç. Hastaya şişeden içir.

Dikkat: Sulandırılmış ürünü hemen kullanınız. Artık ürünü kullanmayınız ve saklamayınız.

#### **SAKLAMA KOŞULLARI**

25°C'nin altında, oda sıcaklığında kuru bir yerde saklanmalıdır. Ürün son kullanma tarihinden sonra kullanılmamalıdır.

#### **TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI**

340 g 1 ve 24 adetlik polietilen şişe.

#### **RUHSAT SAHİBİ ADI VE ADRESİ**

OPAKİM Tıbbi Ürünler Ltd. Şti., Tophanelioğlu Cad. No. 27 Altunizade 81190 İstanbul

#### **ÜRETİM YERİ İSİM VE ADRESİ**

E-Z-EM Inc., 717 Main Street N.Y. 11590 ABD

Reçete ile satılır.