

ERFULYN KAPSÜL 100 mg

FORMÜL

Bir Erfulyln kapsül, 100 mg Nifuroksazid ve kapsül boyar maddesi olarak da; titanyum dioksit, sunset sansı ve kinolin sansı içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Nifuroksazid diğer nitrofuran türevleri gibi antibakteriyel aktivite gösterir. Barsaklardan emilmiyor olması ve barsak enfeksiyon amillerine karşı etkili bulunması, bileşiğe bir barsak antiseptiği özelliği kazandırır.

Antibakteriyel etki alanına gram pozitif (streptokok ve stafilokok gibi) ve gram negatif (koli gibi) mikroorganizmaların girmesi, farklı amillere bağlı barsak enfeksiyonlarında etkili olabilmelerini sağlar. Mukozada bir değişim olmadığı sürece barsaktan emilmez; dolayısıyla plazma ve idrarda teşhis edilmez. Normal dozlarda sistemik aktivitesi ve toksik etkisi yoktur.

ENDİKASYONLAR

- Akut ve kronik diyareler
- Kolitler

KONTRENDİKASYONLAR

Öncesinde nitrofurana karşı allerjik reaksiyonları olanlarda, prematüre ve yeni doğanlarda (0 ile 1 aylık) kontrendikedir.

UYARILAR / ÖNLEMLER

Doktorun uygun gördüğü doz kesinlikle aşılmamalıdır. Erfulyln kapsül 7 günden fazla kullanılmamalıdır. Erfulyln kapsül tedavisi hidrasyonu gereksiz kılmaz.

Hidrasyonun derecesi ve uygulama yolu (Per-os ve IV) diyarenin şiddetine ve hastanın yaşı ile durumuna bağlı olarak değişir.

Kanamalı ve pürülan invaziv enfektif diyarede, sistemik etkisi güçlü antibakteriyel maddeler kullanılmamalıdır.

Tartrazin ihtiva etmesinden dolayı hassasiyeti olan kişilerde dikkatli kullanılmalıdır.

ÇOCUKLARDA, HAMİLELERDE VE EMZİRENLERDE KULLANIM

Küçük çocuklarda kusma olgularına rastlanabilir. Hamilelerde ve emzirenlerde kullanılmaması gereklidir.

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER

Allerjik reaksiyonlara neden olabilir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZAJ

10 yaşın yukarisindakilere ve yetişkinlere toplam olarak günde 400 - 800 mg kapsül verilmelidir. Tedavi 7 günden fazla sürdürülmemelidir.

SAKLAMA KOŞULLARI

15°-30°C arasında, ışıktan uzakta, çocukların erişemeyecekleri yerlerde ve ambalajında saklayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI

Erfulyl Kapsül 100 mg: 12 kapsül ihtiva eden blister ambalajlarda.

PIYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİ

Erfulyl süspansiyon 200 mg/5 ml; 60 ml'lik ambalajlarda.

RUHSAT SAHİBİNİN İSİM VE ADRESİ

NOBEL İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş., Barbaros Bulvarı 76-78, 80690 Beşiktaş / İSTANBUL

RUHSAT TARİH VE NUMARASI

18.12.2000 - 196/25

ÜRETİM YERİ İSİM VE ADRESİ

PLANTAFARMA İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş., Sancaklar Köyü 14400, DÜZCE

Doktora danışmadan kullanmayınız.

Reçete ile satılır.