

# FENİDİN EKSEKTORAN ŞURUP® ÖKSÜRÜK ŞURUBU

## KULLANIM KILAVUZU

**FORMÜL:** 5 ml ( 1 ölçek ) de

Difenhidramin Hidroklorür	14 mg
Amonyum Klorür	135 mg
Sodyum Sitrat	57 mg
Menthol	1.1 mg
Nipasol , Nipajin , Alkol.	
Boyay Madde : Ponceau 4 R	
Tatlandırıcı : Maltitol Şurup , Sodyum Sakarin.	

### **FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ :**

Fenidin ekspektoran şurup , bileşiminde bulunan difenhidramin hidroklorür antihistaminik tesirli olup Sedatif (yatıştırıcı) tesirleri de vardır. Bu sebeple öksürük sedatifi olarakta kullanılır. Amonyum klorür ise ekspektorandır. Dolayısı ile solunum sistemindeki mukoz ifrazının yumuşatılıp çıkarılmasını sağlar.

### **ENDİKASYONLARI :**

Fenidin ekspektoran soğuk algınlığından ileri gelen öksürüklerin tedavisinde kullanılır. Burun tıkanıklığını , göz yaşarmasını , aksırmayı önler. Alerjik nedenli öksürüklerde yararlıdır.

### **KONTRENDİKASYONLARI :**

Difenhidramin hidroklorür veya preparatın bileşiminde bulunan diğer maddelere aşırı duyarlı kişilerde , mono-amino oksidaz inhibitörü ilaç alanlarda , dar açılı glokomda , astım nöbetlerinde , prostat hipertrofisi vakalarında , prematüre ve yeni doğmuş çocuklarda kullanılmamalıdır.

### **UYARILAR / ÖNLEMLER :**

Araba kullananlar , yüksek , tehlikeli yerlerde ve dikkat gerektiren işlerde çalışanlar ilacın refleks kaybına neden olduğunu düşünerek kullanmamalıdır. Alkol , hipnotik ve trankilizanlarla beraber kullanıldığında depresyon etkisinin şiddetleneceği unutulmamalıdır. Hamilelerde ve süt veren annelerde kullanmaktan kaçınılmalıdır. Bu ürünü kullanırken Difenhidramin içeren başka ilaçları (dahilen veya haricen) kullanmayınız.

### **2 yaşın altındaki çocuklarda zorunlu tıbbi gerekçe olmadan kullanılmamalıdır.**

### **YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER :**

Uyku hali , ağız , boğaz , burun kuruluğu görülebilir. Bazen deri döküntüleri , iştahsızlık , hipotansiyon , idrar retansiyonu , baş ağrısı , palpasyon görülebilir. Özellikle çocuklarda yüksek dozlarda verildiğinde uykusuzluk , huzursuzluk , bulantı görülebilir. Bu yan etkiler ilacın kullanımına son verildiğinde ortadan kalkar.

“BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.”

### **KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU :**

Büyüklerde : 2-3 saatte bir , 1-2 ölçek  
Çocuklarda : 1-5 yaşlarında , 3-4 saatte bir , yarım ölçek  
6-12 yaşlarında , 3-4 saatte bir , 1 ölçek

### **SAKLAMA KOŞULLARI :**

Fenidin 30 °C'nin altında sıkıca kapatılmış şişelerde saklanmalıdır.

### **TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI :**

125 ml ve 150ml'lik şişelerde bulunur.

### **İZİN SAHİBİ VE ÜRETİM YERİ:**

Merkez Lab. İlaç San. ve Tic. A.Ş.  
Sırrı Çelik Bulvarı Ayça Sok. No:6 Pk: 34788  
Taşdelen - Çekmeköy / İSTANBUL  
www.merkezilac.com  
Tel: (0216) 484 41 66 (Pbx) Fax: (0216) 484 41 91