

# BEVİGEN İM AMPUL 250 mg/2 ml

## FORMÜLÜ

Her bir ampul (2 ml); 250 mg Tiamin HCl (Vitamin B1) içerir.  
Yardımcı madde olarak benzil alkol ve sodyum metabisülfid içerir.

## FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Tiamin, I.M. yoldan uygulanmasından sonra hızla emilir. Vücut dokularının çoğuna yaygın dağılır. Süte geçebilir. Hücre içinde çoğunlukla difosfat halde bulunur. Tiamin'in aktif şeklini oluşturan bu madde bazı enzimlerin koenzimi olarak işlev yapar ve vücutta karbonhidratların ara metabolizmasında önemli rol oynar. Fazla miktarda alındığında vücutta tutulmaz, değişmemiş tiamin veya pirimidin içeren metabolitler halinde böbreklerden idrar içinde atılır. Ancak tiamin eksikliği halinde dışarıdan enjeksiyonla verilen tiamin dozunun normal bir kimsede tutulana oranla daha büyük bir miktarı vücutta tutulur ve idrarla atılma oranı azalır.

## ENDİKASYONLARI

Bevigen, B1 vitamini eksikliğinin tedavisinde endikedir.

## KONTRENDİKASYONLARI

B1 vitamini (Tiamin HCl) çok iyi tolere edilmesine rağmen tiamine hassasiyeti olanlar dikkatle kullanılmalıdır.

## UYARILAR/ÖNLEMLER

Tiamin HCl ihtiva eden enjeksiyonluk solüsyonlar allerjik veya anafilaktik reaksiyonlara sebep olabilir. Bu yüzden geçmişinde herhangi bir hassasiyeti olanlarda kullanılırken çok dikkatli olunmalıdır.

Doktora danışmadan kullanılmamalıdır.

## YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER

İlaca hassasiyet allerjik reaksiyon yapabilir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

## İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER

Klinik önemi bilinmemesine rağmen, nöromüsküler blok yapan ajanların etkilerini artırabildiği bildirilmiştir.

Tiamin, fosfotungstat yöntemiyle ürik asit tayini ve idrarda Erlich reaktifi ile ürobilinojen spot testini etkileyerek yanlış pozitif sonuç alınmasına neden olur. Yüksek dozda alınan Tiaminin, Shack ve Waxler spektrofotometrik serum teofilin konsantrasyonu tayinlerini bozabilir.

## KULLANIM ŐEKLİ VE DOZ

---

Tedavi olarak günde 1-2 Ampul adale içine I.M. uygulanır. Ağır vakalarda fonksiyonel kalp huzursuzluklarında, kronik alkolizmde, günde 2-3 ampul adaleden yapılır.

## SAKLAMA KOŐULLARI

---

30°C'nin altındaki oda sıcaklığında, ışık ve nemden korunarak saklayınız.

Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.

## TİCARİ TAKDİM ŐEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI

---

BEVİGEN Ampul; 2 ml. x 10 Ampul

## PİYASADA MEVCUT DİŐER FARMASÖTİK DOZAJ ŐEKİLLERİ

---

BEVİGEN 250 mg Tablet, 20 tabletlik blister ambalajlarda,

## RUHSAT SAHİBİ ADI VE ADRESİ

---

AKSU FARMA Tıbbi Ürünler İlaç San. Ve Tic. Ltd. Őti.  
Rıfki Tongsir Cad. No:58 İdealtepe / KÜÇÜKYALI –İSTANBUL

## ÜRETİM YERİ İSİM VE ADRESİ

---

MEFAR İLAÇ SAN. Kartal – İSTANBUL

## RUHSAT TARİH VE NUMARASI

---

31.03.1998 - 187/13

Reçete ile satılır.