

## Bebelac® LF

Her 100 ml'de	Birim	Bebelac® LF
<b>ENERJİ</b>	kcal	66
<b>PROTEİN</b>	g	1.3
<b>YAĞLAR</b>	g	3.5
Doymuş yağ asidi	g	1.5
Tekli doymamış y.a	g	1.4
Çoklu doymamış y.a	g	0.6
<b>KARBONHİDRATLAR</b>	g	7.3
Maltoz	g	0.9
Maltodekstrin	g	6.1
<b>MİNERALLER</b>		
Sodyum	mg	17
Potasyum	mg	65
Kalsiyum	mg	55
Fosfor	mg	30
Kalsiyum/Fosfor		1.8
Magnezyum	mg	5
Demir	mg	0.79
Çinko	mg	0.56
Bakır	mcg	42
Manganez	mcg	44
Klorür	mg	41
lyot	mcg	12
Selenyum	mcg	0.98
<b>VİTAMİNLER</b>		
A vitamini	mcg-RE	55
D <sub>3</sub> vitamini	mcg	1.2
E vitamini	mg α-TE	1.2
K <sub>1</sub> vitamini	mcg	4.5
C vitamini	mg	8.3
B <sub>1</sub> vitamini	mcg	49
B <sub>2</sub> vitamini	mcg	100
Niasin (B <sub>3</sub> )	mg NE	0.78
B <sub>6</sub> vitamini	mcg	40
Folik asit	mcg	8.9
B <sub>12</sub> vitamini	mcg	0.11
Pantotenik asit (B <sub>5</sub> )	mcg	330
Biotin	mcg	1.8
Inositol	mg	3.8
Kolin	mg	10
L-karnitin	mg	0.9
Taurin	mg	5.3
<b>NKLEOTİDLER</b>	mg	3.2
<b>BBREK SOLT YK</b>	mOsm/l	120



## ZELLİKLERİ

Akut ishal, primer ve sekonder laktoz intoleransında doęumdan itibaren kullanılır.

Kolay sindirilebilen bitkisel yağ ierir.

Karbonhidrat ierięi sindirimi kolay maltodekstrin aęırlıklıdır.

Taurin ilavelidir.

Demir ve inko ile zenginleřtirilmiřtir.

Mineralleri anne stndeki kadardır. ORS ile birlikte kullanılabilir.

Nkleotid iermektedir.

30 ml'ye bir lek (4,3 g) hazırlanır.