

KULLANMA TALİMATI

BUSİCOD® 15 mg/5 ml şurup

Ağız yoluyla alınır.

- **Etkin madde:** Her 5 ml şurup 15 mg butamirat sitrat (3 mg/ml) içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Sorbitol %70, gliserin, sodyum benzoat, sakkarin sodyum, sodyum hidroksit, çilek aroması, deiyonize su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **BUSİCOD® nedir ve ne için kullanılır?**
2. **BUSİCOD®'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **BUSİCOD® nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **BUSİCOD®'un saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. BUSİCOD® nedir ve ne için kullanılır?

- BUSİCOD® etkin madde olarak butamirat sitrat içeren, şurup formunda bir ilaçtır.
- BUSİCOD®, "öksürük baskılayıcı ilaçlar" olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.
- BUSİCOD® şurup, contalı kapaklı, amber renkli 125 ml'lik şişe ile birlikte kullanıma sunulmaktadır.
- BUSİCOD® çeşitli nedenlerden kaynaklanan öksürüğün şikayetlere yönelik (semptomatik) tedavisinde kullanılır.

2. BUSİCOD®'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BUSİCOD®'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer sizin/çocuğunuzun butamirat veya BUSİCOD®'un bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz/alerjisi varsa

Eğer çocuđunuz 3 yařın altında ise BUSİCOD®'u kullanmayınız.

BUSİCOD®'u ařađıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eđer siz/çocuđunuz aynı zamanda bařka balgam söktürücü ilaçlar alıyorsanız, dikkatli olmalısınız. BUSİCOD®'un bu tür ilaçlarla aynı anda kullanılmaması önerilir.

Bu uyarılar geçmiřteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin/çocuđunuz için geçerliyse lütfen doktorunuza danıřınız.

Öksürük 7 günden daha uzun süre devam ederse doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

BUSİCOD®'un yiyecek ve iecek ile kullanılması

BUSİCOD®'u aç veya tok karnına alabilirsiniz.

Yiyecek ve ieceklerle etkileřimi bildirilmemiřtir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Hamile iseniz, ilk üç ay BUSİCOD® kullanmamanız önerilmektedir. Daha sonraki dönemde, ancak doktorunuz kesin gereklilik olduđuna karar verirse BUSİCOD® kullanabilirsiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduđunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Bebeđinizi emziriyorsanız, BUSİCOD® almadan önce doktorunuza danıřınız.

Araç ve makine kullanımı

BUSİCOD® uykulu hissetmenize neden olabilir. Bu nedenle araç ve makine kullanırken veya dikkat gerektiren diđer işleri yaparken dikkatli olunuz.

BUSİCOD®'un ieriđinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

BUSİCOD®, sorbitol iermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı řekerlere karřı dayanıksızlıđınız olduđu söylenmiřse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geiniz.

BUSİCOD® her 5 ml'sinde 1 mmol (23 mg)'den daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında sodyum iermez.

Diđer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eđer balgam söktürücü özelliđi olan bařka ilaçlar kullanıyorsanız doktorunuza mutlaka bilgilendiriniz.

Eđer reeteli ya da reetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. BUSİCOD® nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde kendiniz/çocuğunuz için belirtilen dozlarda kullanınız:

6 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı önerilmez.

6-12 yaşındaki çocuklarda: Günde 3 defa 5 ml (bir ölçek)

12 yaş üzeri ergenlerde (adolesanlarda): Günde 3 defa 7,5 ml (1,5 ölçek)

Yetişkinlerde: Günde 3 defa 10 ml (2 ölçek)

Doktorunuz farklı bir tavsiyede bulunmadıkça, BUSİCOD®'u 1 haftadan daha uzun süre kullanmayınız.

Uygulama yolu ve metodu:

BUSİCOD® ağız yoluyla uygulanır.

İlacınızın dozunu ayarlamak için dereceli ölçeği kullanınız. Dereceli ölçeği her kullanımda yıkayıp kurulumuz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

BUSİCOD® Şurup'un 6 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı önerilmez.

Yaşlılarda kullanımı:

BUSİCOD®'un yaşlılarda kullanımı araştırılmamıştır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

BUSİCOD® böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda araştırılmamıştır.

Eğer BUSİCOD®'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla BUSİCOD® kullandıysanız:

BUSİCOD®'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

BUSİCOD®'u kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Aşırı dozda BUSİCOD® alınması halinde şu belirtiler görülebilir: Uyku hali, bulantı, kusma, ishal, sersemlik ve tansiyon düşmesi. Bu etkiler doz azaltılınca veya tedavi kesilince ortadan kalkabilir. Eğer ilaç kesildiğinde bu etkiler devam ediyorsa doktorunuz veya eczacınıza danışınız.

BUSİCOD® ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, BUSİCOD®'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, BUSİCOD®'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Ciltte döküntü.

Bu çok ciddi bir yan etkidir. Eğer bu yan etki sizde mevcut ise, sizin BUSİCOD®'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etki oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

- Uyku hali
- Bulantı
- İshal

Bunlar BUSİCOD®'un hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma talimatında yer alan veya yer almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. BUSİCOD®'un saklanması

BUSİCOD®'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalaj üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra BUSİCOD®'u kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz BUSİCOD®'u kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi

TEBEM İlaç San. Tur. ve Tic. A.Ş.

Mustafa Kemal Mah. 2147. Sok. No:3/2

Çankaya/ANKARA

Üretim yeri:

Merkez Lab. İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Taşdelen Mah. Sırrı Çelik Bulvarı Ayça Sok. No:6

Çekmeköy/İSTANBUL

Bu kullanma talimatı 12/08/2022 tarihinde onaylanmıştır.