

# KULLANMA TALİMATI

## FUCİBEST KREM %2

TRİOZER

### Haricen kullanılır.

- **Etkin madde:** Bir gram krem, 20 mg Fusidik asit içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Bütilhidroksitoluen, Setostearil alkol, Sıvı parafin, Parafin, Propilen glikol, Makrogol setostearil eter, Potasyum sorbat, Akrilamid/Sodyum Akriloildimetiltaurat Kopolimer ve Isoheksadekan Polisorbat 80, Saf su.

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
- Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
- Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
- Bu ilacın kullanımını sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
- Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.

### Bu Kullanma Talimatında

1. **FUCİBEST nedir ve ne için kullanılır?**
2. **FUCİBEST'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **FUCİBEST nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **FUCİBEST'in saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır..**

### **1. FUCİBEST NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?**

FUCİBEST, 20g'lık alüminyum tüplerde sunulur.

FUCİBEST'in etkin maddesi olan Fusidik asit; bir antibiyotik olup bir çok mikroorganizma üzerinde güçlü antibakteriyel (bakterileri tahrip eden veya onların çoğalmasını engelleyen) etkiye sahiptir.

FUCİBEST'e duyarlı organizmaların oluşturduğu deri hastalıklarının tedavisinde kullanılır.

### **2. FUCİBEST'İ KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER**

#### **FUCİBEST'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

- Fusidik asit ve tuzlarına veya diğer bileşenlerden herhangi birine alerjik (aşırı duyarlı) iseniz,
- Pseudomonas aeruginosa gibi duyarlı olmayan organizmaların oluşturduğu enfeksiyonlarda kullanılmamalıdır.
- Açık yaralara uygulanmaz, aksi halde alerjik reaksiyonlara neden olur.

#### **FUCİBEST'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

Aşağıdaki durumlarda size veya çocuğunuza FUCİBEST kullanılıp kullanılmayacağına doktorunuz karar verecektir.

- Gözde irritasyona sebep olabileceğinden göz çevresindeki cilt enfeksiyonlarında
- Bütün diğer haricen kullanılan antibiyotiklerde olduğu gibi, uzun süreli ve sık sık uygulama nedeniyle, temas duyarlılığı ve antibiyotiğe karşı direnç gelişmesi riski olduğunda

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

### **FUCİBEST'in yiyecek ve içecek ile kullanılması**

FUCİBEST'in yiyecek ve içeceklerle birlikte kullanımına ait özel bir bildirim bulunmamaktadır.

### **Hamilelik**

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Fusidik asidin gebelerde kullanımı ile ilgili yeterli bilgi mevcut değildir. Ancak yarar/zarar ilişkisi hekimce etraflı olarak değerlendirilmek koşulu ile kullanılmalıdır..

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

### **Emzirme**

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Fusidik asidin emzirenlerde kullanımı ile ilgili yeterli bilgi mevcut değildir. Ancak yarar/zarar ilişkisi hekimce etraflı olarak değerlendirmek koşulu ile kullanılmalıdır.

Emzirmeden önce meme başı çevresi temizlenmelidir, bu çevreye uygulanmamalıdır.

### **Araç ve makine kullanımı**

FUCİBEST merkezi sinir sistemini baskılamadığı için araç sürme ve makine kullanma konusunda bir etki yaratması olası değildir.

### **FUCİBEST'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

FUCİBEST'in içeriğinde bulunan propilen glikol ciltte irritasyona neden olabilir.

Bütilhidroksitoluen ve setostearil alkol lokal deri reaksiyonlarına (örneğin; kontakt dermatite) ya da gözlerde ve mukoz membranlarda irritasyona sebebiyet verebilir. Potasyum sorbat, lokal deri reaksiyonlarına (örneğin; kontakt dermatite) sebebiyet verebilir.

### **Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

Fusidik asit için bildirilmiş bir ilaç etkileşimi yoktur.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı, bitkisel ürünü vitamin ya da minerali şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza ya da eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

## **3. FUCİBEST NASIL KULLANILIR?**

### **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar**

FUCİBEST lezyonlara günde 2-3 kez ve doktorun önerdiği süre uygulanır. Uygulamadan sonra üzeri kapatılabilir veya açık kalabilir.

## **Uygulama yolu ve metodu**

FUCİBEST cilt yüzeyine haricen uygulanır.

## **Değişik yaş grupları**

### **Çocuklarda kullanımı**

FUCİBEST'in çocuklarda kullanımı için herhangi bir kısıtlama yoktur.

### **Yaşlılarda kullanımı**

FUCİBEST'in yaşlılarda kullanımı için herhangi bir kısıtlama yoktur.

## **Özel kullanım durumları**

### **Böbrek/Karaciğer yetmezliği**

Böbrek ve karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dozaj ayarlaması bildirilmemiştir

Eğer FUCİBEST'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz..

### **Kullanmanız gerekenden daha fazla FUCİBEST kullandıysanız**

FUCİBEST'den kullanmanız gerekenden fazla kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

### **FUCİBEST'i kullanmayı unutursanız**

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

### **FUCİBEST ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler**

Herhangi bir etki beklenmemektedir.

## **4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?**

Tüm ilaçlar gibi, FUCİBEST'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

**Aşağıdakilerden biri olursa, FUCİBEST'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz**

- Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin FUCİBEST'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz**

- Cilt döküntüleri
- Ciltte yanma, batma hissi
- İrritasyon

- Kuruma

Sıklığı bilinmeyen yan etkiler: Egzema, ürtiker, göz çevresinde şişme ve yüzde kızarma..

Bunlar FUCİBEST'in yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

## **5. FUCİBEST'İN SAKLANMASI**

FUCİBEST'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altında oda sıcaklığında direkt gün ışığından ve sıcaktan koruyarak saklayınız.

### **Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız**

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra FUCİBEST'i kullanmayınız.

### **RUHSAT SAHİBİ:**

TRİOZER İlaç Kim. Koz. Sağ. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.  
Cevizli Mah. Orhangazi Caddesi Tınaztepe Sokak No: 4 Kat: 2  
Maltepe/İSTANBUL

### **ÜRETİM YERİ:**

Merkez Laboratuvarı İlaç San ve Tic. A.Ş.  
Sırrı Çelik Bulvarı Ayça Sokak No: 6  
Taşdelen-Çekmeköy/İSTANBUL

Bu kullanma talimatı 05.06.2012 tarihinde onaylanmıştır.