

# KULLANMA TALİMATI

## FİTO INTERTULLE

**Haricen kullanılır.**

**Etkin madde:** 6 g *Triticum Vulgare* sulu ekstresi ve 0.04 g etilenglikol monofenil eter.

**Yardımcı madde(ler):** Polietilen glikol 400, polietilen glikol 1500, polietilen glikol 4000, likid parafin, setil stearyl alkol, gliserin, sorbitol, lavanta esansı ve koriander esansı.

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
- Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
- Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
- Bu ilacın kullanımını sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
- Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen düşük dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında

1. FİTO INTERTULLE nedir ve ne için kullanılır?
2. FİTO INTERTULLE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. FİTO INTERTULLE nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. FİTO INTERTULLE'nin saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

### 1. FİTO INTERTULLE NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

FİTO INTERTULLE, ilaç emdirilmiş bir gazlı bezdir.

Etkin madde olarak 0.6 g *Triticum Vulgare* sulu özütü ve 0.04 g etilenglikol monofenil eter içerir.

FİTO INTERTULLE, cilt hücrelerinin yenilenmesini gerektiren ülser, 1. ve 2. derece yanık ve yatak yarası gibi deri dokusunun bozulduğu durumların bölgesel tedavisinde kullanılır.

### 2. FİTO INTERTULLE'YU KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

FİTO INTERTULLE'yu aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer etkin maddeye yada yardımcı maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığınız varsa.

FİTO INTERTULLE'yu aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Topikal kullanım için öngörülen tüm ürünlerin kullanımı, özellikle uzun süreli uygulamalarda, bazı hassasiyeti arttırıcı etkide bulunabilir.

Böyle durumlarda tedavi kesilir ve gerekiyorsa uygun bir tedavi uygulanır. Duyarsız mikropların gelişmesi durumunda da aynı işlemler yapılmalıdır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

FİTO INTERTULLE'nun yiyecek ve içecek ile kullanılması

Deri üzerine sürülerek uygulandığından, yiyecek ve içecek ile etkileşmesi beklenmemektedir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz bu ilacı kullanabilirsiniz..

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer emziriyorsanız bu ilacı kullanabilirsiniz.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanımı üzerine etkisi bildirilmemiştir.

FİTO INTERTULLE'nun içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

İçeriğinde bulunan setil alkol nedeniyle lokal deri reaksiyonlarına (kontakt dermatit gibi) sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Herhangi bir etkileşim bildirilmemiştir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

### 3. FİTO INTERTULLE NASIL KULLANILIR?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Günde bir-iki kez uygulanır. Bu arada gazlı bezin daima nemli ve yumuşak kalmasına dikkat edilmelidir

## Uygulama yolu ve metodu

- Gazlı bez ambalajın içindeki steril maşa ile (pens) alınır ve önceden temizlenmiş ve dezenfekte edilmiş yaranın üzerine kapatılır.
- Bunun da üzerine gazlı bez ve hidrofil pamuk (akıntısı çok fazla olan yaralarda) sarılır.
- Daha sonraki uygulamada, özel bir sakınca yok ise, yara bölgesi steril su ile yıkanabilir. Gazlı beze emdirilmiş krem tamamen suda çözünme özelliğindedir ve uygulanan bölgede bir kalıntı bırakmaz.

## Değişik yaş grupları

### Çocuklarda kullanımı

Çocuklarda kullanımına ilişkin kısıtlama yoktur.

### Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımına ilişkin kısıtlama yoktur.

## Özel kullanım durumları

### Böbrek/Karaciğer yetmezliği

Böbrek ve karaciğer yetmezliğinde kullanımına ilişkin bilgi yoktur.

Eğer FİTO INTERTULLE'nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla FİTO INTERTULLE kullandıysanız

FİTO INTERTULLE'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

FİTO INTERTULLE'yu kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

FİTO INTERTULLE ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Tedavi sonlandırıldığında herhangi bir sorun görülmesi beklenmez..

## 4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, FİTO INTERTULLE'nun içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

**Aşağıdakilerden biri olursa, FİTO INTERTULLE'yu kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz**

Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin FİTO INTERTULLE'ya karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

FİTO INTERTULLE ile ilgili olarak başka bir yan etki bildirilmemiştir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri [www.titck.gov.tr](http://www.titck.gov.tr) sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız..

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

## 5. FİTO INTERTULLE'NUN SAKLANMASI

FİTO INTERTULLE'yu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

30°C'nin altında, oda sıcaklığında saklayınız.

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra FİTO INTERTULLE'yu kullanmayınız.

RUHSAT SAHİBİ

Tripharma İlaç San. ve Tic. A.Ş.  
Maslak/İstanbul

Tel: (0212) 366 84 00  
Faks: (0212) 276 20 20

ÜRETİM YERİ

Farmaceutici Damor S.p.A.  
Napoli/İtalya

Bu kullanma talimatı 29.02.2016 tarihinde onaylanmıştır.