

İMUMAX Sprey Kullanım Kılavuzu

İMUMAX Sprey Boğaz ağrısının tedavisinde kullanılır.

TİCARİ SUNUM ŞEKLİ: 30 ml sprej püskürtme başlıklı alüminyum kutuda.

BİLEŞİMİ: Gliserol, Bal, Su, Glikosiyenidin-a (*Vitis vinifera* ve *Sambucus nigra* özütleri)

ETKİ ŞEKLİ: **İMUMAX Sprey**, boğaz ağrısının tedavisinde kullanılan filmojen, viskoz, hipertonic bir solüsyondur. Ağıza sıkıldığında, ozmotik olarak etkin bir film tabakası oluşturarak boğazın derin kısımlarından hipotonik sıvıları mekanik etkiyle kendine doğru çeker. Bu dışı doğru güçlü sıvı akışı sayesinde bakteriler, serbest virüs partikülleri, toz partikülleri, ölü hücreler ve hücre kalıntıları dâhil olmak üzere boğaz yüzeyinde mevcut bütün kontaminantları mekanik etkiyle ayırarak kurutur. Bu ürün böylece hızlı bir temizleme solüsyonu olarak etki gösterir. Film tabakası ayrıca boğaz yüzeyini tahrişe ve dışarıdan gelen bakteriyel saldırılara karşı korur ve böylece ağrıyı azaltır.

KULLANIM TALİMATLARI: Sprey kutusunu hafifçe çalkalayın, kapağını çıkarın ve ilk kullanımdan önce sprej başlığına bir-iki defa basarak sprej pompasından düzgün akış gelmesini sağlayın. Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi kutunun sprej ağzını ağızınıza götürerek ürünü ağızınızdan içeri uygulanması için sprej başlığına basınız 4-5 doz sprej uygulayınız. Tedavinin başladığı gün ilk 2-3 saat boyunca her 20-30 dakikada bir ve ardından günde 3-4 defa tam iyileşme görülünceye kadar sprej kullanımına devam edilmesi önerilmektedir.



Ağız içine uygulayınız

ÖNEMLER: Kullanımdan önce Kullanım Kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyunuz. Kullanımdan önce ellerinizi yıkayınız. Ürün yalnızca topikal kullanım amaçlıdır. Ürünü yalnızca ağız içine sprej olarak uygulayın ve sprej uygulaması sırasında ürünü solumaktan kaçınınız. Ürün uygulandıktan sonra ilk 15-30 dakika boyunca yeme veya içmeden kaçınınız.

Bileşenlerden herhangi birine karşı alerjiniz veya duyarlılığınız varsa (bal bileşeni eser miktarda polen içerebilir) ürünü kullanmayınız. **İMUMAX Sprey**'i kullanmaya başladıktan sonra 7 gün içinde semptomlarda herhangi bir iyileşme görülmediği takdirde doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Her kullanımdan sonra şişenin kapağını kapatınız. Ürün viskoz olduğundan dolayı sprej ucunda ürün damlacıkları kalabilir; her kullanımdan sonra sprej ağzını kâğıt mendil veya pamuk yardımıyla siliniz. Günlük doz günde 2 gramdan daha az miktarda şekere denktir.

Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız. Oda sıcaklığında saklayınız. Buzdolabına veya derin dondurucuya koymayınız. Sprej kutusu hasar gördüğü takdirde, son kullanma tarihinden sonra veya ilk kullanım üzerinden 30 gün geçtikten sonra kullanılmamalıdır.

İMUMAX Sprey herhangi bir zararlı bileşen içermez. Bu ürün 8 yaşından itibaren çocuklar, gebe ve emziren anneler tarafından kullanılabilir. Sorularınız olması durumunda doktorunuza danışınız.

YAN ETKİLERİ: **İMUMAX Sprey**'in bilinen herhangi bir yan etkisi yoktur ve yutulduğunda zararlı değildir. Ürünü uyguladıktan birkaç dakika sonra alerjik reaksiyon görüldüğü takdirde ürünü kullanmayı bırakınız ve boğazınızı temiz içme suyuyla iyice çalkalayınız ve ardından bir sağlık uzmanına danışınız.

Rev. No: PH-n0491

Rev. Date: 2022-10

VACN0491

ÜRETİCİ FİRMA:
VITROBIO SAS
ZAC de Lavaur
63500 ISSOIRE FRANCE
FRANSA'DA ÜRETİLMİŞTİR.

İTHALATÇI FİRMA:
İMUNEKS FARMA İlaç San. Tic.A.Ş.
Prof.Dr.Bülent Tarcan Cad,Engin Pak İş Merkezi
No:5 Gayrettepe Beşiktaş İstanbul
info@imuneksfarma.com
www.imuneksfarma.com

CE
TİBBİ CİHAZ